

49889/B

STOERCK

Interne antiquitus Cicuta exhibebatur.
vide Galen. Comm. aphor. Hipp. 2. p. 13.

— Mercurialis folia cicutæ sub decoit. specie in
furore Uterino. de Morby Mulierum lib. IV. c. 10

ex Diario Eruditor. Paris. ann 1762. mens
Octobre pag. 687. 4.º ubi hujus de cicuta libri
recensio fit.

Vide Philos. Transact. Vol. 52 P. 1. pag. 89 art. 15

De Cicutâ Maiore intelligendum in Aue-
torem: & hanc plantam cum multis aliis con-
fundi, & eorum vix pro soli varietate nimi-
um differre. vid. locum citatum.

ANTONII STÖRCK,

SACRÆ, CÆS. REG. APOST. MAJESTATIS CONSILIARII AULICI,
ARCHIATRI, ET IN NOSOCOMIO CIVICO PAZMARIANO PHYSICI

LIBELLUS,

QUO DEMONSTRATUR:

CICUTAM

NON SOLUM USU INTERNO TUTISSIME EXHIBERI, SED ET
ESSE SIMUL REMEDIUM VALDE UTILE IN MULTIS
MORBIS, QUI HUCUSQUE CURATU IMPOSSIBILES
DICEBANTUR.

EDITIO ALTERA.



VINDOBONÆ,
TYPIS, JOANNIS THOMÆ TRATTNER, CÆSAREÆ REGIÆ
MAJESTATIS AULÆ TYPOGR. ET BIBLIOPOLÆ.

MDCCLXI.



SACRÆ CÆSAREÆ, REGIÆ,
APOSTOLICÆ
MAJESTATI,
MARIAE THERESIAE,
AUGUSTISSIMÆ ROMANORUM
IMPERATRICI,
HUNGARIÆ, BOHEMIÆ, DALMATIÆ,
CROATIÆ, SLAVONIÆ, &c. &c.
REGINÆ,
ARCHIDUCI AUSTRIÆ, &c. &c.
DOMINÆ
SUÆ CLEMENTISSIMÆ

ANTONIUS STÖRCK.

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

AUGUSTISSIMA ROMANORUM
IMPERATRIX!
DOMINA CLEMENTISSIMA!



*Quam vis omnes scientiæ &
artes, TUO favore &
infinita TUA clementia
restauratæ, mira cum industria atque
ineffabili contentione hac in antiquissi-*

*ma Universitate Viennensi ornentur
& excolantur, nemo tamen est, qui du-
bitat, scientiam medicam ex his omni-
bus maxime eminere, vigere, florere.*

*Nec mirum! etenim non modo
summi in hac scientia Professores in-
defesso suo diurno, nocturnoque labore*

ea omnia excogitant , tentant , & perficiunt , quæ ad discipulos in omnibus medicinæ principiis erudiendos , & in vera ac unica Hyppocratica praxi firmos reddendos apta & necessaria arbitrantur ; sed & ipsi , ex his Scholis nati , practici , magistrorum exempla sequentes , quocunque possibili stu-

*dio , & sedula observatione salubri
huic scientiæ amplificandæ insudant.*

*Ego propterea anno præterito ,
facta in meo nosocomio , observata
congeffi , & in publicum edidi.*

Gau-

Gaudebam tunc vehementer, dum
vidi, hæc a *Viris* in arte gravissimis
comprobari, & laudibus, non meritis,
effferri.

Unde eo magis incitatus, pro hoc
quoque anno, jam multum allaboravi,
collegi.

*Ante omnia autem credidi commu-
nicanda esse experimenta nova, quæ
circa usum Cicutæ institui.*

*Hæc igitur, fidelissimo calamo ad-
umbrata, in exiguum opusculum re-
degi.*

Quo-

*Quoniam autem prævideo , magnam
inde in humanum genus utilitatem pro-
manaturam , ausus fui , hunc novum
laborem ad SACRATISSIMÆ
TUÆ MAJESTATIS pedes hu-
millime deponere , TIBI dedicare ,
consecrare.*

Ete-

Etenim multiplici experientia convicti sumus omnes , TE ea , quæ in re literaria bona & salubria sunt , benignissime semper recipere , TE ea sustinere , & immensa TUA benevolentia propagare.

*Et profecto ! extra omne dubium est , fore : ut hoc opusculum , GLO-
RIO-*

RIOSISSIMO TUO NOMINI
*præmunitum, alios quoque medicos ad
ulteriora experimenta debitis cum cau-
telis capienda & prosequenda impellat.*

*Quæ autem deinceps meum inge-
nium ad sublevandas aut tollendas
ægrorum calamitates conferre poterit,*

*ea (si DEO placuerit) maximo semper
fervore , & summa industria præ-
stare enitar.*



PRÆFATIO.

Multi dantur morbi , quos nec antiqui medici , nec recentiores , in arte quamvis peritissimi , curare noverunt ; idque vel ideo , quum nullum adhuc remedium detectum fuit , quod his morbis debellandis sufficeret.

Ut igitur ad simile remedium eruendum omnes nostros intendamus nervos , suadet ratio , officium jubet.

An fors in plantis , quarum virtutes nos ignoramus , aut quas pro suspectis habemus , simile quid latet ?

Ego fane ! usu *cicutae* , medicamentum tentasse , mihi videor , quod in solvendis inveteratis scirrhis , & in sanandis cancris valde utile esse poterit.

Neque

PRÆFATIO.

Neque tamen hujus plantæ vim specificam hic deprædico, neque cujusdam inventi gloriam ambio; sed desidero unice, ut mei conatus in afflicti generis humani utilitatem & emolumentum cedant, & applicentur.

Quapropter nollem, quis invidia, aut ambitione experimenta turbet.

Opusculum in tria capita dividitur.

Primum continet plantæ, & remedii descriptionem.

Secundum recenset casus, in quibus hoc remedium fuit adhibitum.


Tertium adfert quædam corollaria.





CAPUT I.

DE CICUTA.

 In locis umbrosis & pingui-
bus, prope fossas aggeres-
que agrorum, pratorumque
sepimenta crescit planta umbellifera
quæ mense Jul. floret. *Folia* ejus longis,
crassis, cavis pegunculis appensa, plu-
rifariam *Myrrbidis* modo in alas plurimas
tenues, atrovirentes divisa sunt. *Culmus*
procerus, ferulaceus, glaber, lævis, cras-
sus, intus inanis, dilute virens, nonnullis

A

attamen

attamen subrubentibus veluti serpentum maculis respersus, supra tres non raro cubitos assurgit. *Umbellæ* fastigia occupant. Candidi in his sunt *Flosculi*. *Semina* postea anisi æmula, aliquanto candidiora. *Radix* dodrantalis, crassitudinis digiti, quando caulem facit, cava est internis, prius autem solida. Odor est ingratus, foetidus. Vide *Morison*, Tom. 3. p. 290.

Hanc herbam vocaverunt Botanici *Cicutam* vulgarem; & Germanico idiomate dicitur Schirling.

Plinius scribit caulem cicutæ viridem a multis impune comedi.

Rajus perhibet quemdam nomine *Boulle* cicutæ radicem ad scrupulum unum in febribus malignis, & quartanis dedisse, & omnibus diaphoreticis prætulisse.

Rene-

Renealmus in Observat. 3. & 4. ad Scirrhos hepatis, lienis, pancreatis solvendos scrupulum unum aut drach. β . radicis cicutæ in substantia exhibuit; aut dedit infusum cum drach. j. vel drach. ij. hujus radicis factum.

Multa emplastra & linimenta officinalia succum cicutæ recipiunt.

Cæteroquin autem tere ab omnibus autoribus carbone nigro notatur, recensetur inter venena, damnatur, atque ideo ex medicina penitus exulavit.

Copiose ubique invenitur; nec tamen in hortis utilitatem aut locum habet, neque ad sananda pecora, minus ad curandos homines nunc adhibebatur.

Hinc prædiit semper frustra, & sine usu iterum exaruit.

Novimus tamen omnes, nil a *Deo optimo* creatum esse, quod non foret bonum & utile;

Unde apud me statui, hujus herbæ virtutes præ omnibus aliis experiri, atque ideo plurimos veteres ac recentiores scriptores hac super re legi, & consului.

Legendo autem inveni, hanc herbam usu externo antiquis maxime temporibus ad tumores frigidos dissipandos, ad scirrhos solvendos, cancrorumque dolores mitigandos magno cum effectu fuisse adhibitam.

Eam vero, interne datam, teterri-
mum venenum esse, omnes clamitarunt.

Prima itaque pericula externo usu erant facienda.

Qua-

Quapropter hanc herbam ficcātam, & conscissam intra linteamina decussatis filis in matratium confui, simili matratium in aqua ebulliente per aliquot minuta reliqui, dein, expresso superfluo liquido, ad partes affectas calide applicui.

Hac ratione pessimæ gangrænæ progressum aliquoties inhibui, & corruptum a sano separavi.

Qui talia matratia, aquæ incocta, ob ingratum foetorem, aut natum inde pruritus ferre non poterant, iis lacti incocta adhibui.

Hæc dein facile tulerunt, nec quid mali experti sunt, & omnes habuerunt levamen.

Viro sexagenario, a multis anis doloribus podagricis divexato, non tantum

simili fomento dolores mox sedavi, sed & tophos podagricos integre emollivi, & dispuli.

Unde factum est, ut rediens podagra nec amplius adeo violenta, nec diuturna fuerit.

In annoso rheumatismo, & dolore arthritico pilulis, postea describendis, & fomento ex *Cicuta* ægris aliquoties magnum levamen attuli, quosdam penitus liberavi.

Aliquos tamen, continuato licet usu nequaquam juvi; nemini autem, quantum ego novi, nocui.

In strumis scirrhis, in indurationibus glandularum, mammarum, & in pessimis canceris non exiguos effectus vidi, & expertus sum.

Ubi

Ubi tamen tumores inflammatorii, aut serosi calidi adfunt, ibi tale fomentum ex cicuta minus convenit.

Poterit tamen & in his casibus habere locum, si debitæ antea evacuationes fiant.

Emplastra, quæ succum *Cicutæ* recipiunt, magnam quoque utilitatem in medicina habent, & talia sæpe solvunt & dissipant, quæ omnibus aliis resistunt.

Unde suspicari cœpi, an non in succo cicutæ vis illa solvens, penetrans, & discutiens lateret?

Succum igitur ex *Cicuta* expressi, & in vase terreo lentissimo igne in extractum inspissavi.

Hoc extractum ilico in homine tentare, nefas erat.

Qua de causa cani parvo, famelico, ter de die dedi scrupulum unum hujus extracti & frustum carnis.

Sedulo tunc attendi, quænam in cane mutationes fierent.

Verum canis mansit fanus, alacer, & magno desiderio offam expectavit.

Secundo die, data eadem extracti quantitate, idem expertus sum.

Neque tertio die malum in cane symptoma adverti.

His audacior redditus, in me ipso experimentum feci.

Mane ac vesperi sumsi granum unum hujus extracti, & vasculum unum infusi theæ hausi desuper.

Diætam tunc paulo strictiorem observavi, ut ilico adverterem, si quid insoliti in meo corpore fieret.

Tali

Tali dosi per octiduum continuavi, nec minimam inde molestiam sensi; fui agilis, robustus, optimam habui memoriam, appetii, placide dormivi.

Altera septimana auxi dosin, & jam mane & vesperi duo grana declutivi, neque inde quid mali aut insoliti in meo corpore ortum est.

Jam ergo optimo jure & salva conscientia hoc in aliis mihi licuit tentare.

Quæ autem radici cicutæ vis inesset? quoque scire volui.

Radix recens dum in taleolas discinditur, fundit lac, quod gustu amarum & acre est.

Hujus lactis unam alteramve guttulam linguæ apice delibavi.

Mox lingua facta est rigida, intumuit, valde doluit, & ego nec verbum loqui poteram.

Sinistro hoc eventu terrefactus multum timui.

Ex lectione tamen autorum memini, quod acida similia medicamentorum viribus resistent, & virulentiam enervent.

Hinc succo citri linguam totam ablui, & apicem hoc succo perfricui; quo facto, statim magnum levamen percepi, abierunt dolores, tensiones, & balbutire potui.

Post horæ quadrantem idem repetii, & tunc coeperam paulo liberius loqui.

Iteratis dein vicibus applicato hoc succo tandem post binas horas lingua libera facta est, & evanuit omnis metus.

An non igitur in lacte radicis maximum virus latet?

Ra-

Radix exsiccata, & in pulverem redacta, minus nociva est.

Etenim hujus pulveris granum unum aut duo aliquoties sine noxa assumfi.

Dum de his certus fui, pilulas sequentes paravi:

℞. Herbæ recentis cicutæ q. f.

Exprimatur succus, isque recens lentissimo igne in vase terreo (sæpius agitando, ne amburatur) coquatur ad spissi extracti consistentiam, hoc extractum. f. q. pulveris foliorum cicutæ in massam pilularem subigatur; ex qua fiant pilulæ granorum duorum.

Si ex cicuta sufficiente quantitate aquæ aliquamdiu cocta succus exprimitur, tunc fit extractum minus efficax; attamen utile.

Pilulæ possunt argento vel auro obduci, vel diversis pulveribus conspergi, ut odor ingratus evitetur.

Vel idem extractum poterit in bolis, in mistura, aut alia quacunque convenienti forma exhiberi, ne ægri diuturno usu abhorreant, & defatigentur.

A minima dosi semper incœpi, & sub initium mane & vesperi unicam solummodo pilulam exhibui, tertio quartove die dedi ter talem pilulam.

Post octiduum ter de die cœpi duas dare, & hac ratione sensim (si necessitas id postulavit) augendo ascendi, usque dum ad drachmam unam, vel drachmam unam cum semisse spatium unius diei deveni.

Nil unquam mali observavi, licet has pilulas per unum alterumve annum

&

& ultra, continuato usu, etiam sanis exhibuerim.

Subinde curam statim majori pilularum dosi inchoavi, & viso bono temperamento, & bonis viribus in initio ilico bis terve per diem dedi pilulas duas, tres aut quatuor.

Nihilominus præstat semper parva dosi incipere, sunt enim idiosyncrasia, quibus medicamenta maxime innocua nocent; hinc ne his damnum inferamus, & ut sensim in naturæ similibus ægrorum cognitionem pertingamus, tuta via incedendum est.

Qualibet vice dum assumuntur pilulae, datur unum alterumve vasculum infusi theæ, vel jusculi vitulini.

Si pulvis radicis *Cicutæ* sufficienti quantitate mucilaginis Gummi trogacanthi

in

in pilulas redigitur, exfurgit medicamentum valde efficax, verum majori tunc in utendo circumfpectione opus est.

C A P U T II.

C A S U S I.

Admodum formosa puella a tribus annis gessit parotidem finiftram penitus fcirrhofam, colore purpuream, quandoque acute dolentem, quandoque ab omni dolore immunem; magnitudine autem pugnum virilem hic tumor fupervavit.

A diverfis medicis & chirurgis diverfa interna externaque remedia funt exhibita; verum omnia effectū caruerunt.

Tandem ægra accessit Dominum *Lebèr*, chirurgum nosocomii civici; hic me in consilium vocavit.

Casu & formulis, præscriptis, rite examinatis vidimus, remedia maxime solventia, discutientia &c. interne æque ac externe fuisse adplicata.

Hoc igitur in genere nil amplius superesse conclusimus, quam spiritum frumenti cum mercurio sublimato.

Unde, adposito externe emplastro de ladano, dedimus spiritum frumenti &c. atque præterea ægra copiose haurire debuit decoct. radicis gram. cich. tarax. &c.

Per tres septimanas his diligentissime assumtis nullum omnino levamen, nullam prorsus mutationem deprehendimus.

Hinc statuimus tentare pilulas e cicuta paratas.

Ab

Ab uno solummodo grano , mane & vesperi sumendo , inchoavi, & singula vice unum alterumve vasculum infusi flor. samb. superhibendum dedi.

Post octiduum rediit ægra plena solatio , & nobis læta narravit, ostenditque , quod tumoris moles esset minor , mollior , mobilior.

Effectum mirati facile concessimus, ut ægra, suæ pulchritudinis recuperandæ avidissima, hoc remedium continuaret.

Elapso altero octiduo nos denuo accessit , malum autem fere in eodem statu fuit.

Quapropter dosin auxi , & mane ac vesperi dedi binas pilulas.

Quo facto , intra triduum plus quam dimidia duritie pars abiit.

Dein

Dein continuato, in eadem dosi, hoc remedio intra sex septimanas omnis durtities evanuit.

Verum remansit faccus flaccidus, pafpaceus.

Dedi igitur purgans, & faccum flaccidum linteaminibus fumo aromatico ex mastiche, olibano, myrrha &c. imprægnatis sæpius perfricari jussi; quod tantam habuit efficaciam, ut intra sex circiter dies faccus totus abierit; unde puella suam priorem formositatem integre recuperavit.

Hac ratione curatam ad *Illustrissimum Præsidem* adduxi, & ipsa Ei historiam totam enarravit.

CASUS SECUNDUS.

Fœmina (30. aliquot ann.) jam a pluribus annis id incommodi habuit,

buit, quod mox sub axillis, mox in inguinibus, mox in collo glandulæ intumuerint.

Adplicato emplastro, sumtoque medicamento purgante hi tumores sub initium semper disparuerunt; successu autem temporis pertinaciores facti sunt, & quandoque ex usu emplastri in ulcera abierunt, quæ, effuso copioso ichore, post aliquot septimanas sponte iterum consolidata sunt.

Vires ægræ sensim diminuebantur, intumuerunt pedes, & glandulæ subaxillares; tandem mamma dextra quoque increvit, & tota scirrhusa facta est.

Apposito tunc emplastro mox dolor acutus mammam invasit, durities abiit in tubera, accessit color purpureus, dein lividus; demum cutis, duobus

bus in locis summo cum dolore rupta, efformavit bina ulcera cancroſa, fœtidiffimo & acri ichore manantia.

Dolor quotidie circa vesp̄as multum eſt adauctus.

Varios medicos & chirurgos hæc ægra adiit, plurima aſſumſit remedia, nullum tamen unquam levamen percepit.

Demum die 14. Septembr. 1757. ad me venit, re bene examinata, hanc optimam pilulas experiundi occaſionem putavi, præbuique mane & vesp̄eri pilulas binas, quarum quælibet granum unicum pondere habuit, atque his ſuperbibendum dedi infuſum foliorum veronicæ.

Vigefimo ſecundo Septembr. vidi colorem lividum fere ubique in læte ru-

brum, hinc inde in naturalem esse mutatum; dolores fuere multo mitiores, & foetidi ichoris loco materies tenuis puriformis comparuit.

Secundo octobr. color totius fere mammæ naturalis fuit, moles & durities erant minores, dolores exigui, pus bonum.

Decimo quarto Octobr. mamma iterum coepit tumere, rubre, tendi, & magnis doloribus torqueri, puris loco ichor effluxit.

Dolui finistrum experimenti successum; non tamen spem abjeci: etenim accurate inquirendo deprehendi, tempus menstrui fluxus instare, mali igitur causam ex eo posse repeti, judicavi; hinc suasi ægræ, ut pilulas sine interruptione continuaret.

Altero die proruperunt menses, mamma detumuit, rediit color naturalis, imminuti sunt dolores; unde ægra in assumendo alacriter perexit.

Vigesimo quarto Octobr. inveni mamman multo minorem, molliorem, pus bonum; jussi, ut jam mane & vesperi pilulas tres assumeret.

Tertio Novembr. magna puris boni copia ex ulceribus prodiit, mamma fuit minor, ægra frequentes in mamma sensit formicationes, tumores sub axilla dextra quoque fundi cœperunt.

Decimo nono Novembr. narravit ægra: quod menses debito tempore fluxerint, & quod tunc mamma iterum intumuerit, & dolores majores essent orti; his tamen non territa pilulas semper continuavit.

Dum mammam conspexi, deprehendi partem supra papillam molitie & magnitudine fere naturalem, pars autem infra papillam lapidis instar dura adhuc fuit; dedi mane & vesperi pilulas quatuor.

Secundo Decembr. rediit ægra tristis, & conquerens, quod ob acutissimos nocturnos in mamma dolores non posset dormire, quod appetitus esset penitus deletus, os amarum, glutinosum, ructus foetidi, frequentes.

Verum ægra horum symptomatum causam simul passa est; etenim dixit: se aliquot abhinc diebus carnem suillam fumo induratam, & brassicam minus accurate coctam comedisse, & ilico inde pondus in ventriculo, & nauseam ortam esse, doloresque increvisse.

Qua-

Quapropter præscripti purgans ex rhei electi Scrup. ij. & crem. tart. Scrup. i. quod alvum quinquies movit, appetitum mox restituit, & reliqua symptomata mitigavit.

His factis, mane & vespere quinque pilulas exhibui, quarum quælibet pondere duo grana habuit; hinc jam longe majorem copiam assumsit, quam antehac.

Decimo octavo Decembr. enarravit ægra, quod tempore fluxus menstrui vix perceperit dolores, quodque color mammæ naturalis permanferit.

Inquirendo tunc in tumorem infra axillam, tetigi, eum esse longe minorem, & valde mobilem; ulcera erant pura, & jam in sanationem vergere videbantur, pus, quod fundebant, paucum erat,

& optimæ consistentiæ & coloris. Mammæ medietas supra papillam colore, magnitudine, & mollitie omnino naturalis fuit; verum medietas infra papillam, ad omnia rebellis, lapidea mansit; hinc de hujus resolutione jam merito erat dubitandum; nihilominus ægra, viso jam tanto progressu, se sine interruptione diligentissime his pilulis usuram promisit, & rogavit, ut eas ipsi non denegarem.

Mane & vesperi sex pilulas nunc exhibui.

Vigesimo quarto Decembr. ægra ingentes dolores in mamma habuit, & mamma iterum tendi, & valde rubere cœpit.

Mala autem hæc symptomata tunc accessisse, affirmavit ægra, dum tri-
duo

duo abhinc mammæ ulcera, crustis crassiss obducta, coaluerunt, dumque liber materiei exitus fuit interclusus.

Igitur ad crustas has emolliendas mammæ imposui emplastrum de spermate cete.

Altero die crustæ deciderunt, & ex ulceribus effluxit serum acre, dein pus prodiit, & mox tumor mammæ imminutus est, rubedo disparuit, abiitque omnis dolor.

Decimo quinto Jan. durities infra papillam, quæ huc usque immutata persistit, nunc cœpit fundi, ægra nullos dolores habuit, & menstruus fluxus debito tempore rediit, nec ullum malum symptoma produxit.

Tertio Februar. ægra continuos ructus, nauseam, præcordiorum anxietates,

tes, & in mamma majores dolores conquesta est, dixitque, quod id experia-
tur semper, dum ex leguminibus quid-
quam assumit; mammam tamen quoad
magnitudinem, colorem, mollitiem in
eodem statu deprehendi, quo fuit die
15. Jan.

Quoniam ventriculum ab assumptis one-
ratum adverti, purgans exhibui, quod
magna cum euphoria operatum est; dein
in usu pilularum pergendum erat.

Vigesimo quarto Febr. ægra admo-
dum bene se habuit, scirrhus sub axilla
fuit multo minor, & ea durities, quæ
infra mammæ papillam hæsit, invenie-
batur mollior, & in sex moleculas di-
visa, gaudebam tunc multum, quod &
hic scirrhus, alias pertinacissimus, tan-
dem mutaretur.

De-

Decimo tertio Mart. omnia in eodem statu sine ulla mutatione inveni. Suasi ideo, ut ter de die sex pilulas fumeret.

Decimo April. scirrhus infra papillam mollis fuit, neque moleculæ amplius distingui potuerunt, ulcera fuere multo minora, nitida, pus bonum.

Vigesimo nono April. fere omnia in eodem statu fuerunt; ægra rogavit, ut purgans præscriberem, quoniam levem nauseam & pondus sentiret.

Dedi igitur drachmam unicam rhei, quæ magnam copiam materiæ biliosæ eduxit, & ægra dein belle habuit.

Vigesimo quarto Maj. mamma tota ad naturalem fere mollitiem, & magnitudinem rediit, ulcera cœperunt coire, & paucum solumodo, optimi coloris,

&

& consistentiæ , pus exstillavit , tumor sub axilla fuit exiguus.

Tertio Jul. mamma tota naturalis fuit , ulcera concreverunt , tumor sub axilla vix amplius pisum adæquavit.

Iussi , ut nunc a pilulis abstineret , & rediret post aliquot septimanas , ut hac ratione viderem , an mamma maneret bona ? an iterum abiret in pejus ?

Vigesimo sexto August. inveni omnia bona , & foeminam integre sanam.

Statim sub initium curæ , dein quinto mense , tandem finita integra cura hanc foeminam ad *Illustrissimum Baronem VAN SWIETEN* adduxi , ut experimenti progressum videret ; lætabatur Is semper , & pro innata sua benevolentia hanc ægram qualibet vice pecuniis remuneratus est.

CASUS TERTIUS.

Fœmina, viginti quatuor annorum, semper alias sana, ab anni spatio advertit in mamma dextra tuberculum durum, mobile, quod sensim adeo increvit, ut 12. Octobr. 1758. dum me accessit, ovum anserinum magnitudine adæquaverit.

Examinando vidi perfectum scirrhum esse.

Præbui ideo mane & vesperi tres pilulas, quarum quælibet grana duo pondere habuit, jussique, ut infusum, quælecunque placeret, superbiberet.

Vigesimo quinto Octobr. ad me rediit, & inveni tumorem moliolem, paulo minorem; rogavit ægra an non lice-

ret

ret emplastrum adplicare, verum recusavi, ut experirer quid pilulæ solæ efficerent, & suasi propterea, ut jam mane & vesperî quatuor pilulas assumeret.

Decimo sexto Novembr. vidi scirrhum in plurimas moleculas molles divisum, gaudebat fœmina de bono successu. Menstruum fluxum rite habuit, neque tempore menstruo a pilulis abstinuit, quoniam nullam inde turbam advertit.

Præscripsi purgans, quod bene operatum est, & mamma notabiliter detumuit.

Dein jussi eam pilulas continuare.

Decimo quinto Decembr. rediit, & mamma fere naturalis fuit, exigua modo pastacea moles supererat.

Tertio Jan. mamma erat penitus naturalis.

Tunc

Tunc denuo præscripsi purgans, & ab eo tempore hanc fœminam non amplius vidi.

C A S U S Q U A R T U S.

Mense August. 1758. virgo, 18. ann., ex morbo acuto in nosocomio convaluit, & postquam vires cœpit recuperare, sensit in mamma dextra ingentes dolores; hæc autem mamma jam a fœlqui anni spatio lapidis instar dura fuit.

Dedi tunc pilulas ex Gum. ammon. sapon. venet. sal. polychr. rheo. &c. externe chirurgus HAFFNER cataplasma ex sapone veneto, lacte soluto, adplicuit.

Ab initio res in melius mutabatur, & mamma mollescere cœpit, & dolores remiserunt.

Post-

Posthac vero iterum increverunt dolores, mamma denuo durior & purpurea facta est; tandem livuit, & post aliquot dies cutis rupta, ulcus sordidum & multo foetidissimo ichore manans, efformavit.

Hinc externe fomentum ex foliis cicutaë applicui, & interne dedi mane & vesperi tres pilulas, quarum quælibet grana duo pondere habuit.

Eodem adhuc die his remediis dolores multum imminuebantur.

Tertio die color lividus coepit evanescere, & foetidi ichoris loco tenue pus comparuit.

Septimo die tota mamma læte rubuit, ulcus fuit nitidum; dolores, qui per diem exigui erant, versus vesperras paupisper exacerbati sunt; pus in ulcere
jam

jam nunc bonum deprehendebatur, & mamma mollior.

Decimo quinto die ulcus videbatur in sanationem tendere, mamma multo mollior fuit, & color fere naturalis, dolores aut pauci, aut nulli.

Vigefimo die mamma mole minor & mollior erat, & ulcus coaluit.

Vigefimo quarto die aderant enormes dolores, qui ab eo tempore incœperunt, quo ulcus claufum est.

Ad dolores mitigandos opio opus fuit.

Vigefimo quinto die mamma circa papillam valde mollis erat, & quædam obscura fluctuatio percepta est; noctu ob ingentes dolores opium denuo dari debuit.

Præterea tamen ab hoc die cœpi mane & vesperi quatuor pilulas exhibere; &

C

fomen-

fomentum ex cicuta sedulo adplicatum est.

Vigesimo octavo die manifesta erat fluctuatio, & dolores tunc acutissimi; rogavit ipsa ægra, ut mamma pertunderetur, quod & me suadente, diligentissimus meusocomiichirurgus HAFNER perfecit.

Puris boni ingens copia effluxit, dolores ilico remiserunt, & mamma tota collapsa est, in ambitu solummodo quædam scirrhosæ portiones tangebantur; color mammæ naturalis fuit.

His factis, præter pilulas & fomentum ex cicuta nil adplicuimus, ut experiremur, quid his solis fieret.

Quotidie sat magna puris boni copia prodiit, & scirrhosæ portiones adeo cito dissipatæ sunt, ut quadragesimo die

ex

ex iis nil fere superfuerit, & ulcus mundum jam coepit sanari.

Quinquagesimo die mamma sana erat, & ulcus cicatrice obductum est.

Solis igitur his pilulis, & fomento ex cicuta hæc ægra integre curata fuit; neque unquam quid mali ex fomento aut pilulis percepit; alvus quotidie bene cocta prodiit, exceptis iis diebus, quibus opio utendum erat.

sub finem purgans huic ægræ exhibui, quod magna cum euphoria alvum quater eduxit.

Post tres dein dies prima vice menses citra vel minimum incommodum proruperunt, unde hæc, jam integre sana, nosocomio valedixit.

C A S U S Q U I N T U S.

Fœmina, 28. ann., sex septimanis ab ultimo partu in mamma dextra duritiem & dolorem advērtit, & infans ubera fugens hanc mammam respuit.

Sub initium nil adplicuit præter lintamina, fumo aromatico imprægnata.

Quum autem duritiem increfcere, & dolores augeri percepit, emplastrum mammæ adposuit, verum mamma inde rubuit, & dolores adeo acuti facti sunt, ut misera, noctu diuque, dormire non potuerit.

Tandem (8vo mense) accessit febris, fitis magna, & anxia respiratio; unde mater cum infante ad meum nosocomium translata est.

Infantem ilico a matre separare statueram ; verum is nil cibi potusve assumsit , & continuo vagitu vires amisit ; quam primum autem mammis iterum admotus est , quievit , & postea placide dormivit.

Hinc ægræ matris lac infanti erat concedendum.

Matri, quoniam febris magna fuit, & pulsus elevatus, durus, venam jussi secari ; mammæ dolenti cataplasma emolliens applicui, & pro medicamento atque potu ordinario dedi decoctum resolvens, nitrosum.

Intra binos dies dolor in mamma valde mitis factus est, & febris penitus desinit.

Iisdem remediis per tres adhuc dies continuavi, & tunc fere omnes dolores

abfuerunt, durities vero manfit eadem, febris non amplius rediit; unde medicamenta mutavi.

Externe jam adponebatur cataplasma ex fapone veneto, lacte foluto; pro medicamento interno data eft miftura fequens.

℞. Sapon. venet. unc. β.

solv. in aq. flor. samb.

lib. j.

dein adde:

fal. polychr. dr. β.

fyryp. de cich. c. rheo

unc. ij. β.

m.

S. fumat ægra omni bihorio

unciam unam.

Postquam per decem dies fine interruptione hanc mifturam exhibui, nil

mu-

mutatum in mamma inveni, & ægra
sensim a medicamento abhorruit; In-
fanti cæteroquin sano glandulæ colli tu-
mere, & indurescere cœperunt.

Quapropter matri ter de die tres pi-
lulas sumendas dedi, & jussi copiosum
infusum flor. samb. desuper hauriret.

Intra triduum jam adverti mammam
in superficie, molliorem, & ægra dixit,
quod liberius respiret, quod urina co-
piosus fluat.

Infans ubera matris fugens nequa-
quam inde quid mali sensit.

Post octo dies inveni scirrhum
mammæ in plures moleculas divisum;
infans incidit in levem diarrhæam; &
mater jam non amplius tantam urinæ co-
piam reddidit

Decimo quarto die mamma tota pastacea fuit, ægra bene appetiit, alvum quotidie solito naturæ cursu, ut antehac, deposuit; infans leni diarrhæa adhucdum laboravit, inde autem debilitatus non est, & colli glandulæ sensim ad naturalem statum redierunt.

Vigesimo quarto die mamma fere naturalis fuit, neque infans diarrhæa amplius vexabatur.

Trigesimo die matri dedi drachmam unam rhei electi, unde probe purgata est; & post aliquot dies integre sana cum sano infante ex nosocomio discessit.

Dosin pilularum non auxi, novem quotidie suffecerunt.

CASUS SEXTUS.

Viro, sexaginta quatuor annorum, foetidissimus cancer ab angulo oris sinistro ad aurem usque omnia depaſcebat, remedia quæcunque tentata malum nequaquam inhibuerunt: ipse cortex peruvianus effecit nihil.

Dedi igitur mane & vesperti pilulas sex cum infuso flor. samb. & externe adposui emplastrum diapomphol.

Primo die æger nullum levamen habuit.

Secundo die dolores remiserunt, æger noctu dormivit, neque ulcus tantopere foetuit.

Tertio die copiosissimum serum acre ex ulcere effluxit, & labia prius valde tumida, detumuerunt.

Quarto die minor ichoris copia pro-
manavit, & foetor fuit exiguus.

Quinto die ichoris loco tenue pus com-
paruit, & ulcus satis purum videbatur.

Sexto, septimo; octavo, nono die
eadem observata sunt, dolores erant
pauci, appetitus bonus.

Decimo die dolores iterum majores
fuerunt, ulceris labia erant tensa, tu-
mida, & valde rubra.

Duodecimo die denuo copiosum se-
rum ex ulcere destillavit, unde dolores
mitigati sunt, & tumor labiorum immi-
nuitus.

Decimo Tertio die ulcus iterum for-
didum fuit, tetrum odorem sparsit, &
magnum dolorem excitavit.

Decimo Quarto die auxi pilularum
dosin, atque mane & vesperi octo exhibui.

De-

Decimo Quinto die ulcus copiosissimo fero manavit, & dolores multum decreverunt,

Decimo Sexto die aderat bonum pus neque ullum dolorem conquestus est æger.

Decimo Septimo die ulcus mundum videbatur, pus omnino bonum, dolor nullus.

Decimo octavo die idem observatum est.

Decimo Nono die redierunt denuo magni dolores, intumuerunt ulceris labia, unde æger pertæsus rus abivit, & balneatori sese confidit, hic autem emplastris & decoctis tantum effecit, ut cancer mox integram fere faciem occuparit, & miserrimo ægro intra tres septimanas adtulerit necem.

Sub

Sub usu pilularum cancro limites ponebantur, etenim is neque in amplitudinem, neque profunditatem prorepsit; ilico autem in pejus ruit, dum æger a pilulis abstinuit.

CASUS SEPTIMUS.

Nobilis matrona venando Sclopetum paulo fortius ad mammam dextram adtrufit.

Dolorem inde magnum non habuit; sed post unam alteramve septimanam advertit in eadem mamma tuberculum, pisum magnitudine adæquans.

Hoc tuberculum citra dolorem sensim increvit ita, ut nucem juglandem multum superaverit.

Hoc in statu hæc matrona ad me mittebatur, & ilico, casu examinato, mane & vesperi tres pilulas exhibui.

Octa-

Octavo die ad me rediit; inspiciendo mammam, nil mutatum inveni.

Decimo sexto die tuberculum in superficie mollius adparuit; nullum unquam dolorem hæc matrona in mamma percepit; dum autem his pilulis usa est, alvum quotidie præter consuetudinem bis aut ter liquidam depofuit, vires tamen inde diminutæ non sunt, neque appetitus.

Post mensis spatium tuberculum mole minus, mollius, & longe mobilius videbatur.

Elapfo secundo mense tuberculum fere $\frac{1}{2}$ minus erat, & molle, hinc pilulas fedulo continuandas suafi; verum ab hoc tempore hanc matronam non amplius vidi.

Sub usu pilularum semper sana fuit, menses ipsi rite prodierunt, neque iis fluentibus pilulas neglexit, quoniam nullam inde noxam observavit.

C A S U S . . . O C T A V U S .

Fœmina, 43. ann., 22. Mart. 1759. me accessit, gerens mammam finistram admodum magnam, lapidis instar duram, immobilem, purpuream, hinc inde lividam, & acutissime dolentem; præterea brachium ejusdem lateris præ dolore mammæ & tumore glandularum subaxillarium movere non potuit, respiratio inter ambulandum fuit brevis, difficilis, tussiculosa.

Omnia signa cancerum occultum adesse testabantur.

Can-

Causam & originem hujus mali in maritum rejecit, qui, sesqui anno abhinc, cubitu in hanc mammam fortiter impexit; unde mox tuberculum natum est, quod in tantam molem accrevit, & abiit in cancrum.

Antequam huic foeminæ quid medicamento exhibui, eam ad *Illust. Baronem VAN SWIETEN* adduxi, qui rebus rite consideratis casum difficilem & experimento dignum agnovit, suavitque, ut mane & vesperi tres pilulas darem, atque hanc foeminam omni decimo quarto die ad *Eum* mitterem, ut hac ratione de effectu esset certus.

Trigesimo Mart. foemina ad me rediit, dicens: dolores esse minores, cæteroquin vero mammam in priori statu permansisse.

Jussi

Jussi tunc ut mammam denudaret, & vidi statim, colorem totius mammæ mutatum esse, ita quidem, ut ea ex parte, qua mamma purpurea fuit, nunc lætus rutilus color adesset, qua parte vero livida & subnigra fuit, nunc purpurasceret; imo versus axillam deprehendi mammam molliorem; hinc suasi, ut pilulas sedulo continuaret.

Sexto April. eam adduxi ad *Illust. Baronem VAN SWIETEN*; gaudebat Is summo opere de bono remedii effectu, etenim vidit manifeste colorem, qui antehac cancrusus erat, jam hinc inde in naturalem mutari, aliis in locis læte rubere, & nullibi amplius livere. Dolores quoque minores esse foemina affirmabat; verum respiratio mansit æque difficilis, tussiculosa. *Illust. Baro* tangendo mam-

mam

mam ubique in margine molliorem, & minorem invenit; quapropter foeminam pecuniis donavit, ut in utendo alacriter pergeret.

Decimo tertio April. mamma iterum mollior, & paulo minor fuit; verum supra papillam erat quoddam spatium, tres pollices longum, duos latum, quod nullo modo mutabatur, & valde rubuit, & fuit immobile.

Jussi tunc, ut ægra mane & vesperi quinque pilulas assumeret.

Vigesimo April. cum ægra adivi *Il-
lust.* VAN SWIETEN; conquerebatur tunc dolores per vices redeuntes, acute pungentes, rodentes, urentes; tussis fuit paulo frequentior, dixitque ægra quod tussiendo majorem in mamma dolore sentiret, quod pulmo cum mam-

D

ma

ma quasi cohæreret, eamque tussiendo introrsum traheret.

Cæteroquin portio mammarum versus axillam, sesqui pollicem lata, mollitie, colore, & magnitudine penitus naturalis erat; hinc *Illust.* VAN SWIETEN, mammarum duritiem glaciei instar fundi aiebat.

Nihilominus tamen tumor supra papillam immutatus persistit.

Tussi siccarum, ut paulisper iretur obviam, tunc præter pilulas præscripti decoctum ex rad. alth. fol. alth. & Syrupum alth.

Vigesimo Septimo April. ægra eandem tussim, & eosdem dolores conquesta est; verum advertit ipsa, quod thoraculam longe arctius possit constringere, quam ante quatuordecim dies, & hinc conclusit, mammam esse minorem.

In

In dosi pilularum, & in usu decocti perreximus.

Quarto Maj. denuo accessimus *Illustrissimum* Baronem, mamma tota minor & mollior fuit, excepta ea duritie, quæ supra papillam costis firmissime adhæsit.

Decimo Octavo Maj. ægra melius se habuit, tussis fuit minus molesta, dolores mediocres, mamma mollior. Durities supra papillam in eodem statu permansit; tussi autem sputum glutinosum prodire cœpit.

Primo Junii *Illustrissimus* VAN SWIETEN lætabatur, dum vidit mamman ad minimum $\frac{2}{3}$ esse minorem. Ægra autem conquerebatur dolores nocturnos, tussim noctu molestant; unde suavit *Illustrissimus*, ut vesperi ægræ massa pilularum de cynoglosa exhiberetur.

Decimo quinto Junii. ægra rediit læta, dicens: quod jam bene dormiret, rarius tussiret, quod fere omnium dolorum esset expers; respiratio erat paulo liberior, sputa purulenta prodierunt.

Durites supra papillam quoque cepit mollescer.

Vigesimo Nono Junii ægra denuo liberius respiravit, sputa purulenta facile rejecit, durities autem supra papillam fuit in eodem fere statu. Hinc externe fomentum ex foliis cicutæ adplicui.

Decimo Tertio Julii rediit conqurens; quod ex fomento applicato durities supra papillam incipiat exulcerari.

Dum mammam consideravi, vidi parvo in spatio epidermidem secessisse, cutim esse ruptam, & ichorem acrem exstillare.

Dum

Dum autem in causam accuratius, in-
quisivi, falsa est ægra, quod ingratum
pruritus & fornicationem in mamma
perceperit, quodque tunc partim un-
guibus, partim indusio duriores mam-
mæ partem fortiter fricuerit, & quod
ab eo tempore ardorem ingentem sense-
rit, & ichoris stillicidium.

Fomentum jussi continuare, & pilu-
las mane & vespere octo dedi.

Vigesimo Julii jam aderat ulcus sat
profundum, labia ulceris erant livida,
ichor valde foetuit, ægra habuit majores
dolores, sputis pus prodiit.

Vigesimo septimo Julii ulcus iterum
profundius fuit, verum dolores remi-
serunt, ichor effluens foetuit, pus nul-
lum aderat; frustra autem lata, coria-
cea, dura, foetida ex ulcere prodibant;

hinc duries supra papillam, huc usque ad omnia rebellis, & folliatione minui videbatur.

Sputa purulenta copiose processerunt; tussis autem in ulcere tensionem, & magnum dolorem excitavit.

Labia ulceris naturalem colorem sensim iterum recuperarunt.

Hoc in statu hanc ægram ad meum nosocomium suscepi.

Dominus *Haffner* chirurgus eam bis quotidie deligavit, & ulcus linteis carptis, infuso cicutæ madidis, implevit; plurima quotidie frustra coriacea exciderunt, & tumor multum imminutus est, ægra nullum dolorem habuit, sine opio dormivit, de die autem frequenter tussivit, & sputa purulenta egressit.

Quinto Augusti in ulcere pus coepit

con-

comparere, foetor fere omnis evanuit, & durities suppuratione minuebatur, labia ulceris erant pura, & optimum habebant colorem; vires ægræ erant satis bonæ, sputa libere prodierunt, & respiratio fuit multo facilior.

Decimo sexto Augusti ægram denuo ad *Illustriss. Baronem VAN SWIETEN* adduxi; mirabatur, quod scirrhus, antehac adeo pertinax, nunc benigna suppuratione minueretur, fecitque spem maximam, fore: ut consumpta hac pauca superstitie duritie, ulcus sponte consolidaretur.

Et sane, omnia successerunt optime, & jam plurima sanationis signa aderant.

Vigesimo quarto Augusti ægra denuo frequentiores tussim, & inde in mamma magnos dolores conquereba-

tur ; etenim dixit, quod mamma, quasi chorda ligata, tussiendo versus cavum pectoris acutissimo cum dolore traheretur ; hinc noctes fuerunt iterum inquietæ, quare denuo ad opium confugiendum erat.

Dato opio ægra belle se habuit, appetiit, vires erant majores, tussis minus molesta, sputa facilia, purulenta.

Secundo Septembr. circa octavam matutinam vidi hanc ægram bono in statu, extra lectum deambulantem, nec de dolore, nec de tussi conquerentem.

Eodem adhuc mane clanculum ab amicis vinum adferebatur, quod ægra abeuntibus amicis jejuno adhuc ventriculo avidissime haufit ; unde mox vertiginosa vomuit, cecidit, & intra pauca minuta obiit apoplectica.

In dura & pia matre plurimas venas varicofas invenimus, cerebellum copioso, grumoso sanguine comprimebatur.

Pulmonis finistri lobus medius, totus scirrhusus & gravis, repertus est, lobus autem superior partim scirrhusus, partim suppuratus.

Bini hi lobi cum pleura ex anteriori parte erant firmissime connati, nec sine læsione inde potuerunt separari.

Ulcus fuis purum, muscoli pectorales sanissimi; labia ulceris optimum colorem habuerunt, & cum partibus vicinis denuo concrefcere, propiusque ad se invicem accedere cœperunt; hinc nemo de integra hujus ulceris curatione dubitare potuiffet.

C A S U S N O N U S.

Fœmina (23. ann.) a binis annis in toto colli circuitu glandulas tumidas, & scirrhosas habuit, & hac ratione colli crassitie fere caput adæquavit.

Plurimæ ex his glandulis cancroso ulcere corrodebantur.

Hæc ægra tentatis jam innumeris remediis, a diversis medicis & chirurgis exhibitis, nullum levamen percepit, & tandem ad nostrum nosocomium devenit.

Egregius chirurgus *Haffner* externe ea omnia adplicuit, quæ ars chirurgica indicavit, subministravitque.

Ego præterea decocta copiosissima & pilulas ex gum. ferulac., resin. lign. sanct., sapon. venet., terr. foliat tart. mass. Pil. extr. cath. &c. exhibui.

Per

Per sex septimanas hæc remedia diligentissime continuabantur, nullam tamen mali emendationem adverti.

Ulceræ continuo foetidum & malignum ichorem fuderunt; imo materies ichorosa membranam cellulofam corrofit, & profundos sinus ac fistulas produxit.

Demum his confideratis, dedi spiritum frumenti cum mercurio sublimato.

Ægra autem inde dolorem in pectore sensit, coepit tussitare, & conquesta est in osse sterni ardorem, licet copiosissima decocta simul hauserit.

Nihilominus tamen in quartam septimanam hunc spiritum continuavi, quoniam symptomata ex usu hujus spiritus supervenientia, dein longe mitiora facta sunt; verum tunc levis salivatio orta est citra levamen. Hinc

Hinc & ab hoc remedio abstinui, atque externe adplicui, fomentum excicuta, & præter infusum hæder. terr, veron., agrimon &c. dedi ter de die pilulas quatuor.

Sexto die dolores remiserunt, livor glandularum exulceratarum in lætam rubedinem transivit, ichor evanuit, & pus dilutum ejus loco visum est.

Decimo die tumor colli & glandularum fuit longe minor, ulcera fatis pura, pus bonum, ægra quiete dormivit, appetiit, nullos sensit dolores.

Vigesimo primo die jam quædam ulcera cicatrice obducebantur, tumor colli fuit multo minor, glandulæ multæ jam naturales, sinus minus profundi.

Jussi tunc, ut ægra ter de die sex pilulas assumeret.

Trigesimo secundo die omnia iterum erant meliora, plurimi sinus jam fuerant clausi, binæ solummodo magnæ, callosæ fistulæ in parte sinistra superant, quæ, arte chirurgica sectæ, eodem fomento, & iisdem pilulis intra quatuordecim dies percuratæ sunt, & tunc fere omnes glandulæ ad naturalem statum redierunt, nulla scirrhusa durities amplius tangi potuit, pauca tantum palstacea tubercula hincinde reperta sunt.

Dedit tunc ægræ purgans ex rhei dr. β. scammon. gr. viij. sal. polychr. gr. xv. quod sexies alvum solvit, nec ægram debilitavit.

Post-

Posthac per binas adhuc septimanas ter de die sex pilulas assumfit ægra, externe autem nil amplius adpositum est.

Finitis his binis septimanis integra aderat sanitas.

Menstruus fluxus huic ægræ debito tempore semper rediit, neque pilulæ quidquam turbarunt.

Curatam hanc foeminam per tres adhuc septimanas in nosocomio retinui, ut viderem, an glandularum tumores non redirent? vel an sinus fors nimis mature clausi, denuo recrudescerent?

Verum foemina mansit sanissima; unde eam ex nosocomio dimisi; rogans tamen, ut apparente vel minimo tumore ilico ad me reverteretur.

Est autem jam septimus mensis, quod eam non viderim.

CASUS DECIMUS.

Virgini (18. ann.) glandulæ submaxillares scirrhusæ factæ sunt, & quælibet fere ovum galinaceum magnitudine adæquavit.

Huic illico mane & vesperi sex pilulas dedi, quibus integro mense sine omni omnino effectû usa est.

Sexta septimana primo tumores cœperunt emolliri, & minui.

Sensim dein in toto ambitu pastacea mollities observata fuit.

Septima septimana quotidie ter sex pilulas exhibere cœpi, præterea dedi omni octiduo purgans rhebarbarinum.

Hac ratione spatium trium mensium hæc ægra integre restituebatur.

CASUS UND ECIMUS.

Fœmina (67. ann.) a binis annis fœtidissimum apertum cancrum in mamma sinistra habuit, qui tantæ erat amplitudinis, ut limbus ejus superior fere maxillam inferiorem adtigerit, inferior autem ad ventrem usque descenderit.

*Illustrissimus Baro VAN SWIETEN, spectabilis Dominus Decanus de Dietman, celeberrimus anatomiae Professor Gasser, chirurgiae Professor JAUS, & alii, qui examini chirurgico in Domo Universitatis interfuerunt, hanc miserri-
mam fœminam primo viderunt, eam-
que die vigesimo Junii 1759. ad me mi-
serunt.*

Mam-

Mamma tota fuit ex fusco nigra , tuberosa , ichor vel eminus teterrime foetuit , ægra nec appetiit , nec præ dolore potuit dormire.

Jussi , ut mane & vesperi pilulas quatuor assumeret , & externe de die applicui fomentum ex foliis cicutæ , noctu vero emplastrum diapompholygos.

Vigesimo octavo Junii , rediit , & summo cum gaudio enarravit , quod non amplius tantopere doleret , noctu placide dormiret , neque tantum ac antea foetorem adverteret.

Mammam inspiciendo ichoris locus pus tenue observavi.

Sexto Julii color mammæ fuit rutulus , pus bonum , moles minor , fætor exiguus ; hinc ægra se strenue continuaturam promisit , & infinitas egit gratias.

Decimo quarto Julii cancer fuit multo minor, pus bonum, fætor nullus, color bonus, & ægra dixit, quod interim magna frustra, ex mamma separata, ceciderint, quod omni altero vel tertio die ingens feri copia ex mamma prodeat, quodque tunc moles mammæ visibiliter concidat.

Vigesimo secundo Julii omnia iterum erant meliora, & ægra de nullo incommodo conquesta est.

Postea, dum examen medicum fuit, hanc ægram denuo ad Domum *Universitatis* adduxi.

Illustrissimus VAN SWIETEN, spectabilis Dominus Decanus, omnesque medicinæ Professores, qui hanc miseram antea viderunt, ægregium effectum, & celerem mutationem mirati sunt.

Ete-

Etenim color mammæ erat optimus, fœtor fere nullus, pus bonum, cancri moles $\frac{1}{2}$ minor.

Illustriss. VAN SWIETEN tunc hanc ægram auro donavit, & blandis verbis hortatus est, ut in ulu sedulo pergeret.

Tertio Augusti mamma iterum minor videbatur, verum noctes erant inquietæ ob dolores, circa vespervas revertentes, hinc dandum fuit paregoricum, quod omnes turbas mox sedavit.

Fomento ex cicuta, & pilulis in eadem semper dosi continuatum est.

Decimo quinto Augusti mamma cancrosa pugnum virilem magnitudine adhuc paulisper superavit; pus aderat bonum, fœtor nullus, vires (ratione habita ætatatis) bonæ.

Vigesimo sexto Augusti denuo *Illust.* VAN SWIETEN adivimus, vidit is omnia esse valde bona, unde lætabatur, & spem dedit maximam, fore: ut intra paucas septimanas (si res semper ita pergeret) cancer penitus funderetur.

Secundo Septembris ægra omni ex parte bene se habuit, cancer pugnum non amplius adæquavit.

Sexto Septembris misit ad me, nuntiatura, quod tempore matutino sedens in platea & fructus horæos vendens a subito violento vento ingens frigus per omnes corporis partes senferit, quod mox orti sint enormes ventris dolores, quos sequebatur alvi fluxus admodum copiosus & dolens, atque vires conciderunt ilico.

Jussi

Jussi, ut statim a pilulis abstineret, & medicamenta simili in morbo convenientia præscripsi.

Altero mane mihi significari curavit, quod alvi fluxus, & dolores essent æque violenti, quod cum alvo prodeat sanguis, quod sitis sit magna, & accedat frequens animi deliquium.

Unde ego & Dominus *Leber* chirurgus eam eodem adhuc mane accessimus, & quæcunque ego interne aut externe utilia credidi, summa cum attentione adhibui, verum in omnibus fui frustra.

Tertio die facies facta est cadaverosa, & quarto die misera obiit.

Mammam post mortem abscidit Dominus *Leber*, eamque ad domum *Universitatis* adtulit, dum denuo examen medicum fuit.

Tunc vidit *Illustriss.* VAN SWIETEN, & omnes Medicinæ Professores celeberrimum & optimum in hoc desperato casu effectum; unde doluerunt, felicem experimenti progressum fortuita morte turbatum esse.

CASUS DUODECIMUS.

Die quarto April. 1759. celeb. Professor de HAEN foeminam ad me misit, cujus collum innumeri scirrhi occuparunt, quorum plurimi erant maligne exulcerati.

Mamma sinistra quoque tota scirrhopha fuit, & ea ex parte, qua axillam spectabat, livido ac purpureo colore tincta; ibidemque ex angusto foramine copiosus, ardens & erodens ichor effluxit.

Præ-

Præterea & sub axillis, & in inguinibus multi, diversæ magnitudinis, scirrhi latuerunt.

Sub initium statim ter de die quatuor pilulas huic fœminæ dedi, & infusum herbæ veronicæ superbibendum.

Decimo quarto die ægra rediit, & dixit, quod ex usu harum pilularum scirrhi exulcerati longe majorem ichoris copiam fuderint; verum quod ichor effluendo ne minimum ardorem in cute excitaverit.

Scirrhorum color, antea lividus, nunc naturalis aut rutilus fuit, moles quoque multo minor, major autem colli & glandularum mobilitas.

Ægra quoque sub axillis levamen habuit, etenim brachia facilius movere, & sine dolore (quod antea erat impos-

fibile) arctius corporis trunco applicare potuit.

In mamma color lividus fere totus disparuit, & mamma fuit mollior, mole minor, & ex angusta illius apertura bonum pus prodiit.

In eadem pilularum dosi continuandum tunc putavi, & dedi tantam quantitatem, ut per tres septimanas sufficerent, ne ægra, e longinquo habitans, toties deberet redire.

Absumtis his pilulis rediit, & multi scirrhi jam penitus evanuerunt, ulcera plurima bona cicatrice erant obducta; sub axillis, & in inguinibus tubercula fuerunt valde parva, omnia mobilia, nullo modo dolentia.

Mamma & mole & duritie fere naturalis fuit, & per aperturam paucum pus exprimi potuit.

Pro

Pro integro mense tunc copiam pilularum exhibui, non tamen auxi dosin.

Mense elapso rediit ægra, rogans: an pilulas adhucdum deberet continuare, quoniam neque in collo, neque sub axillis aut inguinibus, neque in mamma quid doloris aut incommodi sentiret. Quoniam ulcera essent omnia sanata, & Scirrhi adeo parvi, ut jam hos sine omni molestia ferre posset.

Dum mammam consideravi, inveni eam penitus naturalem, apertura erat optime consolidata, versus axillam tuberculum, ob parvitatem vix sensibile, tangebatur.

Ulcera colli firmas cicatrices habuerunt, Scirrhi vel abierunt penitus, vel fuerunt adeo parvi, ut nec septima pars amplius superfuerit.

Sub axillis unum alterumve tuberculum, pisi magnitudine, repertum est, cætera erant omnia mollia, naturalia.

In inguinibus dixit ægra, quod omnis tumor disparuerit, & quod nunc liberime ambularet.

Dedi denuo pro quatuor septimanis pilulas, & jussi his absumptis rediret.

Verum eam adhucdum exspecto.

CASUS DECIMUS TERTIUS.

Virgo, 18. ann., a multis annis parotides, glandulas submaxillares, totiusque colli scirrhofas & adeo tumidas habuit, ut collum crassitie caput multum excefferit.

Remedia, ab expertissimis medicis ac chirurgis præscripta, nihil omnino juverunt.

Imo

Imo plurimæ partes cœperunt vivere, vehementer dolere, tandem in cancro-fa & foetida ulcera abire; accessit fudor nocturnus, virium dejectio, tabes.

Licet hæc ægra ab illis, in quorum servitiis fuit, multum fuerit amata nihilominus ob tam horrendas exulcerationes, ob ingentem & malignum foetorem, atque inde timendum contagium, in nostrum nosocomium transferri debuit.

Ego & Dominus *Haffner* chirurgus inter hos Scirrhus & ulcera innumeros sinus & fistulas invenimus, præterea ægra fuit valde debilis, & conquesta est, quod ob dolores nocturnos dormire nunquam posset.

Hinc vesperi opio utendum erat.

De die autem bis exhibui tres pilulas cum infuso hederæ terrestris, scabiosæ, veronicæ & multo lacte. Externe adplicuimus fomentum ex cicuta.

Tertio die dolores jam longe erant mitiores, ichor copiosus profluxit, acer quidem, sed minus foetens, & collum paulisper detumuit.

Octavo die hinc inde bonum pus comparuit, glandulæ plurimæ mobiles factæ sunt, & ægra sine opio cœpit dormire, sudor nocturnus quoque minus copiosus fuis.

Decimo quarto die fere ubique bonum pus fuit, & tumores scirrhusi minores.

Auxi tunc pilularum dosim, & manu ac vesperi quatuor dedi; fomentum ex cicuta sedulo applicatum est.

Tri-

Trigesimo die sudor nocturnus cessavit penitus, multi sinus jam erant clausi, ulcera optimum habuerunt colorem, & quædam jam ad sanationem vergebant; tres autem aderant fistulæ callosæ, quæ arte chirurgica debuerunt secari.

Quadragesimo quarto die jam quædam ulcera coaluerunt, reliqua dederunt pus bonum, tumor colli fuit multo minor, ægra appetitum & vires recuperavit.

Sexagesimo die ulcera fere omnia erant clausa, collum detumuit, & cutis colorem habuit naturalem, omnes glandulæ fuerunt minores, mobiles; verum supra claviculam sinistram hæsit scirrhus magnitudine ovum anserinum superans, & percussus edens sonitum cartilaginis,

nis, tumor hicce toto hoc tempore ex usu remediorum nullo modo mutatus est.

Septuagesimo quarto die multi scirrhi in plures moleculas divisi reperiiebantur; in sinistra colli parte una glandula denovo abiit in ulcus, & per tres dies materiam suppurulentam fudit; postea totus faccus collabebatur, & intra paucos dies cicatrix formata est.

Nonagesimo die collum jam in pluribus locis naturalem mollitiem & magnitudinem habuit, neque decima tumoris pars amplius superfuit. Scirrhus tamen supra claviculam in eodem statu permanfit, & quoniam mobilis fuit, atque omni medicamentorum vi restitit, eum scalpello voluimus auferre; ast ægra renuit, & quum jam satis robusta fuit,

fuit, & collum commode movere potuit, e nosocomio ad suos rediit.

Per binos menses tunc ab omni medicamento abstinuit, & toto hoc tempore scirrhi nec majores nec minores facti sunt.

Tandem me iterum accessit, rogatura: an non & in suo servitio pilulis uti liceret?

Suasi ilico & dedi mane ac vespertres sumendas.

Post tres septimanas, absumtis pilulis, ad me rediit, & scirrhi erant minores, mobiliiores.

Finita quinta septimana ægra denuo ad me accessit, mihiq; magno cum gaudio ostendit, quod pertinacissimus scirrhus supra claviculam finistram, quem ante cartilagineum credidimus, nunc esset

esset minor, & divisus in sex tubercula.

Mirabar effectum, quem jam longo tempore exoptavi; suaeque, ut nunc mane & vespere quatuor pilulas sumeret.

Post quatuor septimanas hanc ægram iterum vidi, & erant omnia meliora.

Jam in quintum mensem his pilulis utitur, & nunc jam ter de die sumit sex, nil mali inde sentit, robusta est, bene dormit, libere respirat, quod antea non potuit, bene appetit, alvus prodit quotidie naturalis & rite cocta, scirrhi superstites sensim minuuntur, & omnia, lentam quidem, attamen integram sanationem promittunt.

CASUS DECIMUS QUARTUS.

Die 12. Septembr. 1759. me adivit
fœmina, 40. ann., cujus mamma
dextra fex abhinc septimanis intumuit,
& abiit in scirrhum.

Doctissimus medicus *Collin*, qui me
sua præsentia tunc honoravit, hanc fœ-
minam simul vidit.

Statim in principio dedi ter de die pi-
lulas tres, & jussi, post octiduum rediret.

Rediit tunc ægra plena solatio, quo-
niam scirrhus erat mollior, & mobilior.

Suasi, ut diligenter continuaret.

Spatio trium septimanarum feci, ut
redeunte ægra adesset iterum Dominus
Collin, qui summopere miratus est cele-
rem in hac fœmina effectum, etenim

F

jam

jam plus quam dimidia scirrhi pars evanuerat.

Pro integro mense tunc sufficientem pilularum copiam dedi, ne ægra, quæ integra fere hora abhinc habitavit, toties me accedere cogeretur.

Absumtis his pilulis scirrhus vix amplius ovi magnitudinem habuit.

Præscripsi tunc purgans, & pro altero mense iterum pilulas suppeditavi.

Finito hoc mense, magno cum desiderio hanc foeminam expectavi, verum non amplius rediit.

CASUS DECIMUS QUINTUS.

Vir (53. ann.) ex impuro coitu malum venereum contraxit, idque partim ex pudore, partim ex pecuniarum defectu neglexit.

Tandem intumuit testiculus sinister,

ve-

vehementer doluit, & totus scirrhusus factus est; & membrum virile in tantam molem excrevit, ut penem equinum longe superaverit.

Denique tribus in locis ex membro fungosæ excrescentiæ ortæ sunt, quæ brevi in foetidissimos canculos abierunt.

Scrotum ipsum cancroso ulcere fuit exesum, atque testiculus sinister totus nudus, exulceratus, cancroso ex scroto pependit.

Hinc miser nec quiete jacere, nec præ dolore dormire, minus autem ambulare potuit.

Unde pessimis his in circumstantiis in nostrum nosocomium ingerebatur.

Dum ego & Dominus *Haffner* chirurgus has partes inspeximus, horruimus præ fæto; testiculus sinister ex scro-

to propendens totus erat cancrusus, & major, quam duo pugni viriles.

Nec penis, nec scrotum, nec testiculus rudiores adtactum tulerunt, etenim prodiit ilico copiosissimus sanguis.

Æger præ debilitate sæpius animi deliquium passus est, fætor autem tantus fuit, ut inter alios ægros hunc relinquere non potuerimus, sed cogebamur eum separatim ponere.

Sub initium quotidie unciam j. β corticis peruviani exhibui, ut hac ratione acrimonia corrigeretur, corruptumque a sano secederet.

Verum quarto die æger corticem, quacunque forma exhibitum, ulterius sumere renuit, neque inde vidimus levamen aut ullam mutationem; imo vires ægri magis conciderunt, & appetitus deletus est.

De-

Desperato igitur hoc in casu pilulas & fomentum ex cicuta tentare conclusi.

In principio statim ter de die sex Pilulas præbui, & partes affectas fomento diligentissime feci foveri.

Eadem vespera remiserunt dolores, & miser sponte cœpit dormire.

Altero die jam multa frustra putrida separabantur, penis detumuit, nec tantus foetor amplius aderat.

Tertio die omnia iterum fuerunt meliora.

Quarto die in omnibus cancris ulceribus pus bonum erat, penis plusquam dimidiam partem suæ magnitudinis amisit, testiculus quoque minor & mollior fuit, ulcera habuerunt pulchrum colorem, æger sine paregorico dormivit, & cœpit appetere.

Octavo die penis ad naturalem fere magnitudinem rediit, partes cancrofæ erant multum emendatæ, pus ubique bonum esse continuavit, ex scroto magna frustra secesserunt, testiculus fuit mollis, & vix amplius ovum magnitudine adæquavit.

Duodecimo die omnia iterum erant meliora.

Decimo octavo die nil cancrofi amplius videri potuit; testiculus naturalem molem & mollitiem recuperavit, & illud, quod cancrofo ulcere depaſtum erat, recreſcere viſum eſt.

Scroti labia, optimi coloris, coire cœperunt; in pene, loco cancroſarum excrescentiarum, jam plana & puriſſima ulcera inveniebantur.

Omnes ægri actiones multo erant meliores, vires majores. His

His igitur pilulis (eadem semper dosi) & fomento ex cicuta in trigefimum diem continuavi, & tunc scrotum erat integre sanatum, & ulcera penis multo minora, nitida.

Æger autem quotidie circa vesperras ingrato pruritu per totum corpus vexabatur; hinc ne quid venerei, intra sanguinem latitantis, alias tristes tragædias luderet, remediis antivenereis reliquam curam perfeci.

Hoc in casu pilulæ & fomentum plus præstiterunt, quam sperare unquam licuisset.

Doctissimus castrensis medicus *Kollman*, Dominus *Leber* chirurgus nosocomii civici, *Frater Abdon* chirurgus apud fratres misericordes in Leopoldina, aliique mi in hac arte amici, quos ad

hunc ægrum videndum aduxi, celeres & vix sperandos effectus vehementer sunt mirati.

CASUS DECIMUS SEXTUS.

Fœmina (36. ann.) ex causa ignota binas in colli parte sinistra fistulas habuit, quæ tam numerosos & mirabiles sinus produxerunt, ut dexterrimus Dominus *Haffner* Stylo suo ad linguam, sternum, & inter œsophagum & asperam arteriam ad oppositam colli partem potuerit penetrare; & quod magis erat mirandum, hi sinus per totum thoracem distribuebantur.

Etenim dum in fistulas arte chirurgica injectiones fiebant, sensit ægra, eas ex parte anteriore ac scrobiculum cordis, ex posteriori autem ad lumbos usque penetrare.

Quod

Quod optimus chirurgus facile credit, nam, ut hi sinus replerentur, sex unciiis materiæ injiciendæ plerumque opus fuit.

Ad hoc malum percurandum tentavimus omnia, quæ nobis videbantur congrua, & quæ autores optimi simili in casu commendarunt.

Verum omni omnino effectu caruimus, & postquam per integros sex menses variis decoctis, injectionibus, fomentis, aliisque remediis miseram frustra divexavimus, accesserunt ingentes dolores, & corpus cœpit contabescere.

Qua de causa ego & Dominus *Haffner* conclusimus herbam cicutæ in hoc subiecto tentare.

Totum igitur collum & dorsum fomento ex cicuta involvimus.

Bis quotidie Dominus *Haffner* in has fistulas & sinus vilenissima tenue infusum cicutæ injecit.

Ægra vero mane & vesperi sumfit sex pilulas.

Primo statim die dolores mitigabantur, & ægra sine opio dormivit, quod ante nunquam factum erat.

Tertio die advertit chirurgus has fistulas jam minorem injectionis copiam recipere.

Decimo die ægra bene habuit, & omnia videbantur sanari.

Decimo quarto die vix amplius binæ unciaë poterant injici.

Ægra in dorso tensiones, ad sternum ardorem & in faucibus siccitatem conquerebatur.

Hinc suasi, ut chirurgus ab injectione

ne infusi cicutæ abstineret , & solum decoctum hordei cum melle rosaceo lenissima manu injiceret.

Hoc facto, intra octiduum omnia sanata sunt , & fistulæ firmas egerunt cicatrices.

Hæc scœmina dein adhuc sex septimanis in nosocomio morata est , & nequaquam vidimus malum recrudesce.

CASUS DECIMUS SEPTIMUS.

Vir, cui ex quartana , subito suppressa , durities, unam spithamam longa , & semi spithamam lata , ex anteriore abdominis parte nata est , his solis pilulis , & interpositis quandoque purgantibus, spatio quatuor mensium in nosocomio integre curatus est.

Binos adhuc similes casus in meo nosocomio habui, quorum curatio his pilulis optime successit.

Imo

Imo eædem pilulæ fcirrhum hepatis solverunt, & inde natum icterum fugarunt; verum copiosum serum lactis simul potabatur.

Dum autem post febres intermittentes lien inflatur, & substantia ejus spongiosa redditur, tunc similes pilulæ ad curationem parum conferunt; neque alia medicamenta juvant.

CASUS DECIMUS OCTAVUS.

In viro quinquagenario, ex cataracta in ambobus oculis cæco, & in meo nosocomio ex acuta convalescente, pilulæ hæ tantum effecerunt, ut intra duos menses non modo solus ambulare, sed & objecta, & colores potuerit distinguere.

CASUS DECIMUS NONUS.

Virgini , 22. ann., ex incipiente in utroque oculo cataracta, visus adeo debilis factus est, ut jam citra summam adtentionem vix amplius sola incedere potuerit.

Ex usu autem harum pilularum intra binos & dimidium menses cataractæ penitus dispulsæ sunt, & visus adeo bonus rediit, ut jam fila per subtilissimarum acuum foramina ducat, & neat accuratissime.

Dominus *Leber* hanc Virginem ad *Illustrissimum* VAN SWIETEN adduxit, ut *Ipse* historiam audiret, & videret effectum.



CASUS VIGESIMUS.

Fœmina, 25. ann., strumam scirrham habuit, quæ non tantum anteriorem colli partem occupavit, sed & in cavum pectoris penetravit, & respirationem fecit difficilem.

Ufu harum pilularum, spatio quatuor mensium struma partim suppuratione, partim benigna resolutione consumpta est, & respiratio reddebatur liberrima

Simel sanatum est profundum & malignum in femore sinistro ulcus, quod hucusque omnium medicamentorum viribus repugnavit, & diligentissimum mei nosocomii chirurgum *Haffner*, ultra semi annum defatigavit.

Hæc sunt experimenta, quæ ego integro cum successu institui: alia quidem plu-

plura possem recensere, verum, quoniam ad finem perducta non sunt, ea potius silentio prætereunda putavi.

Ne autem mea solummodo tentamina adducantur, & ne ego solus *Cicero* pro domo mea videar, alia quoque, a *Vivis* in arte dignissimis facta, paucis juvabit enarrare.

Erant tres sorores, quarum binæ a glandulis colli tumidis & scirrhosis suffocatae sunt, tertiam autem *Illustriss. nostræ Facultatis Præses Baro VAN SWIETEN* his pilulis fervavit, restituit.

In simili casu, ubi omnia fere artis auxilia frustra sunt exhausta, & ubi ipsa vis electrica sine effectu fuit adhibita, *Perillustis ac celeberrimus Archiater KESTLER* ex usu harum pilularum egregium quoque effectum habuit; & nullum

unquam malum symptoma observavit , longo licet tempore quotidie ægræ suæ triginta pilulas , quarum quælibet duorum granorum fuit , exhibuerit.

In nosocomio militari, hic Viennæ in Leopoldina sito, erat miles, cui ex parotide dextra scirrhus tantæ molis excrevit, ut totam ejus lateris faciem ad oculum usque occuparit.

Scirrhus hic summo dolore, colore livido & subnigro, aliisque pessimis signis tetrum cancrum minitabatur, & inde timendam tabem.

Doctissimus medicus castrensis *Joannes Collmann*, qui huic nosocomio præerat, meas pilulas tunc in usum vocavit, & externe apposuit fomentum ex cicuta.

Quo factò, non solummodo cancri minas brevi suppressit, sed & tumorem scirrhus-
rho-

horum fere totum intra aliquot septimanas dissipavit.

Bonus miles, exiguas scirrhi reliquias flocci faciens, jam non amplius in nosocomio morari voluit, unde cæteroquin sanissimus adivit exercitum.

Nobilissima matrona occultum cancrum in ambabus mammis per tres annos celavit.

Tandem dolores facti sunt nimium vehementes, hinc inde in mammis tubera livida prodierunt, quæ pessimam cancri exulcerationem præsagiebant.

His commota Expertissimum hujus civitatis medicum practicum *Josephum Pöck* advocavit, eique suum malum detexit; qui his visis statim concluferat meas pilulas adhibere; quibus id effectum est, ut intra tres septimanas non

tantum omnes dolores cessaverint, sed & color subniger, & lividus disparuerit, redieritque color naturalis.

Post aliquot dies tubera recesserunt.

Sesqui mensis spatio mammarum durities in superficie cœpit mollescere.

Post binos menses magna duritie i portio in minores moleculas dividebatur, quæ dato purgante evanuerunt, & mammarum moles imminuta est.

Hæc matrona, viso tam præclaro effectu, diligentissime & summa cum confidentia has pilulas assumsit; atque testata est, quod non tantum in mammis sentiret levamen, sed quod etiam a vomitu & cardialgia, qua antehac aliquoties de die vexabatur, ut & a doloribus rheumaticis, quibus frequenter fuit subjecta, ex usu harum pilularum esset libera.

Opti-

Optimo in progressu hujus experimenti morbus acutus inflammatorius supervenit, qui lethalis fuit.

Sanguis, in morbo acuto aliquoties e vena missus, semper lardaceus, & valde densus fuit; hinc non est, cur quidam timeant, has pilulas sanguinem in putridum liquamen convertere.

Per plures septimanas hæc matrona quotidie triginta pilulas assumpsit, nec unquam quid mali inde conquesta est.

Ferdinandus Leber, chirurgus nosocomii civici, qui non solum ob egregiam suam in chirurgia experientiam & dexteritatem, sed & ob promptum erga pauperes æque ac divites officium summo opere est laudandus, his pilulis multa quoque experimenta fecit.

Pertinacissimos scirrhus in diversis corporis partibus resolvit.

Cancros plurimos non modo in mam-
mis sed & in facie, ad oculos, nasum
&c. emendavit, & quosdam integre
curavit.

Omnes suos ægros sub cura Illustris-
simo VAN SWIETEN ostendit, ut Is cer-
tus esset de effectu.

Idem *Leber* in variis oculorum vitiis
has pilulas bono cum effectu adhibuit,
in malis autem inveteratis plerumque
frustra fuit. Tentare tamen licet.

Nihilominus mecum observavit Do-
minus *Leber*, quod omnes ii, qui in
cataracta, aut alia humorum in oculis
inspissatione his pilulis usi sunt, sub usu
peiores non sint facti, licet curam non
receperint.

Hinc

Hinc similibus malis hæ pilulæ saltem limites ponunt, & experientia docuit, quod tunc binæ, mane & vesperi sumtæ, sufficiant.

Effectus autem quandoque valde tardus est, & tertio quartove mense primo fit sensibilis; hinc non illico est desperandum, si intra paucas septimanas ab his pilulis nil mutatur.

Dum hæc scribo, me accedit fœmina (30. aliquot ann.) quam doctissimus ac dextrissimus nosocomii ad S. *Marcum* chirurgus *Rechtberger* tribus abhinc mensibus ad me misit.

Hæc ab aliquibus annis scirrhum in mamma sinistra habuit, qui usu diversorum medicamentorum cœpit vehementer dolere, & minitari cancrum.

Re bene considerata statim ter de die exhibui tres pilulas.

Intra paucos dies sedabantur dolores, scirrhus autem immutatus perstitit.

Sensim pilularum dosin auxi; donec ægra octodecim per diem assumfit; hac ratione in undecimam septimanam continuatum est; & tunc nullam adhuc mutationem in schirrho inveni.

Hinc ego de effectu dubitavi; ægra tamen contenta, quod dolores filerent, pilulis diligentissime usa est.

Decima tertia septimana scirrhus coepit emoliri, in partes dividi, & tam subito fundi, ut spatium decem dierum vix amplius $\frac{1}{2}$ supersit, & quod superstes tangitur, molle est, & pasta-ceum.

CAPUT III.

COROLLARIA.

Corollar. 1.) **E**x his colligitur, e fucco cicutæ, lento igne inspissato, parari remedium maxime innocuum, quod in omni temperamento, ætate, sexu &c. ad satis magnam dosin potest exhiberi.

Corollar. 2.) Hoc remedium nullam corporis actionem, secretionem aut excretionem turbat.

Corollar. 3.) Agit modo insensibili, nec alvum, nec vomitum, nec urinam, nec sudorem movet.

Corollar. 4.) Indurata & scirrhusa in iis etiam calibus resolvit, ubi alia medicamenta, maxime penetrantia, nihil efficiunt.

Est igitur medicamentum summe resolvens.

Corollar. 5.) Quæ non resolvit, ea plerumque ad benignam suppurationem redigit.

Corollar. 6.) Cancro ponit limites.

Corollar. 7.) Acre cancrosum emendat, foetorem dispellit.

Corollar. 8.) Ichorem cancrosum in bonum pus convertit.

Corollar. 9.) Sedat dolores.

Corollar. 10.) Cancrum curat.

Corollar. 11.) Ulcera alias insanabilia sanat.

Corollar. 12.) Fistulas & sinus, ad omnia alia remedia rebelles, claudit, consolidat.

Corollar. 13.) Tumores ædematosos usu externo dissipat.

Corollar. 14) Visum, cataracta nondum inveterata, demtum quandoque restituit.

Corollar. 15.) Incipientes cataractas aut solvit, aut earum progressum saltem impedit.

MONITA

Usus docuit :

1^{mo}. **F**œminas, quæ scirrho aut cancro in mammis laborant, omne manuum exercitium, & celeriores corporis motum debere evitare.

2^{do}. Aërem tamen rusticanum, & leniorem in illo motum curam accelerare.

3^{tio}. Nocere iram, tristitiam, & subitum terrorem.

4^{to}. Nocere acida, vinosa, austera, & farinacea, cruda, non fermentata.

5^{to}. Nocere in scirrho inveterato, & cancro omnem adtritum, frictionem, & pressionem.

Hinc duræ & angustæ thoraculæ, & aspera indusia sunt vitanda.

6^{to}. Nocere violentam tussim: etenim ea cancrum excitat, aut reddit pejorem, producit hæmorrhagias, vires debilitat, & hac ratione curam retardat, & fere impossibilem facit.

Fœminæ, quæ difficilem habent respirationem, & anhelant, atque inter tussendum in cancrosa aut scirrhusa mamma acutissimos dolores sentiunt, mammamque quasi chorda violentissime constringi & tussi intra pectus trahi putant, plerumque habent pulmones scirrhusos, & ea in parte cum pleura firmissime concreto.

Hinc

Hinc cura difficilior & fere impossibilis.

Experientia didici has pilulas phthi-
ficis nullo modo obesse, nec impedire
sputa, sed ea potius promovere.

Q U A E S T I O N E S,

In multis casibus solum succum cicutæ
in pilulas redactum hucusque tentavi,
ut hoc modo accuratæ experirer, quid
hic solus & simplex posset præstare.

Verum quandoque vidi effectum esse
celerem, quandoque admodum tardum:
unde quæritur an in tarda hujus medi-
camenti actione non possit externis re-
mediis effectus diversa ratione accele-
rari?

Quæstio 1^{ma}. An non conveniret ali-
quoties per diem ad partem affectam ca-
lidos vapores decocti cicutæ adplicare?

Quæ-

Quæstio 2^{da}. An fors esset utilius, si cataplasma ex cicuta paratum læsis partibus continuo applicaretur?

Plura experimenta demonstrarunt simile fomentum in his circumstantiis valde utile esse.

Sunt tamen ægri, qui hoc nudæ cuti applicatum ferre non possunt, hinc:

Quæstio 3^{tia}. An non præstaret horum ægrorum cutim emplastro diapompholygos tegere, & tectam tali cataplasmate fovere?

Quæstio 4^{ta}. An, dum scirrhum adhuc irritare licet, non prodesset, si emplastrum de cicuta, de ladano, aut de galbano apponeretur?

Quæstio 5^{ta}. An non requiritur, ut sub usu pilularum ægris, quorum vires id fere videntur, sæpius detur purgans?
etenim

etenim materies soluta, nulla sensibili evacuatione, educitur.

Tentamina, circa hanc quæstionem in aliquibus ægris facta, simile quid suadere videntur; interim tamen necessitas id non postulat.

Quæstio 6^{ta}. Si casus obvenirent, in quibus acre cancrosum admodum profundas egit radices; omnesque humores corrumpit, & solida adeo debilitavit, ut hæ pilulæ solæ haud sufficerent; an tunc non oporteret corticem peruvianum hisjungere? ut hac ratione ex utriusque virtute pararetur medicamentum, quod omni indicationi faceret satis.


Neceffe est igitur ut quivis medicus symptomatibus supervenientibus singulari sua industria & judicio obveniat.

His

His præmissis, jam omnes & singulos medicos oro, ut hoc extractum, quacunque data occasione, tentent & adhibeant; sed obsecro simul, ut omne præjudicium omneque invidiarum genus deponant: etenim cogitent similia salutem proximi adtinere.

Si ex usu quid sinistri experiantur, inquirent sedulo, an id ex nimia mali vehementia? an ex errore, ab ægro aut adstantibus commisso? an ex ipso medicamento proficiscatur? Nec ilico sine omni judicio & disquisitione remedium, tanquam nocivum aut iners, condemnent; si vero noverint meliora, ea non vellem, in favorem hujus remedii, neligerent.





ANTONII STÖRCK,

SACRÆ, CÆSAR. REG. APOST. MAJESTATIS CONSILIARII AULICI,

ARCHIATRI, ET IN NOSOCOMIO CIVICO PAZMARIANO PHYSICI,

LIBELLUS
SECUNDUS,

QUO CONFIRMATUR:

CICUTAM

NON SOLUM USU INTERNO TUTISSIME EXHIBERI, SED ET

ESSE SIMUL REMEDIUM VALDE UTILE IN MULTIS

MORBIS, QUI HUCUSQUE CURATU IMPOSSIBILES

DICEBANTUR.



VINDOBONÆ,

TYPIS, JOANNIS THOMÆ TRATTNER, CÆSAR. REGIÆ

MAJESTATIS AULÆ TYPOGR. ET BIBLIOPOLÆ.

MDGCLXI.



AUGUSTISSIMÆ
ROMANORUM
IMPERATRICI
MARIÆ THERESIÆ,
&c. &c. &c.

DOMINÆ,
SUÆ CLEMENTISSIMÆ

ANTONIUS STÖRCK



AUGUSTISSIMA ROMANORUM
IMPERATRIX!



*Summa TUA Clemencia, qua primum de
cicuta libellum accepisti, me incitavit ad hunc la-
) 3 bore*

borem ulterius continuandum,
perficiendum.

Nova itaque tentamina cum eadem planta institui, morborum historias & curationes magna diligentia adnotavi, & ex his secundum hoc volumen composui.

Valde

*Valde utilia continentur, &
demonstratur evidenter : posse
dirissimos morbos sola cicuta le-
vari, curari.*

*Multi nunc servantur ægri,
qui sine hoc remedio interiis-
sent.*

Cum vero omnia TIBI
AUGUSTISSIMA DOMI-
NA! sint grata, quæ in emo-
lumentum reipublicæ fiunt ,
spem habeo : fore , ut & hocce
opusculum, TUÆ MAJES-
TATI sacrum , benigne re-
cipias.



PRÆFATIO.

Quo sæpius cicutam ægris exhibeo,
eo majorem semper in hac planta
virtutem & efficaciam admiror.

Innumeri fere sunt morbi, in qui-
bus optime convenit, conducit.

Nihilominus nequaquam opus est,
ut multa cicutæ encomia hic recitem,
cum ipsa experimenta, accuratissime
instituta, loquantur.

Gratulabar mihi frequenter, & gau-
debam multum, dum vidi, ægros ab
aliis pro perditis habitos jamque fato
re-

relictos, mea cicuta revixisse, & con-
valuisse integerrime.


Quidne homini sanitate charius?


Impendam propterea omne tempus,
quod mihi a labore necessario super-
fuerit, ad eruenda & detegenda talia
remedia, quæ morbos graves & curatu
summe difficiles debellarent, fugarent.

Nec inani felicitis successus spe alor.

Nil tamen, quod temerarium fo-
ret, audebo: sed omnia & in brutis &
in me experiar, antequam ea homini
ægotanti præbuero.

Et hac ratione ero tutus, securus.





CAPUT I.



ariæ inter Medicos & Botanicos ortæ sunt lites de cicutâ,

quam ego ad extractum faciendum adhiberem.

Descriptionem ex *Morifono* dedi, satis claram.

Hinc tantum paucis nunc adnoto: meam cicutam esse *cicutam majorem, vulgarem, maculatam, fœtentem.*

Linæus eam habet sub nomine *coniiseminibus striatis*. Vide species plant. pag. 243. N. 1.

A

Matbio-

Mathiolus eam describit pag. 772.

C. Bauhin. pag. 160. *Tabern.* p. 1170.

Cicutariam majorem, vulgarem eam vocat *Clusius* hist. 2. p. 200.

Ad extractum faciendum optime colligitur, antequam pandantur flores.

Radix autem ad extractum non adhibetur; verum reliqua tota planta.

Succus expressus in vase terreo, vitrato, lento igne, & sæpius agitando coquitur ad spissi extracti consistentiam.

Rogo autem, ne pharmacopœi nimium sint solliciti in depurando hoc succo; amo enim potius, ut sit crassum, fere pulposum extractum.

Ex decocto herbæ siccæ potest quidem parari extractum, dum ex recenti haberi non potest.

Verum longe minus efficax est.

Doleo

Doleo summopere, centenas aliquot libras extracti cicutæ, ex herba sicca parati, me incio, Vienna in alias regiones esse transmissas; etenim effectus neque adeo bonus, neque ita velox esse potest, ut ab extracto ex succo, recenter expresso, parato.

Hæc herba omnibus Pharmacopœis erat suspecta, virofa; hinc sub initium nolebant sufficientem, quam petii, copiam, parare.

Dum vero viderunt, pilulas in omnes regiones desiderari, defecit eis herba recens.

CAPUT II.

CASUS PRIMUS.

Ancilla, 22. annorum, a primis suæ ætatis annis scirrhis glandula-

A 2

rum

rum circa aures & maxillam tumoribus laboravit; quinquennio autem abhinc oriebatur tumor magnus, qui se ex gena sinistra per totum ejusdem lateris collum usque ad claviculam extendit, & semper lapidis instar durus & indolens fuit.

Ultimo triennio hicce tumor mole caput viri sensim adæquavit. Glandulæ subaxillares quoque induratæ sunt. Præterea dextrum colli latus quindecim scirrhi, quorum minimus ovo galinaceo par erat, occuparunt, mamma utraque scirrhusa quoque facta est.

Quamvis hæc fœmina esset valde defœdata, luem tamen veneream contraxit.

Deferebatur ideo ad nostrum nosocomium.

Deco-

Decoctis antivenereis, & purgantibus, dulci mercurio mistis, morbum tunc aggressus fui, unde quædam luis venereæ symptomata mitiora fiebant.

Quum autem hæc cura nimium tarda mihi videbatur, dedi mercurium sublimatum corrosivum, in spiritu frumenti solutum, præter decoctum saturatum & copiosum radicis bardanæ.

Hac ratione morbus venereus spatio quinque septimanarum optime curatus est.

Verum circa tumores scirrhosos nil mutatum fuit, nisi: quod in mamma dextra major dolor adverteretur.

Curata igitur lue venerea ad scirrhos dissolvendos volui transcendere, ast femina noluit amplius in nosocomio morari, firmissime persuasa, quod nullum foret

medicamentum , quod tumores adeo magnos & annosos solveret.

Quapropter dimittebatur. Verum vitæ lubricæ assueta sibi sufficienter cavere non potuit , unde in crimine deprehensa, ad carceres ducebatur.

Incidit tunc in febrem continuam, & denuo ad nostrum nosocomium translata est.

Sumtis remediis antiphlogisticis intra quindecim dies ex hoc morbo convaleuit.

Amavit postea potius remanere in nosocomio , quam iterum ad carceres deduci.

Hinc optimam nactus sum occasionem cicutæ vires experiundi.

Externe in principio nil adplicui, ut viderem : an usu solo interno in

hos

hos pertinaces tumores cicuta quid posset.

Propinavi mane & vespere pilulas quatuor, quarum quaelibet habuit pondere grana duo.

Post quinque dies, jam omnes tumores erant magis mobiles, & tumor magnus ex latere colli sinistro tangebatur multo mollior.

Vidi igitur cicutam solo usu interno esse admodum efficacem, & præstare talia, quæ a fortissimis mercurialibus nequaquam poterant effici.

Ut tamen curationem facerem celeriore, externe omnes tumores emplastro de cicuta texi, & huic imposui cataplasma ex herba cicutæ paratum, auxique dosin pilularum.

Decimo die tumor magnus erat mul-

to minor, mollior, idem in utraque mamma vidi.

Reliqui autem scirrhi, quamvis molliores, minores tamen facti non sunt, & erant in superficie inflammati, dolentes.

Decimo septimo die tumor in parte colli sinistra erat multo minor, mamma utraque mollis, mobilis, reliqui plurimi scirrhi in suppurationem abire cœperunt.

Ægra sumsit sex pilulas mane & totidem vesperi, quarum quælibet habuit grana quatuor.

Vigesimo quarto die quidam scirrhi jam erant in pus soluti, cutis tamen arte non scindebatur, quoniam rupturæ erat proxima.

Colli

Colli tumor, & mammæ erant multo minores.

Sequentibus diebus, quidam tumores rupti sunt, & fuderunt pus bonum, copiosum; nihilominus emplastrum de cicuta & cataplasma sedulo applicata sunt.

Trigesimo sexto die in aliquibus locis omnis tumor abfuit, & quibusdam in partibus cutis rupta jam iterum cœpit coalescere, colli & mammarum scirrhusi tumores $\frac{2}{3}$ erant diminuti.

Dedi deîn quater per diem pilulas quinque, granorum quatuor, nec amplius auxi dofin.

Et hac ratione usu emplastri, & cataplasmatidis de cicuta, & usu extracti cicutæ spatio trium fere mensium hæc foemina integre curata fuit. Collum &

mammæ redierunt ad statum naturalem, & foemina, antehac turpis & difformis sat formosa facta est.

Menses debito tempore & sufficienti copia semper fluxerunt, & iis fluentibus medicamenta cum euphoria continuata sunt.

Bis toto curationis tempore datum est purgans antiphlogisticum, quoniam alvus erat segnis.

Ufu extracti cicutæ nullæ prorsus in corpore turbationes observatæ sunt, ægra semper appetiit, robusta fuit, nec de ullo dolore conquerebatur.

Lætabar multum, dum vidi morbum adeo rebellem & pertinacem sola cicuta facillime esse curatum.

Et quum toto curationis tempore hæc ægra honeste & pie se gessit, promisit.

fitque talis vitæ perpetuam continuationem, feci, ut adhuc in nosocomio fui criminis absolveretur, & donaretur libertate.

CASUS SECUNDUS.

Fœmina, 36. annorum, ad nostrum nosocomium suscipitur propter mammæ sinistræ tumorem ingentem, & duri-
ritiem valde dolentem.

Dum mammam bene consideravi: inveni eam capite infantis multo majorem, duram, immobilem, in tubera livida, submollia & admodum dolentia elevatam, venæ erant varicosæ, & brachium sinistrum tumuit, & præ dolore non potuit moveri.

Externe tunc mollissima linteamina applicui, ut omnis affrictus evitaretur, interno pro remedio dedi extracti cicu-

tæ mane & vesperi grana duodecim præter infusum hederæ terrestris.

Quarto die, quo hæc ægra his remediis utebatur, mamma tota fuit mollior, ast tubera erant majora, & ichorem sudarunt. Dolores præterea fuerunt magni, & noctes debebant opio pacari.

Septimo die eadem erant symptomata, dedi tunc mane & vesperi extracti cicutæ grana octodecim.

Nono die tria mammæ tubera rupta sunt, & exiit materies subfusca, copiosa, foetens, & mammæ moles concidit, & dolores remisierunt.

Undecimo die copiosus ichor foetidus effluxit, dolores autem erant mitiores, color mammæ rutilus, nullus aderat livor.

Dedi

Dedi mane & vesperi scrupulum unum extracti cicutæ.

Decimo quarto die ulcera dederunt copiosissimum ichorem; mammæ molles fuit minor, ægræ autem vires multum diminutæ sunt, subinde advertēbatur horror per totum corpus, & subsequēbatur pulsus celerior, sitis & calor.

Diminui igitur dosin extracti, & tantum grana decem mane & totidem vesperi exhibui; verum dedi præterea corticis peruviani selecti drachmam unam omni trihorio diei.

Decimo sexto die horrores erant minus frequentes; ichoris loco prodiit pus, vires autem manserunt adhuc debiles, & ægra sitivit. Iisdem remediis adhucdum continuavi.

Vigesimo primo die nullus amplius horror advertebatur, vires auctæ sunt, & rediit appetitus, pus ex mamma profluens erat bonum, mammæ color fuit fere naturalis. Tumor autem superstes erat adhuc valde durus, nequaquam vero dolens.

Eadem ratione adhuc per sex dies continuavi, verum omnia manserunt in eodem statu.

Unde vigesimo septimo die, dedi iterum mane & vesperi grana octodecim extracti cicutæ, & bis per diem drachmam unam corticis peruviani, externe autem tunc applicui cataplasma ex lacte & cicuta paratum, & mammæ cavitates linteis carptis, infuso cicutæ madidis, repletæ sunt.

Trigesimo sexto die vires erant bonæ, color mammæ naturalis, in ulcere pus bonum, appetitus magnus, somnus tranquillus. Abstini a cortice peruviano, & sola cicuta iterum usus fui. Dedi mane & vesperi scrupulum unum extracti cum aliquot unciis infusi flor. samb. fol. veron. heder. terrest.

Quinquagesimo die moles mammæ fuit multo minor, pus bonum, dolor autem erat subinde adeo acutus, ut noctes, dato licet opio, inquietæ fuerint.

Verum observavi post magnos tales dolores copiosissimum serum ex ulcere fluxisse, & tumoris molem esse imminutam.

Dedi tunc drachmam extracti cicutæ per diem, externis fomentis ex cicuta sedulo continuavi. Se-

Sexagesimo quarto die mammæ ulcus copiosissimum serum fudit, labia autem, quæ hucusque erant valde rebellia, crassa, callosa, reflexa, cœperunt emolliri, fundi, & partim pure confumi, vires manserunt bonæ.

Auxi extracti dosin, & exhibui quotidie grana octuaginta.

Mammæ ulcus copiosissimo sero semper stillavit, pus autem bonum tunc visum non est; verum neque fœtor observabatur.

Septuagesimo die ægra siccitatem pectoris, & tusficulam inanem conquerebatur, mammæ autem & labiorum moles multo minor fuit, dolores per vices erant admodum vehementes, & vires iterum decrescebant, & aderat ingens fœtor.

De-

Denuo igitur ad corticem peruvianum confugi, & dedi quotidie unciam dimidiam corticis, & drachmam dimidiam extracti cicutæ.

Præterea jussi, ægra biberet copiosum serum lactis aut decoctum saturatum radicis althææ, glycyrrhizæ.

Labia texi emplastro de cicuta, ulcus autem implevi infuso leni cicutæ, cujus libræ uni addebantur drachmæ duæ aceti lithargyrii.

Vires sensim iterum auctæ sunt, tussicula defuit, nimius ichoris fluxus minuebatur, & pus in ulcere bonum comparuit, dolores autem subinde erant vehementes, & somnus debebat opio conciliari.

Octuagesimo quarto die ægra sat bene se habuit, labia ulceris erant mi-

nora, mobilia, doloris expertia, ulcus mammæ mundum, durities minor, dolores exigui, vires sufficientes, appetitus bonus.

Dedi tunc scrupulos duos extracti cicutæ per diem & drachmas duas corticis peruviani præter copiosum serum lactis, & decoctum emolliens; externa remedia non sunt mutata.

Nonagesimo die mammæ moles fuit multo minor, labia læte rubebant, & erant flaccida, ulcus dedit pus bonum.

A cortice peruviano tunc abstinui, & dedi drachmam integram extracti cicutæ.

Centesimo die omnia iterum erant meliora, pus bonum, vires sufficientes, noctes tranquillæ.

Dedi dein scrupulos quatuor extra-

cti

eti cicutæ, & reliqua omnia sedulo continuata sunt.

Centesimo decimo quarto die labia erant sordida, copiosum serum ex ulcere fluxit; verum mammæ moles fuit minor, dolores pauci, vires bonæ.

Dedi drachmam unam & dimidiam extracti cicutæ per diem, toti autem ulceri & labiis imposui cataplasma ex cicuta paratum,

Intra quatuor dies ex labiis magna frustra ceciderunt, ulcus dedit copiosissimum ichorem, unde mammæ & labiorum tumor citissime diminutus fuit.

Verum ægræ vires prosternebantur & nova iterum febricula orta est, & sæpius advertiebantur horripilationes.

Hinc dedi iterum corticis peruviani unciam dimidiam per diem, & scrupu-

lum unum extracti cicutæ, labiis imposui emplastrum de cicuta, & ulcera replevi linteis carptis infuso leni cicutæ & aceto lithargyrii madidis. Præterea serum lactis copiosum, & decoctum radicis althææ & glycyrrhizæ datum est.

Centesimo trigesimo die paucum ex ulcere serum prodiit, pus autem bonum aderat & copiosum, labia erant parva, rutila, indolentia, vires meliores.

Eadem tamen corticis dosi continuavi, cicutæ autem extracti drachmam dimidiam exhibui, remedia externa adhuc eadem adhibebantur.

Centesimo trigesimo sexto die omnia erant meliora, vires bonæ, noctes tranquillæ.

Corticis peruviani dosin tunc diminui,

nui, & dedi drachmas duas, extracti autem cicutæ dedi drachmam unam cum copioso fero lactis, externa remedia continuata sunt.

Centesimo quadragesimo secundo die ægra bene habuit, labia fundebantur, & mera spongiosa substantia videbatur superesse.

Reliqui tunc corticem peruvianum, & solo extracto cicutæ, & copioso fero lactis usus sum, externe eadem remedia applicui.

Centesimo quinquagesimo die omnia iterum erant meliora, minora, pus in ulcere bonum, vires bonæ, dedi scrupulos quatuor per diem de extracto cicutæ, & externe cataplasma ex sola cicuta applicui.

Centesimo sexagesimo die labia fue-

runt exigua, fere cuti æqualia, durities fere omnis evanuit, vires constabant, dolores vix observabantur.

Dedi drachmam unam & dimidiam extracti quotidie, & cataplasma ex cicuta sedulo apposui per diem, noctu autem emplastrum de cicuta.

Centesimo septuagesimo die ulcus erat planum, omnis enim tumor, omnis durities abiit, labia erant penitus consumpta.

Per triduum adhuc applicui cataplasma ex cicuta, & eandem extracti dosin continuavi.

Dein vero, quum omne durum esset consumptum, & quoniam copiosum serum ex ulcere, quamvis puro, fluxit, externe tantum applicui lintea carpta lenissimo infuso cicutæ madida,
inter-

interne autem dedi ter de die drachmam dimidiam corticis peruviani, & mane ac vesperi grana sex extracti cicutæ, jussi præterea, ut copiosum serum lactis ægra biberet.

Glandulæ subaxillares, quæ etiam erant scirrhosæ, eodem fere tempore evanuerunt, tria tantum supererant tubercula, piso fere æqualia.

Brachium, quod prius præ dolore moveri non poterat, jam erat satis mobile, & vires bonæ.

Sexto die cœpit ex margine ulceris cuticula alba prodire, quæ se se sensim versus centrum extendit, promisitque ulceris consolidationem.

Decimo quarto die usu eorundem tum externorum quam internorum remedium, ulcus tenui cuticula jam fe-

re clausum erat; verum hæc cuticula hinc inde iterum rumpebatur, & exstillavit serum acre.

Dedi igitur purgans ex rhei drachma dimidia, ex scammonii granis octo, & ex quindecim granis salis polychresti.

Alvus inde sexies copiose mota est, & ægra bene habuit.

Altero a purgatione die eandem iterum dosin corticis peruviani, & extracti cicutæ exhibui, & externe adhuc lenissimum cicutæ infusum applicui.

Nata est firmior cuticula, quæ tamen hinc inde adhuc erodebatur a materie acri transsudante.

Hinc post octiduum idem purgans ægræ iterum datum fuit.

Dein vero corticem peruvianum & cicutæ extractum in eadem dosi continuavi

nuavi, & externe applicui unguentum nutritum.

Spatio viginti dierum firma nata est cicatrix & mammæ nullum supererat vestigium, atque omnes, qui hanc fœminam viderunt, credebant, mammam fuisse resectam.

Abstinui dein ab omni medicamento, & fœminam per 14. dies in nosocomio retinui, ut viderem: an denuo malum reverteretur.

Verum ægra optime movit brachium, & ulcus mansit firmissime clausum.

Dedi dein adhuc idem purgans, & & post tres dies sanissimam dimisi.

Dum mihi egit gratias, rogavit simul, ut darem licentiam me adeundi, dum quid in mamma adverteret, concessi

cessi hoc facillime, verum jam sex menses præterlapfi sunt, & foemina non rediit.

Dominus *Haffner*, egregius mei nosocomii Chirurgus, summa cum sedulitate, attentione, & experientia huic foeminæ succurrit, & remediis externis secundum rationem, & symptomata optime applicatis, plurimum ad curationem contulit.

CASUS TERTIUS.

Homo, 27. annorum, a longo tempore foedum cancrosum ulcus in regione lumbali sinistra habuit, hoc ulcus repfit continuo in latum & profundum, & jam coepit lumborum vertebrae arrodere. Præterea fungi cancrofi undequaque propulularunt.

Post.

Postquam diverſi & optimi chirurgi remedia maxime convenientia incaſum tentaffent, æger noſtrum noſocomium acceſſit.

Doctiſſimus Chirurgus *Haffner* remediis primo lenioribus, dein cauſticis, tandem ferro & igne conabatur fungoſum cancrum conſumere, ulcus depurare, & claudere.

Ego remedia, ſanguinis maſſam depurantia, quæ maxime conducerent, præſcripſi.

Subinde per unum alterumve diem quidquam nobis videbamus proficere; verum mox prius malum rediit, & quandoque fuit deterius.

Unde omnia fruſtra tentari vidi-
mus.

Cortex peruvianus, qui alias mira
præ-

præstitit in ulceribus putridis, magna dosi & longo tempore datus, nil effecit.

Quapropter cataplasma ex cicuta externe apposuit Dominus *Haffner*, & ego jussi, æger assumeret mane & vespere grana novem extracti cicutæ, & copiosum decoctum hordei, vel serum lactis biberet.

Æger antehac erat macilentus, debilis, & cachecticus, & circa vespertas habuit horrorem, febrem, & dein sudorem copiosum, defatigantem.

Verum nunc intra aliquos dies cœpit appetere, quiete dormire, & in ulcere pus bonum comparuit.

Octavo die jussi drachmam dimidiam extracti cicutæ assumeret, externe cataplasma sedulo renovatum est.

Duo-

Duodecimo die ulcus erat purum, fungi cancrofi mobiles, flaccidi, nullo modo dolentes, circa vertebrae quædam offium fragmenta separabantur.

Decimo septimo die nulla amplius ad vespere horripilatio observabatur, æger bene dormivit, nec sudavit, & vires quotidie auctæ sunt, in ulcere erat pus laudabile, e fungis circa ulceris margines copiosum serum fluxit.

Vigesimo die ex vertebrae arrosione plurima granula ossea separata sunt; hinc inde in ulcere incipiebat formari cicatrix, quoniam autem fungi erant flaccidi, nullo modo dolentes, & quoniam nimis lente consumebantur, & hac ratione ulceris consolidationem impediverunt, Dominus *Haffner* eos cultro rescidit.

Æger

Æger nullum inde dolorem sentiebat; medicamenta interna externaque continuata sunt.

Vigesimo quinto die undequaque ex ulceris margine nascebatur cuticula, & hac ratione ulcus in sanationem vergebat, color aderat læte ruber, pus bonum, paucum.

Vires ægri erant bonæ, appetitus bonus, noctes tranquillæ, alvus liberima.

Externa internaque remedia continuata sunt.

Trigesimo die ulcus jam fere totum erat clausum, nec ulli amplius fungi crescebant, æger optime habuit.

Quadragesimo die ulcus firmam habuit cicatricem, & æger sanus videbatur.

Nihil.

Nihilominus adhuc per quatuordecim dies mane & vespere dedi grana sex extracti cicutæ, & multum ferum lactis, ut hac ratione omne acre & cancrum ex sanguine separaretur.

Postea dedi purgans, & hominem sanum dimisi.

CASUS QUARTUS.

Fœmina, 36. annorum, ulcus fœdum in tibia dextra a pluribus annis habuit, adhibita remedia interna externaque ulcus quidem subinde fere sanarunt; dum autem proximum erat consolidationi, subito iterum ruptum est; copiosus, & acerrimus ichor effluxit, & crevit caro fungosa.

Balnea diversissima mineralia prodesse quandoque videbantur; verum mox iterum prius malum rediit.

In

In nostro nosocomio diversa tentavimus, quæ acre sanguinis corrigerent, externe carnes fungosas confumerent, & dein ulcus consolidarent.

Verum nullum habebamus successum.

Nam licet ulcus uno alterove die integre clausum esset, nulla tamen firma cicatrix inducebatur, unde brevi iterum ortus est pruritus, & transsudavit ichor, propulularunt carnes fungosæ & ulcus in pejus ivit.

Adhibebatur igitur solum infusum cicutæ pro fomento externo, & noctu ulcus emplastro de cicuta tegebatur, interne præter serum lactis datum est nihil.

Contigit tunc, ut carnes fungosæ
spon-

sponte separatae fuerint, dein ulcus intra viginti octo dies firmissima cicatrice obductum fuit, & pes poterat optime moveri.

Datum tunc est purgans, & relinquebatur foemina adhuc per octiduum in nosocomio absque omni medicamento; cum dein ulcus optime clausum videretur, ex nosocomio dimissa fuit.

CASUS QUINTUS.

Vir, 62. annorum, annosum & foedum ulcus habuit in regione abdominis dextra, quod erat unam spithamam longum, & septem pollices latum, profundumque adeo, ut fere in cavum abdominis penetrarit.

Ad thoracem sinistrum fere aequum magnum ulcus fuit, quod copiosum,
C fo-

foetens, & acre ferum fudit, & costas arrosit.

Dato purgante Dominus *Haffner* fomentum ex cicuta applicuit in utroque ulcere.

Quoniam æger simul tussi laboravit, datum ei est decoctum ex radice & foliis althææ, cui addebatur oxymel simplex, & stibium diaphoreticum non ablutum.

Intra paucos dies utrumque ulcus longe purius fuit, & bonum pus comparuit, & æger, antea debilis, videbatur recuperare vires.

Circa decimum diem ex costis cariosis multa fragmenta separabantur, & ex ulceris margine cœpit nasci cuticula alba.

Ulcus abdominis fuit minus profundum, & dedit bonum pus.

Decimo

Decimo quarto die præbui iterum purgans; dein cum eodem decocto althææ continuavi.

Decimo septimo die utrumque ulcus longe purius, & minus latum fuit, ex costis semper quædam fragmenta separata sunt.

Trigesimo secundo die ulcus thoracis erat clausum, & tussis fere omnis cessavit; ulcus abdominis vero erat adhuc satis magnum.

Id tamen quoque circa quinquagesimum diem solo usu externo cicutæ sanatum est.

Dabatur dein adhuc purgans, & bonus senex sanus ex nosocomio dimittebatur.

Narravit tunc, quod per decem circiter annos hæc ulcera habuerit, quod

fere omnes suos reditus in sanationem consumferit, quod tentata innumera remedia prorsus nil juverint, & quod sub finem, omnibus fere viribus exhaustus, ut ultimos finiret dies, esset ad nosocomium translatus.

CASUS SEXTUS.

Fœmina, 28. annorum, quatuor annis mammam finistram gessit magnam, lapidis instar duram.

Circa aëris & tempestatis mutationes vehementes in hac parte dolores sensit, quum autem hi dolores semper sponte cessarunt, & quum color marmæ mansit naturalis, nec tumor motum brachii impedivit, nullum applicuit remedium, neque ulli homini hanc mammam ostendit.

Deni-

Denique sub finem mensis Februarii 1760. morbo acuto afficiebatur, unde ad nostrum nosocomium translata est.

Intra viginti sex dies ex hoc morbo sat gravi cœpit convalescere.

Dum vero e lecto surrexit, & ambulavit, sensit dolorem continuum, rodentem, lancinantem in mamma dextra; cum tamen hicce dolor non erat adeo vehemens, eum per plures dies celavit.

Dein vero præ nimia doloris vehementia non potuit dormire, & amisit appetitum ac vires; monstravit propterea mammam Domino *Haffner*, & is me hac de re monuit.

Invenimus mammam durissimam, purpuream, nigris & lividis striis variegatam, intumuit simul brachium ejusdem

lateris; dolores erant enormes, rodentes, lancinantes, venæ erant nigræ, varicosæ.

Pulsus celer, parvus; cor continuo palpitavit.

Externe ilico applicuimus fomentum ex cicuta, pro interno autem remedio dedi emulsum leniter nitrosum, opiatum.

Eadem nocte mitigabatur dolor & sequebatur somnus sat tranquillus trium horarum.

Post somnum erant dolores iterum ingentes, & ex usu fomenti nil adhuc in mamma mutatum fuit.

Ut alvus solveretur injectum est enema, & dein continuabatur emulsum paregoricum, nitrosum.

Nox insequens fuit longe tranquillior,

lior, & dolores in mamma videbantur admodum mites, neque tamen color, neque durities, neque tumor mutatus fuit.

Tertio die quoniam pulsus sat bonus deprehensus est, dabantur mane & vespere grana octo extracti cicutæ, superbibendo aliquot uncias decocti althææ.

Sera autem vespera, ut nox esset tranquilla, datum est remedium pargoricum.

Nox tota erat quieta, & ægra somno multum reficiebatur.

Mane dolores fuerunt exguī, mamma erat mollior, & melius tulit rudiorē adtactum.

Brachium autem præ dolore & tumore nequaquam poterat moveri.

Duodecimo die jam nullæ amplius

striæ nigræ, aut lividæ aderant, venæ varicosæ erant vix non in statum naturalem contractæ, dolores fuerunt pauci, & tumor brachii quoque diminutus est.

Data tunc sunt grana decem extracti cicutæ mane & vesperī, fomentum ex cicuta sedulo applicatum est, vesperinum autem paregoricum mittebatur, quoniam ægra, a doloribus minus vexata, jam sponte cœpit dormire.

Vigesimo die color mammæ fuit fere naturalis; verum durities erat ingens, neque mamma erat mobilis, accreta videbatur, brachii tumor fuit multum imminutus, & ægra potuit digitos & manum citra dolores movere.

Dedi tunc extracti cicutæ grana triginta duo per diem, & fomentum sedulo

dulo continuatum est, noctu tegebatur mamma emplastro de cicuta.

Vigesimo tertio die mamma iterum rubuit, aderant ingentes dolores, qui ab eo tempore se se insinuabant, quo appositum est noctu emplastrum de cicuta.

Removi igitur emplastrum, & solo iterum fomento & cicutæ extracto usus sum; vesperi dedi paregoricum, ut nox esset quieta.

Trigesimo die mamma iterum habuit colorem naturalem, dolores fuerunt exigui.

Dedi per diem quadraginta grana extracti cicutæ, & fomentum continuatum est.

Quadragesimo die brachium totum detumuit, & sat bene poterat moveri,

mamma fuit minor, mollior, & mobilior.

Quinquagesimo die omnia iterum in mamma erant meliora; verum foemina a cibis abhorruit, & oris amarorem conquerebatur, & crura paulisper intumuerunt, concessi propterea, ut ab extracto cicutæ per aliquot dies abstineret, jussique, ut infusum florum sambuci copiosum biberet, fomentum autem ex cicuta continuatum est.

Quinquagesimo quarto die dedi purgans ex rheo, paucò scammonio, & sale polychresto.

Alvus inde quater mota est, & altero die viguit appetitus, & crurum tumor fere omnis disparuit; mamma fuit mobilis, nec doluit ab adtactu, per vires tantum advertiebantur lancinantes & vagæ punções.

Fu-

Fumo leniter aromatico feci dein crura fricari; ad mammam vero fomentum ex cicuta sedulo appositum est.

Sexagesimo die, quoniam ægra optime habuit, & crura erant naturalia, & appetitus bonus, dedi iterum extracti cicutæ mane & vesperi grana sex, & copiosum infusum florum sambuci.

Sexagesimo sexto die mamma in multa minora tubercula divisa videbatur, nec ullus aderat dolor.

Dedi tunc mane & vesperi grana decem extracti cicutæ, fomentum sedulo continuatum est.

Octuagesimo die mammæ moles fuit admodum exigua, brachium potuit citra omnem dolorem moveri, ægra sufficientes vires & bonum appetitum habuit, noctu quiete dormivit.

No-

Nonagesimo primo die pauca adhuc in mamma durities supererat, quæ in omnem partem poterat volvi; ægra autem ob continuam fomenti applicationem jam erat impatiens, neque ingratum odorem amplius poterat ferre, hinc illud removi, & ejus loco emplastrum de cicuta applicui, dedique mane & vespere grana quindecim extracti cicutæ.

Emplastrum jam nullos dolores excitavit; omnia quotidie in melius mutata sunt, & centesimo vigesimo quinto die mamma erat flaccida, pendula, nec minima tangebatur durities.

Discessit tunc hæc ægra ex nosocomio; jussi autem, ut aliquamdiu adhuc pilulis de cicuta in parva dosi uteretur, ut hac ratione malum tam facile non rediret.

CASUS SEPTIMUS.

Virgo, 21. annorum, cancerum apertum in mamma sinistra habuit, præterea tussivit frequenter, & conque- rebatur in thorace sinistro continuum ardorem, & dolorem erodentem.

Tota sanguinis massa erat corrupta, & ægra simul scabie laboravit, & erat penitus emaciata, & vespertino tempore quotidie sensit horrorem, & dein calorem, tandem sudorem foetidum.

Ulcus copioso ichore foetente manavit.

Pessimis his in circumstantiis tentavi cicutam, & statim dedi mane & vesperti octo grana extracti cicutæ, externe fomentum ex eadem cicuta applicui, præterea autem debebat ægra copiosum
serum

serum lactis aut lac purum, dupla aquæ copia dilutum, bibere.

Spacio duodecim dierum ægra melius habuit, minus tussivit, exacerbationes vespertinæ, & sudores nocturni fere cessarunt, vires auctæ sunt, in ulcere cancroso tenue pus comparuit, fluxus ichorosus imminutus est, nec advertebatur foetor.

Verum mansit in thorace ardor & dolor erodeus.

Dedi tunc quater per diem grana octo extracti cicutæ, & reliquis remediis continuavi.

Trigesimo die mammæ moles fuit multo minor, vires satis bonæ, ulcus purum, appetitus magnus, somnus autem, ob continuum ardorem sub mamma, erat sine opio turbatus, anxius.

Sca-

Scabies incipiebat exsiccare, & ægra potuit extra lectum esse.

Exhibui scrupulos duos extracti per diem.

Quadragesimo sexto die ægra sat bene habuit, mammæ moles fuit multo minor, & ulcus cœpit diminui.

Remansit autem ardor & dolor erodens in thorace sinistro, quamvis is per vices admodum exiguus fuerit.

Sexagesimo die mammæ durities fere tota evanuit, & ulcus fuit multo minus, purum.

Dedi tunc drachmam unam extracti cicutæ per diem, & reliqua continuata sunt.

Octuagesimo die omnis durities disparuit, & ulcus erat fere integre clausum.

Ar-

Ardor autem & dolor erodens in thorace sinistro per vices erant admodum sævi, & propterea noctes quandoque turbatæ sunt.

Vires erant utcunque bonæ; scabies integre disparuit, faciei color fuit fere naturalis; verum ægra mansit macilenta.

Octuagesimo quarto die sanatum erat ulcus, ægra extra lectum ambulavit, appetiit, & quandoque sine opio placidissime dormivit.

Comparuit tunc fluxus menstruus, qui jam per quinque menses siluit; lætabatur propterea hæc ægra, & speravit non absque ratione, ardorem & dolorem erodentem in thorace sinistro nunc cessaturum, quoniam is incepit, dum sanguis menstruus retinebatur.

Flu-

Fluxus per binos dies continuavit; tertio autem die sistebatur, & tunc ardor & dolor erodens in thorace sinistro ilico auctus est, & ægra iterum pejus habuit.

Quarto die ad inferiorem mammæ marginem ortum est tuberculum purpureum, & valde dolens.

Dominus *Haffner*, ut dolores mitigaret, adplicuit cataplasma emollientissimum.

Quoniam autem ægra magnam habuit sitim, & validam febrim, & pulsum durum, vena ipsi secta est, & data sunt decocta resolventia, antiphlogistica.

Paucum inde levamen sequebatur.

Sexto die ruptum est tuberculum & effluxit copiosus & acerrimus ichor.

Stylo tunc inducto in aperturam invenit chirurgus finem, qui sub muscu-

lo pectorali repfit fere usque ad superiorem mammæ marginem, ibique advertebatur costa arrosa; hinc, quum vires adhuc satis bonæ essent, finum totum partesque omnes superjacentes chirurgus perfcidit, ut videret, quousque costa esset corrupta.

Facta hac sectione ægra breve animi deliquium passa est, unde vulnus ligabatur, & omnia in diem posterum relinquebantur.

Vesperi aderat ingens febris, & magnus dolor, ideo remedia antiphlogistica, & emulsa paregorica ægræ data sunt, & nox fiebat satis quieta.

Altero a sectione die Dominus *Haffner* aperto iterum vulnere invenit plures costas arrosas, & aperturam aliam, quæ in pectoris cavum penetravit, &
per

per quam cussiendo ichor foetidus expellebatur.

Injectum tunc est in cavum pectoris decoctum hordei cum paucis melle rosaceo, ut ulcus mundaretur, & ut separatio impuri a sano fieret.

Emulsis nitrosis, paregoricis continuatum fuit, & ægra satis bene se habuit.

Circa vesperras autem quotidie orta est febricula, & noctu sequebatur sudor.

Quinto die quoniam apertura in cavum pectoris admodum parva erat, Dominus *Haffner* eam dilatavit, ut illud, quod in cavo continebatur, posset facilius effluere, & elui.

Octavo die quædam fragmenta ossæ post injectionem ex vulnere prodierunt, unde certum erat, costas interius esse quoque cariosas.

Multum igitur corticem peruvianum ægræ dedi, præter decoctum lignorum, & lac vaccinum.

Tentavimus tunc injectiones magis detergentes, balsamicas.

Verum has ægra non tulit, orta est febris major, & multus dolor, atque materies ex vulnere prodiens valde foetuit.

Hinc ab his abstinēbatur, & solum decoctum hordei cum melle iterum injectum fuit.

Separabantur subinde quædam ossæ fragmenta, quæ post magnam tussim per aperturam cum multo foetido ichore propellebantur.

Nihilominus ardor & dolor erodens nequaquam fiebant mitiores, imo in anteriore thorace se se magis extendērunt, & scēmina, licet magna corticis
peru-

peruviani dosi quotidie uteretur, debilis fuit, & febris vespertina aucta est.

Post longum igitur usum, dum vidimus hæc remedia parum juvare, conclusimus ego & Dominus *Haffner* in cavum pectoris injicere infusum cicutæ, & cortici peruviano jungere cicutæ extractum.

Altero die jam materies ex cavo pectoris prodiens non amplius adeo fœtuit, & dolor, ardorque paulisper imminuti sunt.

Post paucos dies videbantur vires augeri, & appetitus; & ægra noctu sat tranquille dormivit.

Dabatur quotidie uncia dimidia corticis peruviani, & extracti cicutæ scrupulus unus præter copiosum serum lactis.

Lene ab initio fiebat infusum cicu-

tæ pro injectione, quoniam autem vidimus id nec pulmones irritare, nec augere anxietates, & bonum præstare effectum, id saturatum dein adhibuimus.

Spatio quatuordecim dierum multa fragmenta ossea cum materie tenui, purulenta, ex cavo pectoris prodierunt, ægra multo melius se habuit, potuit extra lectum esse, & fere semper absque opio quiete dormivit.

Attamen sensim ab adeo magna corticis dosi abhorruit, unde drachmam dimidiam dedi quotidie extracti cicutæ, & tantum drachmas duas corticis peruviani.

His remediis, & copiosissimo fero lactis, & injectione, quæ bis quotidie fiebat cum saturato cicutæ infuso, hanc ægram per binos, & dimidium menses

con-

conservavimus, & jam aliquam curationis spem in sinu fovebamus.

Contigit autem tunc, ut ægra in pleuritidem pessimam, & fere lethalem incideret.

Nihilominus tamen Eruditissimus Dom. *Collin*, qui tunc nosocomii curam gessit, debitis venæ sectionibus, applicatis cataplasmatibus & præscriptis optimis remediis, effecit, ut dolor punctorius cessarit, & morbus sputis fuerit optime judicatus.

Et ægra post hunc morbum iterum vires mediocres recuperavit; materies tamen ex cavo pectoris prodiens multum foetuit, & ichorosa fuit.

Nequaquam tunc cortex peruvianus, neque cicutæ extractum, neque ejusdem infusum profuit; pessima fe-

bris vespertina iterum supervenit & sudor nocturnus miseram ægram ita defatigavit, ut intra septem septimanas, tota extenuata obierit.

Sectione anatomica invenimus pleuram in cavo pectoris sinistro fere consumptam, & costas plurimas in tenues lamellas corrofas.

Pulmo ejusdem lateris hinc inde quoque erat exesus.

Certo! si hoc ulcus externa in pectoris superficie fuisset, ubi manus chirurgica potuisset accedere, aptisque fomentis mali progressum impedire, & separationem cariosi adjuvare, hæc ægra & a pessimo cancro, & ab ulcere foedissimo fuisset optime curata.

In homine, 23. annorum, ex empyemate in cavo sinistro pectoris jam
mo-

morituro , me suadente Dominus *Haffner* lato vulnere puri exitum pandit, educitque puris tenuis , foetidi , libras quinque & dimidiam.

Anceps erat & audax consilium, verum quoniam æger jam fere suffocatus morti fuit proximus, licuit tale quid tentare , quoniam sæpius vidimus, audaci operatione nos hominum dies longiores , & minus acerbos reddidisse.

Educto pure æger pessime habuit, extrema fiebant frigida , evanuit pulsus, facies erat tota collapsa & sudore gelido , crasso, madida.

Doluimus finistrum operationis eventum, nil tamen negleximus, quod adhuc ægro profuturum videbatur.

Spiritu cornu cervi nares, tempora, frontemque bene perfricuimus; de-

dimus deglutiendam unciam unam vini austriaci & guttas sex spiritus cornu cervi, videbatur tunc anima redire, & deprehensus est ad carpum pulsus tremulus.

Æger cœpit oculos aperire, & anhelare.

Dedimus dein jusculi carniū aliquot uncias, & ægrum ad quietem disposuimus.

Verum mansit is anxius, & post horæ quadrantem æruginosa vomuit, & tunc denuo eum moriturum credebamus.

Sopito autem per remedium paregoricum vomitu, lenis somnus sequebatur.

Qui, quamvis nec diu duraverit, nec fuerit tranquillus, ægrum tamen aliquantulum refecit.

Altero die æger cœpit loqui, & oblata patienter assumsit. Domi-

Dominus *Haffner* cavum pectoris decocto hordei, & melle rosaceo bene eluit, ego autem præscripsi remedia, tunc indicata.

Intra quatuor dies æger iterum tantas vires habuit, ut se ipsum in omnem partem citra animi deliquium potuerit movere.

Dominus *Haffner* stylo in pectus penetravit, & advertit costas multas esse cariosas, tentavit propterea diversas balsamicas, detergentes, & vulnerarias injectiones, nullam autem magis utilem invenit, quam eam, quæ infusio cicutæ facta fuit, hæc enim pus laudabile fecit.

Vires ægri auctæ sunt, rediit appetitus.

Nocturnus sudor & vespertina febricu-

bricula aptis remediis mitigabantur, integre vero fisti non poterant.

Curationem perfectam sperare nunquam potuimus; verum erat nobis satis, dum hominem, jam fere mortuum, operatione audaci e mortis faucibus detraximus, & dedimus ei vitam longiorem & minus molestantem.

Injectione ex saturato infuso cicutaë, & remediis balsamicis, interno usu adhibitis, & paregoricis, & diæta lactea in septimum mensem hunc ægrum sat commode conservavimus, tunc autem tempore versus autumnum vergente coepit iterum fortius tussire, febricula vespertina aucta est, & intra triginta & unum dies contabuit.

Pulmo reperiiebatur plurimum exesus, & costæ cariosæ.

Mirum!

Mirum ! quod saturatum infusum cicutæ in cavum pectoris, & ad nudum pulmonem injectum nullas turbas, nullas anxietates &c. excitaverit.

Patet inde, cicutæ virus adeo tetrum non esse.

Atque ideo hunc casum hic inferui, quoniam cum priori quid commune habet.

CASUS OCTAVUS.

Homo, 27. annorum, a sex circiter annis gessit tuberculum ad linguæ radicem, quod per vices multo dolore afficiebatur, & deglutationem fecit difficilem, subinde tamen nullus ibidem dolor observatus est.

Hoc tuberculum sensim accrevit in nucis avellanæ magnitudinem; fuit totum lividum, & acutissime semper doluit.

De-

Demum ruptum est, & effluxit ichor acerrimus, foetidus, & oriebatur ulcus foedum, latum.

Deglutitio fuit admodum difficilis.

Quidam chirurgi & medici credebant ulcus esse venereum; hinc remediis antivenereis curam inchoabant.

Decocta plurima, varia purgantia, mercurio mista, tandem spiritum frumenti, in quo mercurius sublimatus solvebatur, æger longo tempore incassum assumpsit; imo malum auctum est.

Demum salivatione miser penitus extenuatus fuit sine morbi emendatione.

Quum hæc remedia maxime heroica nil effecerunt, æger fato relinquebatur; datum ipsi est testimonium, quod curari non possit, quodque deberet in domum incurabilium suscipi. Æ.

Æger tamen undique adhuc auxilium quæsit, & fere omnium chirurgorum portas pulsavit; verum vix non ab omnibus sine ope est dimissus.

Demum venit ad Dominum *Haffner*, chirurgum mei nosocomii, is re bene considerata statim cogitavit, cicutam hoc in ægro esse adhibendam.

Unde hunc hominem altero die, dum ad nosocomium veni, mihi ostendit.

Feci ilico, ut ipsi lectus pararetur, eumque in nosocomio retinui.

Erat autem totus emaciatus, vespere habebat horripilationes, dein calores; tandem sudore copiosissimo maduit, & somnus fuit anxius, inquietus.

Ulcus foedissimum fere totam linguæ radicem exedit, ex ejus margine & fundo

do variæ fungosæ excrescentiæ propularunt, quæ omnes erant exulceratæ, & foedissimum ichorem fuderunt.

Dolor aderat continuus, ardens & deglutitio fuit fere impossibilis, ulcus in profundum & latum continuo serpsit, æger non poterat distincte loqui.

Uvula, tonsillæ, & totæ fauces jam quoque afficiebantur, nam vidimus sat profundas erosiones, quæ acri humore stillare cœperunt.

Æger sæpius tussivit, & ex faucibus usque ad ventriculum magnum ac continuo prurientem ardorem conquestus est.

Ex ore prodiit foetor deterrimus, qui nobis insipientibus sæpius nauseam, & horrorem excitavit.

Status sane hujus ægri erat maxima commiseratione dignus. Eru-

Eruditissimus Dominus *Collin*, medicus, qui mecum tunc nosocomium adivit, hunc quoque ægrum vidit, dubitavimus certo, an in casu adeo inveterato, & desperato cicuta quidquam posset præstare.

Interim tamen præter hanc nullum nobis supererat remedium, quod jam non fuisset tentatum.

Prima erat indicatio, ut ulcus fordidum purgaretur.

Rogavi propterea Dominum *Haffner*, ut leni manu ope syringæ aliquoties per diem infusum cicutæ, melle rosarum mistum, ad fauces, & ulcus injiceret, & hac ratione sensim fordes & acrimonias ablueret.

Pro medicamento dedi misturam sequentem:

E

R. Ex-

℞- Extract. cicut. gr. x.
mucilag. gum. traga. dr. β
Syrup. diacod.
unc. j.

aq. flor. samb. unc. v.

m. f. *Sumat æger omni bihorio cochleare
unum.*

Potus ordinarius erat serum lactis,
cibus autem jusculum cum pane, pa-
natella, hordeum mundum &c.

Prima nocte æger jam longe tran-
quillius dormivit.

Altero mane ulcus nec ita foetuit,
nec adeo sordidum fuit.

Verum loquendi, & deglutiendi dif-
ficultas æque magna mansit.

Iisdem remediis internis, externis-
que continuatum est.

Tertio die ardor in faucibus, & per
totum

totum œsophagum multum remisit, ulcus erat longe purius, nec ullus fere fœtor observabatur.

Eandem adhuc misturam præbui, extractum cicutæ solummodo auxi, & scrupulum integrum immiscui.

Sexto die jam potuit solidiora citra multum dolorem deglutire, ulcus cancrosum fuit satis purum, faucium ulcera jam incipiebant levi cicatricula obduci, & ardor per œsophagum vix amplius percipiebatur.

Iisdem remediis continuatum est.

Undecima die circa vesperras fere nullæ aderant horripilationes, nec multus calor, & nocturnus fudor vix non penitus desiit.

Ulcus cancrosum ichoris loco pus exhibuit, nec aderat multus dolor dum

æger solida deglutivit, levissimus tantum foetor advertebatur; æger longe distinctius loquebatur, vires habuit multo majores, & bonum appetitum, faucium ulcera jam plurima erant clausa, & subinde tantum levis in œsophago ardor perceptus est.

Iisdem medicamentis continuatum fuit.

Decimo quinto die ulcus cancrosum optimum habuit colorem, fungosæ excreſcentiæ erant multo minores, nec amplius ichorem plorarunt, & ex ulceris ambitu tenuissima, & albicans nascebatur cuticula, quæ spem primam veræ curationis adtulit, & ostendit, cancro serpenti limites esse positos.

Fauces erant sanatæ, abfuit in œsophago omnis ardor, æger habuit bonas
vires

vires, nec pejora observabantur symptomata circa vespervas, nec sudor nocturnus.

Exhibui tunc quotidie mane pilulas octo, granorum duorum, de extracto cicutæ, & totidem vespери, & desuper feci hauriri copiosum serum lactis, injectiones ad ulcus continuabantur.

Die vigesimo omnia iterum erant meliora, ulcus cœpit longe minus fieri, excrescentiæ fungosæ plurimæ sponte separabantur, nullus aderat foetor, nec ichor, sed pus bonum.

Noctes fuerunt quietæ, vires auctæ sunt, & viguit appetitus.

Die trigesimo ulcus fuit sat purum, plurimæ excrescentiæ jam erant separatæ, reliquæ autem, superstites, erant flaccidæ, pallidæ, nec ex adtactu do-

lore afficiebantur, æger vinum purum bibit absque dolore in ulcere.

Dedi tunc per diem scrupulos duos extracti cicutæ, & copiosum serum lactis, & infuso cicutæ ulcus sæpius per diem ablutum est.

Trigesimo quarto die famem ingentem habuit æger, & propterea oblata avidissime sine debita masticatione abligurivit.

Onerabatur inde ventriculus, & postero die aderat nausea, horror, continuus vomendi conatus, præcordiorum anxietas, vertigo, labii inferioris tremulus motus, calor magnus, pulsus inæqualis robore & celeritate, respiratio brevis, anhelosa, facies tumida, livida.

Dolebam tunc summopere, spem curationis

rationis hac ratione esse diminutam, & ægrum in summum vitæ periculum conjectum.

Maxime urgens indicatio erat, ut ventriculus ab onere suo liberetur, dedi igitur grana viginti pulveris radices ypecacuanhæ, & granum unum tartari emetici.

Vix dato pulvere, sequebatur ilico vomitus materiæ crudæ, incoctæ, vomitum potu copioso aquæ tepidæ faciliorem reddidi.

Æger hac ratione sexies vomuit cibos, avide deglutitos, multumque serum flavum, quod acidum spiravit.

Post vomitum mala Symptomata fere omnia evanuerunt, solo tenui jusculo eo die æger nutriebatur, vesperti datum est paregoricum.

Nox fuit tranquilla.

Mane pulsus æqualis, lentus, parvus deprehendebatur, nec æger quidquam præter debilitatem conquestus est.

Ulcus tunc iterum erat fordidum, magis doluit, nec tamen deglutitio inde multum læsa est; solo infuso cicutæ, & melle rosarum sæpius per diem lenissima injectione abluebantur fordes.

Grato julapio, diæta convenienti, pauco vino, & paregorico vespertino vires tunc reficere conabar.

Die trigesimo nono æger sat bene se habuit, & ipse rogavit, ut pilulæ de cicuta denuo darentur.

Dedi tunc per diem scrupulos duos extracti de cicuta, & copiosum serum lactis, ad prandium concessi vinum.

Res quotidie iterum in melius mutata

tata est, & ulcus optimam curationis spem præ se tulit.

Quoniam omnia tunc secundum vota procedebant, non auxi amplius dosin extracti, lenes injectiones ad ulcus, quæ solo infuso cicutæ fiebant, sedulo & sæpius per diem repetitæ sunt.

Quinquagesimo die paucae adhuc aderant fungosæ, flaccidæ, pendulæ excrescentiæ, quæ ulceris consolidationem retardarunt.

Has Dominus *Haffner* absque ægri dolore refecuit forfice. Sectione nullus prodibat sanguis.

Injectiones diligenter peractæ sunt, quoniam magnum levamen, & egregiam opem ægro adtulerunt.

Loquela fuit liberrima, deglutitio bona, vires integræ, somnus optimus,

appetitus magnus, alvus naturalis, urina copiosa, bene colorata.

Iisdem strenue continuatum est, & sexagesimo octavo die ulcus erat cicatrice obductum.

Ab injectionibus tunc abstinencebatur, verum extractum cicutæ eadem dosi adhuc per quatuordecim dies datum est.

Dum autem videbamus firmissimam esse cicatricem, & hominem esse integre sanum, sensim omne remedium seposuimus, & concessimus, ut in aerem liberum se conferret, & ea ederet, quibus antea fuerat assuetus.

Eum tamen sanissimum adhuc per quatuor septimanas in nosocomio retinimus.

Dein autem ipse petiit, ut dimitteretur.

Dominus *Collin* toto curationis tem-

pore hunc ægrum vidit, & mecum observavit.

Magno nobis sæpe solatio fuit, dum vidimus hunc hominem ab omnibus desertum, & pro incurabili habitum, ope cicuta non tantum a vespertina febre, a sudore nocturno, a tabe & cachexia esse liberatum, sed & a pessimo cancro curatum, & optime restitutum.

Post aliquot septimanas ex relatis audivi, eum iniisse matrimonium.

CASUS NONUS.

Vir, 42. annorum, a pluribus annis habuit dolorem vagum arthriticum, noctu hicce dolor calore lecti multum augebatur.

Longo tempore diversissima decocta, aliaque remedia interna & externa adhibuit, nec ullum inde levamen sentiebat.

Ne-

Neque balnea fulphurea aliaque diversissimi generis, longo tempore adhibita, quidquam profuerunt.

Tandem materies vaga figebatur ad humerum dextrum, & ad coxendicem ejusdem lateris.

Unde pedi, & brachio mobilitas demebatur, minuta est ejus lateris sensibilitas, & accessit macies.

Varia iterum interne externeque tentata nihil juverunt, imo auxerunt dolores, & videbantur malum reddere pejus.

Neque vis electrica, per trimestre spatium applicata, in hoc homine quidquam mutavit.

Æstate præterita, dum ruri degebam, me accessit, narravitque mali historiam.

Cau-

Causam & veram morbi originem ignoravit.

Quoniam ego multis in ægris vidi cicutam contra dolores rheumaticos, & arthriticos vagos, & fixos multum valuisse, credidi eam & in hoc casu statim esse adhibendam.

Dedi tunc mane & vesperi quinque pilulas, granorum duorum, & copiosum decoctum radicis bardanæ.

Post octiduum rediit, & conquerebatur majores ad humerum & coxendicem dolores, & ingratam per totum brachium, & pedem formicationem.

Cæteroquin nil mutatum est.

Suasi tunc, ut mane octo pilulas de cicuta fumeret, & totidem vesperi, utque decoctum bardanæ continuaret.

Decimo quarto die dolores erant mino-

minores, verum in toto latere affecto, ut & in pede & brachio percipiebatur fudor pruriens, foetens, & oriebantur pustulæ albicantes, pellucidæ, acri sero plenæ.

Sensibilitas jam longe major advertebatur.

Appetitus fuit bonus, vires sat magnæ, fluxit urina copiosa, quæ prodeundo ardorem in urethra excitavit, alvus fuit naturalis.

Tunc æger per diem cœpit viginti pilulas sumere, & continuavit decoctum radicis bardanæ.

Vigesimo quarto die carnes in brachio videbantur redire, & jam quædam advertebatur mobilitas.

Reliqua erant in priori statu, pustulæ autem semper copiosiores compa-
ruerunt, nec desit pruritus. Tri-

Trigesimo sexto die æger per universum corpus ingratum ardorem & pruritus conquerebatur, & oriebantur ex ruptis pustulis crustæ crassæ, & vera scabies superveniebat.

Verum pes & brachium erant longe mobilia, sat robusta, optime sensibilia.

Curavi totum corpus infuso cicutæ, quod lacte fiebat, bis quotidie lavari.

Intra paucos dies crustæ plurimæ ceciderunt, pustulæ autem hinc inde longe frequentiores comparuerunt, & pruritus augebatur.

Quinquagesimo die jam poterat moveri brachium in omnem partem, pes autem ægro videbatur adhucdum gravis, cæteroquin autem erat mobilis, flexilis & omni in loco aderant optima sensationis signa. Dedi

Dedi tunc per diem drachmam integram extracti cicutæ, & loco decocti bardanæ exhibui serum lactis, præterea tamen infuso cicutæ, lacte facto, corpus quotidie bis lavabatur.

Spatio octidui omnis pruritus cessavit, disparuerunt pustulæ & omnes crustæ, & æger cœpit optime convalere.

Sexagesimo nono die æger potuit ambulare, & brachium in omnem partem movere, neque ex itinere unius & dimidiæ horæ multum defatigabatur.

Sensim tunc iterum cicutæ dosin minui, feri lactis vero ingentem quotidie copiam bibere ægrum jussi, corpus non amplius lavabatur.

Octuagesimo die sanissimus me iterum accessit, egitque gratias.

CASUS DECIMUS.

Virgo, 18. annorum, spina ventosa jam a septem annis ad tarsum pedis dextri & ad cubitum brachii dextri laboravit; tentata remedia, alias in similibus morbis maxime laudata, nil profuerunt.

Decoctis lignorum copiosissimis per multos menses usa est, & eliciebatur inde copiosus sudor, malum sub initium videbatur levare; dein vero tussis sicca vexabatur ægra, cœpitque debilitari, & emaciari, & malum iterum pejus factum est.

Data sunt remedia antiscorbutica, & multum serum lactis, & ulcera inde fere sanata sunt.

Verum dum maxima curationis spes erat, ortus est novus circa partes affe-

ctas dolor, cœpit iterum ichor acerri-
mus effluere, & orta sunt denuo ulce-
ra foedissima.

Mercurius sublimatus corrosivus in
spiritu frumenti solutus, qui alias simi-
libus in morbis optimos effectus præstat,
hic nil effecit.

Dedi igitur extractum cicutæ & co-
piofum decoctum hordei crudi cum pau-
co lacte.

Exterius ad ulcera & tumores so-
lum emplastrum Diapompholygos ap-
plicui, ut certus essem de effectû, quem
cicuta interne data in simili morbo ha-
beret.

Intra quatuor dies ulcera alias fœ-
da, & foetida jam puriora erant, & pus
bonum esse cœpit, & dolores multo mi-
tiores fuerunt, & somnus fuit tranquil-
lior, & appetitus major. Sexto,

Sexto, septimo, octavo, & nono die copiosum serum acre ex ulceribus exstillavit.

Duodecimo die videbantur ossei tumores multo minores, & color profunde ruber cœpit in naturalem mutari.

Decimo quinto die ex ulcere in tarso pedis dextri tria ossium fragmenta separata sunt.

Decimo septimo die ulcus ad tarsum pedis dextri erat purum, & ex margine incipiebat nasci cuticula, quæ sanationem promisit, tumor ossium affectorum circa hoc ulcus fuit multo minor.

Verum ad cubitum brachii dextri ulcus & tumor vix mutatus deprehendebatur, & aderat multus dolor, effluxit copiosum serum, motus tamen articulationis videbatur paulo faciliior.

Applicui igitur fomentum ex cicuta, ulceri autem in tarso imposui emplastrum de cicuta.

Vigesimo quarto die tumor circa articulationem cubitus dextri fuit multo minor; & ulcus purum, effluxitque serum copiosum, & materies granulosa ex ossibus separabatur.

Ulcus ad tarsum pedis dextri multo minus fuit, tumor fere totus concidit, & omnia brevem sanationem promiserunt.

Trigesimo quarto die ex osse humeri circa articulationem cubitus dextri longum & magnum osseum fragmentum secessit.

Tumor circa articulationem multum diminutus est, & ægra jam facile flexit brachium, & ori cibos admovit.

Ex

Ex ulcere ad tarsum pedis dextri multum iterum serum fluxit, & prodierunt valde exigua ossium fragmenta, & ægra majorem dolorem conquesta.

Interim vires auctæ sunt, appetitus viguit, & ægra fuit alacrior, pinguior.

Quadragesimo octavo die ulcus in pedis tarso erat penitus clausum, nec ullus fere tumor amplius advertebatur, nec dolor.

Circa articulationem cubitus brachii dextri omnia erant quoque meliora.

Dedi tunc ægræ purgans, quod octo vicibus alvum copiosam, subflavam movit.

Altero a purgante die ægra quievit, & nil assumsit.

Sequentibus autem diebus ite um

dedi cicutæ extractum , & copiosum ferum lactis.

Quinquagesimo sexto die ægra multo melius se habuit , brachium potuit flectere , & in omnem partem movere.

Ulcus in tarso mansit firmiter clausum.

Septuagesimo secundo die omnia , quæ alias tuebant , ad statum naturalem redierunt , & ulcus circa cubitum brachii dextri erat fere consolidatum.

Quoniam articulationis motus fuit satis liber , nec ossa amplius tumuerunt , credidi tunc , non amplius necesse esse , ut hæ partes undequaque fomento involverentur , ulcus tantum linteis carptis infuso cicutæ madidis Dominus *Haffner* replevit , deligavit.

Nonagesimo die coaluit ulcus ad
cubi-

cubitus, nec ex nata cicatrice brachii flexilitas impediabatur.

Per duodecim dies adhuc præbui huic ægræ cicutam, & copiosum ferum lactis, dein dedi purgans, & quoniam vidimus hanc esse integre sanam, & ulcera esse optime sanata, dimisimus eam e nosocomio.

CASUS UNDECIMUS.

Homo, 35. annorum, foedissima ulcera serpentia ad tarsum utriusque pedis, & intra scapulas a binis annis habuit.

Præterea corpus totum pustulis prurientibus, & acerrimo fero plenis erat oblitum.

Ulcers ichorem acerrimum plorant continuo, partes vicinas arrosere,

& omnia ad ossa usque & tendines consumserunt.

Variis usus remediis, & balneis nullum fere levamen percepit, aut si ulcera videbantur sanationi proxima, mox iterum in pessimum statum mutata sunt.

Æger inde debilitatus est, coepit extenuari, & incidit in sudores nocturnos.

Demum me in consilium vocavit, & quum multiplici experientia edoctus fui, cicutam sanguinis acrimoniam corrigere, & ulcera similia sanare, præscripsi pilulas de extracto cicutæ, & decoctum radicis bardanæ.

Spatio octo dierum pruritus per universum corpus fere omnis cessavit, & plurimæ pustulæ evanuerunt, neque ulcera adeo copiosum ichorem dederunt.

Vige-

Vigesimo die æger fuit multo robustior, sudor nocturnus non amplius advertebatur, & ex margine ulceris nascebatur alba cuticula, quæ cicatricem formaret.

Dedi tunc purgans antiphlogisticum.

Dein jussi, ut æger cicutæ extractum & decoctum bardanæ iterum continuaret.

Jam sumsit quotidie drachmam dimidiam extracti cicutæ.

Trigesimo sexto die æger sat bene valuit, & ulcera erant fere clausa.

Tendines nudi antea in ulceribus comparuerunt, nascente tamen cicatrice eorum motus non fuit impeditus.

Quadragesimo octavo die ulcera erant cicatrice tenui obducta, hæc ut firmior fieret, applicui unguentum nutritum.

Dedi iterum purgans antiphlogisticum.

Sexagesimo die ulcera videbantur firmissime consolidata, & homo erat optime sanus.

Suasi tamen, ut mediocri dosi cicutam adhuc per tres septimanas fumeret, & biberet desuper infusum florum sambuci, dein præscripsi iterum purgans, ut hac ratione & sanguis, & primæ viæ ab omni acri & crudo essent liberæ.

Ex usu cicutæ hicce homo longe meliorem in facie colorem obtinuit, muscoli omnes alias flaccidi nunc erant firmi,

firmi, fortes, & totus homo fiebat ex pinguedine quadratus.

CASUS DUODECIMUS.

Faber ferrarius foedissimo morbo cutaneo, qui ab elephantiasi non multum abludebat, jam a decem annis laboravit.

Omniū fere medicorum, chirurgorum, balneatorum & argyrtarum opem imploravit, remedia maxime heroica longo tempore assumsit, & balnea diversa mineralia, & vaporum applicuit; verum vix unquam levabatur, potuit tamen suos labores peragere.

Neque foeda hæc scabies in facie aut manibus comparuit, sed iis tantum in partibus, quæ veste tegebantur.

Unde potuit cum aliis ejus fociis
con-

conversari, nunquam tamen in eodem lecto cum iis decubuit.

Quum autem tentatis fortissimis medicamentis vidit, malum nequaquam emendari, noluit amplius consilium medicum petere, & reliquit rem soli naturæ, & omnia, quæ palato arrisere, comedit, strenue bibit, neque tempestatis vicissitudines evitavit.

Pejus inde non habuit.

Contigit autem, ut hyeme præterlapsa frigori subito expositus in pleuritidem inciderit.

Translatus est propterea ad nostrum nosocomium.

Vena debebat iteratis vicibus secari, verum cutis erat adeo dura, & tenax, ut chirurgus non potuerit penetrare nisi magna vi, & multa adtentione.

San-

Sanguis vena missus erat vere pleuriticus.

Decoctis emollientibus , expectorantibus , mellitis , nitrosis , morbus sat gravis spatio quatuordecim dierum spuito judicabatur.

Decimo octavo die dedi purgans & tunc homo videbatur iterum sanissimus.

Malum tamen cutaneum acuto hoc morbo nequaquam mutatum est.

Putavi tunc cicutam hoc in morbo pertinacissimo esse tentandam.

Suasi igitur , ut adhuc maneret in nosocomio , promissique sanationem.

Exhibui ilico grana decem extracti cicutæ tempore matutino , & totidem vespери & simul dabatur copiosum decoctum radicis bardanæ , & glycyrrhizæ.

Præ-

Præterea autem bis quotidie lotum est totum corpus anatica parte aquæ, & lactis tepidi, in cujus mensuris duabus solvebatur uncia una saponis veneti.

Spatio decem dierum multæ squammæ ceciderunt, rugæ fuerunt molliores, & lenissima advertēbatur transpiration.

Cutis antea aspera, rugosa, foedissime squammosa, dura, cornea fere, & insensibilis, nunc ex adtactu paulo rudiori doluit.

Undecimo die jam cœpit dimidiam drachmam extracti cicutæ spatio vintiquatuor horarum exhibere, decoctum bardanæ, glycyrrhizæ, & lotiones continuatæ sunt.

Decimo septimo die fere omnes
squam-

squammæ jam erant separatæ, & rugæ cutis sensim applanatæ sunt.

Æger autem vagos calores & anxietates conquerebatur, pulsus tamen fuit æqualis, non febrilis, vires bonæ, appetitus magnus, urina prodiit copiosa, acris, & alvus quotidie ter vel quater sponte fluxit fœtida, biliosa.

Æger e levi adtactu iis in partibus, ubi squammæ hæserunt, ardorem, & dolorem percepit.

Eadem dosi & iisdem medicamentis, tunc adhuc jussi, pergeret.

Vigesimo sexto die corripiebatur horripilatione, dein calore, & magnafiti, sequebaturque valida febris.

Oculi rubuerunt, lingua fuit sicca, urina flammea, & cutis totius corporis levi phlogosi tendebatur, nec minimum

mum adtactum tulit citra magnum dolorem & ardorem.

Abstinui ilico ab usu cicutæ, & dedi copiosum rob sambuci, nitrum, & decoctum hordei crudi.

Alvus inde aliquoties mota est, neque vires ægri multum diminutæ sunt, symptomata sensim omnia remiserunt, & trigesimo quinto die cutis habuit colorem fere naturalem, rediit appetitus, & pulsus fuit æqualis, lentus.

Diæta molli tunc vires ægri restauravi, pro medicamento & potu ordinario dedi infusum florum sambuci, quod fero lactis fiebat.

Quadragesimo nono die cutis tota fuit fere naturalis; verum mansit semper magis sensibilis, quam alias esse solet.

Vires

Vires tunc æger bonas habuit, optime appetiit, quiete dormivit, urina prodiit optime colorata, & alvus bene cocta.

Quum autem in cute variæ pustulæ comparuerunt, quæ pruritus excitarent, & ruptæ fuderunt serum acre, credidi: ad sanguinem magis depurandum cicuta adhuc dum utendum esse.

Feci igitur, æger mane & vespere assumeret grana decem de extracto cicutæ, & biberet copiosum serum lactis.

Quorum usu spatio quatuordecim dierum integre sanatus fuit.

Epidermis tamen mansit admodum tenuis, & rumpebatur a minimo adtuitu.

Verum hoc incommodum sustulit bal-

G

neum

neum Badense, quo hicce homo per tres septimanas utebatur.

Post hujus usum optime sanus, & habens cutim, & epidermidem penitus naturalem, me accessit, gratias acturus.

CASUS DECIMUSTERTIUS.

Fœmina, 42. annorum, sanissima alias, septem abhinc annis (causam ignorat) cœpit fluore albo continuo laborare, & ab eo tempore nil sanguinis menstrui amplius comparuit.

Materies ex utero prodiens sub initium lenta, mucosa, subalbida fuit, in hypogastrio autem advertebatur tensio, & dolor punctorius, vagus.

Præterea urina subinde tenesmo retenta, aut difficilis reddita est.

Ufu balneorum, & variorum remedio-

diorum spatio novem mensium hic fluxus suppressus fuit.

Verum mansit in hypogastrio tensio, & dolor punctorius, & sæpius observatus, est urinæ tenesmus, & vagi calores frequenter caput turbarunt, supervenerunt leves leipothymiaë, & fere quotidie versus vesperras spinam dorsii horror perrepsit.

His symptomatibus solo decocto althææ medebatur ægra.

Per integrum fere quinquennium malum fuit satis mite, ægra habuit vires, & poterat suos labores peragere.

Dein autem erodentes orti sunt dolores, hypogastrium tensum ex minimo adtactu valde doluit, & demum retenta est urina, & alvus.

Enematibus emollientissimis, & si-

milibus fomentis tandem cœpit urina prodire acris, turbida, & alvus dura, nigra, globosa.

Levamen inde habuit ægra, recuperavit iterum suas vires, & potuit extra lectum esse.

Externo adtactu deprehendebatur in medio hypogastrio tumor durus, in quo continuus percipiebatur dolor ardens, erodens, pungens.

Atque ideo hæc fœmina balneo emollientissimo quotidie per binas horas infedit, & octavo die, quo hoc balneo utebatur, prodiit ichor subfuscus, acer, foetidus, & dolores ardoresque inde levabantur.

Simili balneo adhuc per quatuordecim dies usa est, & multo melius inde se habuit; etenim hypogastrium

fat

fat rudem adtactum sine dolore tulit, & ægra potuit ambulare absque molestia.

Verum fluxus ichoris acerrimi semper factus est copiosior, & erosa est uteri vagina, & vulva.

Hinc remedia externa internaque applicata fuerunt.

Per aliquot dies ægra subinde sibi levata videbatur, & fluxus fuit admodum mitis.

Dein autem aucti sunt iterum dolores, supervenit febris, retenta est urina, hinc enematibus & fomentis urinæ viæ iterum debebant liberari, & inde ichoris fluxus copiosior fuit.

Sensim ægra debilitata est, coepit vespertino tempore horripilationes conqueri, dein calores, & noctu copiose sudavit.

Tentata quæcunque , nil juverunt; imo dolores semper fiebant magis vivaces, pertinaciores, & materies magis foetuit, & fuit acerrima.

A medicis relicta demum ad nosocomium venit, tota emaciata, cachectica.

Tentavi omnia remedia, quæ in similibus casibus profuisse, alias vidi.

Præterea decoctis demulcentibus, & diæta molli conabar involvere acrimoniam.

Vires videbantur paulisper augeri, & mens fieri alacrior; verum febris vespertina, & sudor nocturnus continuarunt.

Neque imminuti sunt dolores, neque fluxus mitior redditus.

Hinc, quum adverti, me remediis
usita-

usitatis actum agere, transivi ad usum cicutæ.

Dedi autem simul decoctum saturatum radicis althææ, & leni infuso cicutæ, quod lacte factum est, curabam sæpius per diem vulvam, & uteri vaginam elui.

Intra paucos dies magna fiebat mutatio, remiserunt dolores, febris vespertina erat mitior, somnus magis tranquillus, sudor minus copiosus, neque materies, utero effluens, adeo foetuit.

Decimo octavo die jam dedi nycthemeri spatio viginti quatuor grana de extracto cicutæ.

Symptomata omnia fere quotidie in melius mutata sunt; dolores tamen subinde adeo vivi fuerunt, ut opio debuerint sopiri.

Trigesimo die dolores erant enormes, urentes, accessit febris, fitis, & multum imminutæ sunt vires.

Removi ilico extractum cicutæ, non tamen cicutam propterea damnavi.

Venam ægræ secui, & solum decoctum emollientissimum cum nitro & melle exhibui.

Externe applicabatur cataplasma emolliens.

Dum hæc febris accessit, filuit omnis fluxus uteri, urina reddebatur difficilior, non tamen penitus retenta est.

Sanguis, e vena missus, fuit spissus, phlogisticus.

Mala hæc symptomata absque omni fere remissione in quartum diem durarunt, ægra sæpius sensit horrores.

Quarto die debilis admodum fuit
ægra,

ægra, pulsus sæpius intermifit, observabantur frequentes caloris colorisque in facie mutationes.

Demum versus vesperas, prægresso magno horrore, & sudore frigido & levi animi defectu mucus prodiit ex utero, mistus striis sanguineis, & advertebatur magnus foetor.

Hinc omnes gangrænam lethalem adesse clamitarunt.

Verum post mediam horam prodiit multum pus, & ægra se levatam sensit, & nox fuit quieta, & bono somno dein reficiebatur.

Altero mane eam inveni alacrem, & pulsum habuit naturalem, puris fluxus mediocris continuavit.

Solum iterum radicis althææ decoctum tunc sine nitro exhibui, verum

junxi simul pilulas ex olibano, mastiche, sarcocolla, & mucilagine gummi tragacanthæ confectas.

Dolores circa uteri regionem pauci fuerunt, neque ulla amplius durities tactu observata fuit.

His folis medicamentis, & diæta molli spatio duodecim dierum puris fluxus integre curatus fuit, & auctæ sunt vires.

Quum tamen cessante puris fluxu per vices adhuc ichoris stillicidium animadvertebatur, & ægra subinde dolores pungentes, vagos in utero conquesta est, pilulas balsamicas seposui, & earum loco dedi extractum cicutæ.

Cujus efficacia dein intra tres septimanas ægra integre sana fuit.

Etenim fuit torosa, robusta, agilis

lis , nil conquerebatur , uteri omnis fluxus filuit, urina prodiit sine molestia, appetitus fuit bonus , somnus tranquillus, reficiens.

CASUS DECIMUS QUARTUS.

Fœmina, 48. annorum, a quindecim circiter annis fluorem album habuit , & quamvis remedia ab optimis artis magistris præscripta , longissimo tempore assumerit, malum tamen aut mansit in eodem statu , aut in pejus mutatum fuit.

Dum vidit, idem esse, five adhiberet medicamenta , five ea negligeret (imo ex usu medicamentorum subinde debilitata est, & pejus habuit) mutavit consilium , & morbum soli naturæ commisit.

Per undecim annos fuit sine remedio ,

dio, dein vero fluxus menstruus retentus fuit, qui antehac & debito tempore, & sufficienti copia semper comparuit.

Orti tunc sunt acutissimi in utero dolores, & simul advertebatur continuus ardor, materies effluens, antea benigna, lenta, mucosa, nunc tenuis fuit, & viridescens, & foetuit.

Multorum medicorum open tunc ægra imploravit, adivit chirurgos, consuluit vetulas, ast medicamenta potius molestiæ, quam levamini fuerunt.

Misera sensim in pessimum statum redacta fuit.

Dolores & ardores aderant continui, & hi versus vesperas aucti sunt, præter ichorem putridissimum effluxit subinde sanguis foetidus, dissolutus & prodierunt
frusta

frusta fibrosa, corrupta, subnigra; vagina uteri & vulva sensim exulceratæ & exesæ sunt, & ægra emaciata vix se erectam potuit sustinere.

His in miseriis eam ad nosocomium suscepimus.

Rogavi Dominum *Haffner*, ut partes genitales, quantum possibile esset, digitis & oculis lustraret.

Invenit tunc vulvam exesam, vaginam exulceratam, & os uteri erat sat durum, dolens, & fortiori pressione prodiit sanies.

Consului, ut bis quotidie injectiones in vaginam fierent ex leni infuso cicutæ cum paucis melle rosarum, & sexta parte lactis.

Præterea copiosum decoctum involvens, demulcens, emolliens, mistum
cum

cum tertia parte lactis recentis datum est.

Spatio sex dierum foetus multum emendatus fuit, & ægra videbatur aliquantulum refici.

Dedi tunc præter decoctum demulcens extractum cicutæ, & injectiones in vaginam fuerunt continuatæ.

Omnia symptomata sensim in melius mutata sunt, ichoris loco tandem effluxit mucus subpurulentus, dein nil amplius comparuit.

Et spatio undecim septimanarum foemina integram sanitatem recuperavit.

Ultra drachmam dimidiam extracti cicutæ non opus fuit dare per diem, quoniam hæc dosis sufficienter omni symptomati ivit obviam.

Ab injectionibus tunc cessatum est,
dum

CASUS DECIMUS QUINTUS. III

dum incipiebat materies benigna comparere.

Abluta tamen aliquoties per diem sunt pudenda, ne & illud benignum intra plicas stagnans acrimoniam contraheret.

CASUS DECIMUS QUINTUS.

Fœmina, 52. annorum, a longo tempore dolore continuo rodente in utero vexabatur.

Fluore simul albo laboravit, qui sensim adeo malignus factus est, ut materies effluens non tantum partes genitales corroderet, sed & ipsa linteamina, quibus excipiebatur, brevi reddiderit friabilia.

Fœtor præterea tantus fuit, ut & maritus eam fugerit, & omnes fœminæ, quibus alias familiariter utebatur, evitarint ejus consortium. Post

Postquam plurimam bonorum suorum partem frustra in sui curationem consumsit, meum tandem auxilium quaesivit.

Jussi, ut serum lactis biberet, & ablueret partes circa pudenda leni infuso cicutæ, & lacte, addito paucò melle rosarum.

Quoniam autem conquerebatur, noctes esse maxime inquietas ob enormes in utero ardores, præscripsi pulverem ex drachma dimidia lapidum cancerorum & ex grano uno opii, ut quotidie, cubitum itura, similem pulverem fumeret.

Somnus inde longior & tranquillior factus est, & augebatur appetitus; imo & vires majores videbantur, & mens alacrior.

Coete-

Cæteroquin autem nil mutatum fuit.

Exhibui tunc præter ferum lactis extractum cicutæ, & vespertinos pulveres continuavi.

Spatio quatuordecim dierum dolores adeo mitigati erant, ut paregorico vespertino opus non amplius fuerit, materies utero prodiens non amplius ita fœtuit, nec adeo acris fuit.

Urina autem retinebatur.

Abstinui tunc per aliquot dies ab extracto cicutæ & dedi misturam sequentem:

℞. Lap. canc unc. j.

vin. austriac. montan.

lib. j.

m. f. *sumat ægra quater per diem co-
gbleare unum.*

H

Hæc

Hæc mistura egregios effectus præstitit: etenim urina prodiit liberrime, & ex utero propellebatur multa materies acris, ichorosa cum magno ægræ levamine; interim tamen dolores iterum aucti sunt.

Hinc dein ad usum cicutæ denuo erat transeundum.

Dedi quotidie grana viginti extracti cicutæ & copiosum decoctum radicis althææ, vel serum lactis.

Dolores hinc mitigabantur & vires auctæ sunt, atque prodiit materies mucosa, raro foetida.

Nihilominus post tres circiter septimanas circa urinæ vias iterum tenesmi observabantur.

Unde extracti cicutæ loco iterum dedi misturam priorem ex vino & cancrorum lapidibus.

Et

Et hæc magnum denuo levamen adtulit.

Hac ratione cogebar sæpius cicutæ usum interrompere, & fere omni decimo quarto die dedi misturam, qua assumpta, extractum cicutæ iterum continuavi.

Effectum est inde, ut miserrima hæc ægra spatio sex mensium integre fuerit sanata.

Et jam a novem mensibus optimam sanitatem habet.

Hoc tempore bacchanali ventriculum solito plus oneravit, unde me accessit rogatura: darem ei medicamentum.

Verum consului, a cibis per unum alterumve diem abstineret.

Aderat tunc Doctissimus Dominus

Collin & ostendi ei hanc fœminam ex periculofissimo morbo optime curatam.

Fœmina ipsa mali historiam me melius explicuit, nec sufficienter potuit laudare pilulas, quæ sibi salutem attulerunt.

Narravit: quod ab omnibus ob fœtorem, ex utero prodeuntem, contempta fuerit, quod proprius maritus, propriæ proles eam, quasi peste affectam, fugerint.

Quod tabe fere consumpta, nil nisi ossa & pellem gesserit; quod abhorruerit a cibis, & sudore nocturno fere diffluxerit.

Nunc autem dedit videnda torosa brachia & furas optime repletas & firmas, dixitque, quod jam marito plurimum complaceret.

CASUS DECIMUS SEXTUS.

Virgo octodecim annorum, mammam utramque lapidis instar duram a triennio fere habuit.

Pallida præterea fuit, flaccida, tota cachectica, neque unquam ei menses adhuc fluxere, cordis palpitationem conquerebatur, & a paulo fortiori ingressu semper anhelavit, & fere suffocata est.

Mamma utraque striis lividis erat variegata, advertebaturque per frequenter dolor acute punctorius, vagus.

Glandulæ subaxillares & inguinales quoque erant tumidæ, induratæ.

Dedi illico ter quotidie tres pilulas, granorum duorum de extracto cicutæ, & qualibet vice feci desuper hauriri infusi melissæ & florum sambuci vascula duo.

Externe nil applicui.

Quinto die nil adhuc erat mutatum.

Exhibui igitur ter quotidie pilulas quatuor & idem infusum continuavi.

Octavo die striæ lividæ in utraque mamina disparuerunt, dolores autem vagi, pungentes erant longe frequentiores, vires auctæ sunt.

Decimo die jam dabantur quindecim pilulæ per diem.

Duodecimo die prodiit ex utero materies copiosa, alba, glutinosa & omnes durities tunc molliores videbantur, & respiratio fuit levior, nec cordis palpitatio adeo frequens.

Eadem pilularum dosi in vigesimum diem continuavi, & erant tunc omnia meliora; tumores multo minores, mamma utraque mobilis & pro parte pendula. Color

Color faciei, antea ex flavo viridis, nunc in subroseum mutabatur; functiones omnes incipiebant restaurari.

Quotidie ex utero copiosus mucus prodiit, qui subinde acer fuit, & in vagina ardorem excitavit, subinde autem adeo blande exstillavit, ut ægra nil adverterit.

Datae jam sunt octodecim pilulae per diem.

Trigesimo die mammae ambæ jam erant fere naturales, & glandulae subaxillares multo minores, nullum dolorem ægra conquerebatur, mens fuit longe hilarior.

Fluxus autem utrinus nec amplius copiosus, nec frequens fuit.

Pilularum dos non amplius aucta est, & continuabatur infusum florum sambuci & herbæ melissæ.

Quinquagesimo die nil in mammis repertum est, sub axillis erant adhuc quædam tubercula, pisis æqualia, fluxus muci ex utero penitus desiit; viguit appetitus.

Per tres adhuc septimanas dedi mediocrem cicutæ dosin, & infusum ruthæ.

Comparuit dein citra omnem dolorem fluxus menstruus, prodixitque sanguis sanissimus per quinque dies, nec advertēbatur cordis palpitatio, nec a fortiori ingressu respiratio inhibita fuit.

Unde optima videbatur adesse sanitas, atque ideo nil amplius medicamenti datum fuit.

CASUS DECIMUS SEPTIMUS.

Homo, 30. ann. biennio abhinc febre validissima intermittente, quotidiana afficiebatur.

Chirurgus hanc ilico suppressit cortice peruviano.

Gravis inde fiebat respiratio, debatur appetitus; hypochondrium sinistrum tensum erat, nec citra dolorem adtactum tulit; lateri dextro æger non potuit incumbere. Demum ortus est tumor durus, qui fere totum abdominis cavum sinistrum occupavit.

Præterea per totum corpus sensim comparuerunt furunculi foedissimi, subcoerulei, qui profunde intra cutim & panniculum adiposum penetrabant, quidam, ex affricu rupti, sanguinem putridum, nigrum fundebant, & brevi

caro fungosa ibi loci propululavit.

His omnibus miseriis adhuc super-
venit febris tertiana.

Medici, qui hujus ægri curam ge-
rebant, ex hac tertiana salutem spe-
rarunt.

Hinc remediis salinis solventibus &
amaricantibus febris conatum facilitare
intendebant.

Verum hæc omnia nil juverunt, fe-
bris adeo vehemens fuit, ut æger vires
plurimas amiserit, imo sensim extrema
intumuerunt, & merito timebatur hy-
drops.

Delatus tandem est ad nostrum no-
socomium.

Remediis leniter diureticis, sapo-
ne veneto, rheo, conservis antiscorbu-
ticis &c. tumorem quidem extremorum
dissi-

dissipavi, rediitque appetitus, verum febris violentia semper augebatur, & paroxyfmi adeo sunt protracti, ut fere quilibet per viginti quinque horas duraverit.

Sub paroxyfmo ægrum semper tussisprehendit, quæ adeo valida fuit, ut tandem sanguis rutilus proruperit.

Cessante tamen paroxyfmo nec aderat tussis, nec respiratio fuit difficilis.

Tussis sub paroxyfmo nullis remediis potuit mitigari, ardor inde summus in pectore ortus est.

Accessit demum summa macies, & vires omnes conciderunt, sudor nocturnus consumptionem minitabatur.

Quare febris necessario debebat diminui.

Junxi

¶ Junxi igitur conservis antiscorbuticis corticem peruvianum selectissimum, ejus usu spatio quinque dierum, febris admodum mitis facta est; sudor nocturnus fere desiit, nec vires adeo debiles videbantur, & ægrum subinde tranquillus somnus occupavit, refecit; tussis fuit longe minus molesta, & potuit opiatis & mucilaginosi compesci.

¶ Similibus itaque remediis per aliquot septimanas continuavi, & subinde ea admiscui, quæ ad tumorem dissipandum & ad furunculos curandos conferrent.

¶ Verum tumor in abdomine sinistro & furunculi per totum corpus semper manserunt in eodem statu, nec febris sopita fuit.

¶ Quin imo pedes livido tumore infla-

flabantur, & copiosiores majoresque furunculi ibi comparuerunt.

Decocta plurima, quæ alias ad massam sanguineam corrigendam optima fuerunt, hic nil mutarunt.

His denique junxi leviora antivene-rea, mercurialia.

Et cum hæc æger facile tulerit, nec inde quidquam in melius & pejus fuisset perversum, dedi sensim acriora, & sub finem exhibui præter copiosissima decocta mercurium sublimatum corrosivum, solutum in spiritu frumenti.

Tulit & hunc æger citra ullum incommodum.

Verum largus ejus usus per integrum mensem nil profuit.

Tentatis jam diversissimis remediis præter cicutam fere nil supererat, quod in hoc morbo fuisset indicatum.

Dedi igitur statim in principio mane decem grana & totidem vesperi, præter copiosum decoctum hordei crudi.

Tertio die, quo æger cicuta utebatur, febris paroxysmum vix percepit.

Cætera vero in eodem statu permanferunt.

Septimo die æger habuit vires longe majores, febris penitus filuit; augebatur appetitus, flaccidus circa articulos & in facie tumor totus disparuit.

Dedi jam drachmam dimidiam quotidie extracti cicutæ.

Duodecimo die cœpit prodire urina crassa, ex nigro rubra, foetida, & quidam ex furunculis exsiccabantur, quidam vero rupti fuderunt lividum liquorem.

Tumor in cavo abdominis sinistro
vide-

videbatur tactu mollior, mobilior, æger tamen lateri dextro nondum potuit incumbere.

Noctes fuerunt admodum quietæ.

Dedi tunc purgans antiphlogisticum.

Decimo quinto die dabantur jam mane & vesperi grana viginti extracti cicutæ.

Vigesimo die pedes antea lividi & tumidi obtinuerunt colorem & molem naturalem, plurimi furunculi exsiccabantur.

Hinc inde tamen iterum novi, verum admodum parvi & læte rubentes proruperunt.

Urina continuavit esse crassa, ex nigro rubicunda.

Toti

Toti abdomini sinistro imposui tunc emplastrum de cicuta.

Vigesimo quinto die æger assumpsit haustum antiphlogisticum purgantem.

Et data tunc quotidie est drachma integra extracti cicutæ.

Trigesimo primo die jam plurimi furunculi exsiccati ex cute separabantur; verum omni in loco remansit magna sensibilitas, & ex minimo affricu cutis rupta est, & fudit acre serum.

Urina tunc prodiit minus crassa, subfusca.

Trigesimo quinto die dedi purgans antiphlogisticum.

Quadragesimo die quinque tantum furunculi admodum exigui, & fere aridi supererant.

Tumor

Tumor in abdomine fuit minor, mollior.

Quinquagesimo tertio die furunculi omnes disparuerunt, & nisi tumor in abdomine fuisset, homo hicce optime sanus potuisset dimitti.

Datum tunc iterum est purgans antiphlogisticum.

Et quum dein vires integras habuit, feci: ut ad suum consuetum laborem (erat enim faber lignarius) rediret.

Jussi præterea, ut quotidie pilulas triginta, granorum duorum, sumeret, biberetque decoctum copiosum radicis bardanæ, & continuo applicaret emplastrum de cicuta.

Post sex septimanas jam citra molestiam potuit in latere dextro dormire; tumor jam admodum parvus fuit.

Decima septimana tumor fere totus disparuit.

Finito tertio mense homo integre sanus fuit.

Dedi tunc iterum haustum purgantem & dein non amplius putavi necesse esse, ut quidquam assumeret.

CASUS DECIMUS OCTAVUS.

Juvenis 17. annor. ex Hungaria huc adveniens febre violentissima laborat ; gerit præterea in hypochondrio sinistro ingentem tumorem , durum , immobilem , & est simul ictericus , & toto corpore tumet.

Per tres integras septimanas varia adhibui remedia , verum nullum ægro levamen adtuli.

Confugi igitur ad extractum cicutaë & præbui mane & vesperi grana octo

octo & saturatum infusum foliorum trifolii fibrini.

Post octiduum febris jam longe mitior fuit, vires augebantur; tumor per universum corpus erat mollis, minor, rugosus, urina alias crassa fusca, nunc fuit citrina, hypochondrium dextrum, quod ex minimo adtactu doluit, jam potuit premi fortiter, appetitus increvit.

Dedi tunc lene purgans ex rheo & sale polychresto.

Altero a purgante die exhibui mane grana decem extracti cicutæ, & totidem vesperi, & infusum trifolii fibrini continuatum est,

Decimo octavo die æger vix amplius febris accessum sensit, totum corpus & præsertim extrema jam plurimum

detumuerunt , icterus fuit levis ; appetitus bonus , urina fere naturalis ; tumor in hypochondrio sinistro mollior.

Dedi tunc drachmam dimidiam quotidie de extracto cicutæ , & ad hypochondrium finistrum applicui emplastrum de cicuta.

Trigesimo die juvenis fuit robustus , febris penitus filuit ; levissima adhuc icteri vestigia supererant ; dolor ex articulis , & omnis tumor evanuit.

Dedi iterum purgans ex rheo & sale polychresto .

Dein , eodem infuso & eadem extracti cicutæ dosi adhuc continuaret , jussi.

Quadragesimo primo die nullum amplius icteri vestigium erat videndum , vires bonæ fuerunt.

Verum in tumore hypochondrii finistri

nistri magna in melius mutatio observata non fuit.

Jussi igitur, ut de extracto cicutæ fumeret, quotidie grana quadraginta, & mane ac vespere probe fricaret hypochondrium finistrum anatica parte unguenti de althæa & florum calendulæ, addita pauca camphora, & ut in libero aëre corpus bene exerceret.

Hac ratione spatio duorum & dimidii mensium tumor in hypochondrio penitus disparuit & juvenis perfecte sanus castra adivit.

Omni decimo quarto die dedi lene purgans tempore curationis.

CASUS DECIMUS NONUS.

Homo, 34. annor. glandulas colli scirrhasas, & adeo magnas ab aliquot annis habuit, ut harum glandu-

larum moles utraque ex parte colli caput humanum superarit.

Monstruosum erat videre hunc hominem, quia tria difformia capita gessit.

Omnes hæ glandulæ, in unam massam concretæ, firmissime cohærebant.

Sub axillis erant quoque ingentes tumores, qui brachiorum motum valde dolentem & fere impossibilem reddiderunt.

Ex anteriore thoracis parte massa scirrhusa sese a collo usque ad costarum limbos extendit.

Ichorosa hinc inde ulcera hos scirrhos arroserunt.

Aliis in plagis foedissima fungosa carcinomata nata sunt.

Præterea innumeri sinus & fistulæ detegebantur.

Tussis

Tussis immanis ægrum vexavit, sudor nocturnus & vires & carnes consumpsit, respiratio fuit anhelosa, appetitus deletus, pedes, brachia, facies, & totus reliquus corporis habitus tumore œdematoso turguit.

Veræ consumptionis manifesta signa aderant.

Varii medici penetrantissimis tam vegetabilibus quam mineralibus remediis hoc malum debellare conati fuerunt; verum eorum opera incassum fuit; imo æger inde pejus habuit.

Feci igitur hominem totum fere consumptum, anhelantem, tumidumque transferri ad meum nosocomium.

Dominus *Haffner*, quamvis multos periculosissime decumbentes sola cicuta

sæpius sanari viderit, hoc tamen in casu spem omnem depofuit.

Ego ipse, ut verum fatear, hominem pro perduto habui, nam febris depascens, sudor nocturnus, tussis continua & defatigans, vires penitus prostratæ, tumor totius corporis, humorum cachexia, respiratio anxia, certam fere mortem præfagiebant.

Interim tamen rogavi Dominum *Haffner* ut externe fomentum de cicuta applicaret, ut sinus & fistulas leni cicutæ infuso, addito pauco rosarum melle, sæpius per diem elueret.

Ego interim præscripsi medicamenta expectorantia, & quæ vires simul augerent.

Solo fomento ulcera longe puriora facta sunt, & tumores emolliebantur.

Spatio

Spatio duodecim dierum æger habuit vires paulo majores; liberius respiravit & noctes fuerunt magis quietæ.

Hinc cicutam interne quoque exhibui.

Pro potu ordinario dedi decoctum hordei, cui quarta pars lactis admiscebatur.

Ufu cicutæ sputa liberrime prodierunt, & spatio quatuordecim circiter dierum totus corporis habitus detumuit; urina copiose fluxit; minuebatur febris vespertina, & sudor nocturnus; colli indurationes, ulcera, fistulæ & sinus longe in meliori statu inveniebantur, & æger jam potuit extra lectum esse.

Magnus & celer hujus remedii in hoc desperato subiecto effectus nobis adtulit gaudium, & addidit animum,

ut in applicatione tam internorum quam externorum remediorum alacriter pergeremus.

Antequam mensis spatium, quo æger cicutam assumpfit, præterlapsum fuisset; color faciei jam fuit naturalis; viguit appetitus, filuit febris vespertina, neque ullus fudor amplius observatus est; vires fuerunt satis bonæ; colli tumores longe minores, molliores, in ulceribus optimum erat pus.

Doctissimus Dominus *Collin* simul mecum hujus ægri curam gessit; Dominus *Haffner* suis fomentis & injectionibus sedulo per diem continuavit, noctu autem applicuit emplastrum de cicuta.

Sesqui mensis spatio tumores colli jam fere dimidio minores fuerunt; æger potuit collum citra magnam molestiam in omnem partem flectere. Re-

Respiratio fuit libera, nec audiebatur tussis, æger & pinguis & robustus factus est.

Jam tunc dedimus quotidie drachmam integram extracti cicutæ.

Sub initium tertii mensis æger quotidie drachmam unam cum dimidia de extracto cicutæ absumpsit.

Hac dosi per tres menses continuavimus, & hoc tempore omnes tumores sunt dissipati, & ulcera cicatrice obducta; & sinus ac fistulæ coaluerunt, rediitque collum totum ad statum naturalem, homo fuit alacer, pinguis, fortis, nec ullum ab hac dosi unquam incommodum vidimus.

Igitur ope cicutæ id effectum est, quod nemo antea speravit.

CASUS VIGESIMUS.

Virgo, 25. annorum, mammam dextram a decem annis habuit duram.

Hicce tumor sese sensim infra axillam extendit; accessit demum color lividus, intumuerunt venæ, pars affecta noctu diuque dolore excruciabatur, brachium tumuit, & fuit immobile.

Ego vocatus ad hanc ægram statim exhibui extractum cicutæ, externe autem nil applicui.

Spatio quinque dierum color lividus in læte rubrum mutatus fuit, & dolores erant multo mitiores.

Decimo tertio die mammæ color fuit fere naturalis, venæ adhuc erant turgidæ, durities autem multo mollior, mobilior, brachium quoque minus tumuit, & poterat aliquantulum moveri.

Decimo

Decimo sexto die menses proruperunt, tunc autem ægra observavit sanguinem longe puriorem fluxisse, neque tantas ut antea molestias præcessisse.

Etenim dum menses imminebant semper vomitu molestissimo, dolore atrocissimo colico, & ingratissima ad os sacrum & ad inguina tensione vexabatur, imo pectoris anxietas, cordis palpitationes, vertigines & dolentes urinæ tenesmi ægram alias semper plurimum debilitarunt, hac autem vice nil tale contigit.

Fluente sanguine menstruo venæ mammæ affectæ detumuerunt, mamma multo minor, mollior, mobiliorque fiebat, & divisa est in plures moleculas.

Brachium sat libere moveri potuit, & totus in brachio tumor evanuit.

Vige-

Vigesimo quarto die fluxus mensium cessavit, ægra bene habuit, nil doloris advertit, vires erant bonæ, & moleculæ in mamma affecta in crassiores fibras divisæ sunt.

Dedi tunc lene purgans.

Trigesimo sexto die parvæ tantum moleculæ & quædam fibrosæ indurationes in mamma supererant; ægra optime habuit; color faciei antea luridus & cachecticus nunc roseus fiebat, & totus corporis habitus longe robustior, firmior, & ad labores aptior.

Quadragesimo tertio die prodierunt menses citra omnem molestiam.

Quinquagesimo die nil fere insoliti amplius in mamma deprehensum est, brachium potuit liberrime moveri, nullus amplius dolor observabatur.

Dedi

Dedi tunc lene purgans.

Octuagesimo die foemina erat sanissima, & inveniebatur mamma penitus naturalis.

Dedi tunc iterum purgans & postea putavi, non amplius necesse esse, ut cicuta adhuc daretur.

Mediocris extracti cicutæ dosis in curanda hac foemina suffecit.

Primis quatuor septimanis tantum dedi tres pilulas mane, & tres vesperi; reliquo autem tempore ascendi ad quatuor, tandem ad quinque pro dosi.

Pilula quælibet habuit grana duo.

Externe nil applicatum fuit.

Nec datum est quoddam decoctum, quod solutionem potuisset faciliorem reddere, verum qualibet vice jusculum carnis bubulæ sumptis pilulis bibe-
batur. He-

Hemicrania dolentissimæ hæc ægra erat alias perfrequenter subiecta, ab eo autem tempore quo cicutam sumpsit, nil advertit.

Levis igitur cicutæ dosis plura mala integerrime abstulit, fugavit.

CASUS VIGESIMUS PRIMUS.

Vetula, septuaginta trium annorum, debilissima, emaciata, ulcus foedissimum cancrosum habuit circa parotidem finistram.

Hoc ulcus egit fistulas & sinus, qui intra musculos colli & intra integumenta capitis profunde penetrarunt.

Dominus *Haffner* externe applicuit fomentum de cicuta, & sinus ac fistulas ejusdem herbæ infuso sæpius per diem eluit.

Interno usu dedi cicutam & multum lac.

Spa-

Spatio viginti dierum omne cancrosum, fungosum, corruptumve ex ulcere separatum est; multi sinus jam coaluerunt; ægra majores vires habuit.

Sed tunc a lacte abhorruit; concessi igitur paucum vinum, carnem vitulinam, multum cremorem ex hordeo mundo, vel oryzam molliter coctam.

Omnia quotidie in melius mutata sunt, & sexta septimana, qua ægra utebatur cicuta, omnes fistulæ sinusque inveniebantur clausi & ulcus erat firma cicatrice obductum.

Externe tum nil amplius adpositum est, interne tamen adhuc mane & vespere per quatuordecim dies dedi pilulas duas.

Vetulam tunc sanam & hilarem ex nosocomio dimisimus.

CASUS VIGESIMUS SECUNDUS.

Fœmina , 44. annorum , sana alias jam trigesimo secundo suæ ætatis anno cœpit mensibus carere.

Præter tensionem in inguine sinistro nil incommodi sensit.

Balneis diversisque remediis usa est incassum.

Et post binos annos advertit in hypogastrio sinistro duritiem , quæ ad tactu nequaquam dolebat , verum poterat hinc inde volvi.

Hæc intra breve spatium ita increvit , ut duos pugnos viriles magnitudine adæquaverit.

Et dum ægra lateri dextro incubebat , excitavit dolorem , tensionem & anxietates.

Balneis iterum emollientissimis usa est

est & assumpsit medicamenta ab optimis in arte medicis præscripta, externe applicatum est emplastrum & unguentum.

Subinde mollior videbatur tumor & minor, paulo post autem iterum lapidis instar durus erat, & tendebatur totum ventris sinistri latus.

Dum ægra vidit nullum medicamentum prodesse, rem sibi reliquit.

Ventrem autem semper fasciis ligavit, ne tumor volubilis eam in ambulando decumbendoque impediret.

Mense Februario 1761. in peripneumoniam incidit, unde ad nostrum nosocomium translata fuit.

Remediis antiphlogisticis, emollientibus & expectorantibus intra viginti

K 2

quin-

quinque dies peripneumonia sputis optime soluta fuit, & ægra convaluit.

Post hunc morbum cœpit in hypogastrio, ubi hicce tumor latuit, dolor oriri, qui per vices sat violentus fuit, subinde autem fere evanuit.

Narravit hæc scœmina totam historiam paulo superius descriptam.

Dominus *Haffner* & ego tumorem hunc examinavimus, & concludebamus esse scirrhum ovarii sinistri.

Quum autem tot jam remediis, longo tempore, & usu non interrupto assumptis, nil mutatum fuit, ilico dedimus cicutam & decoctum saturatum radicis althææ, externe autem nil apposuimus.

Primis diebus statim dolor in parte affecta cessavit, caput autem fiebat grave,

ve, idque quasi torculari compressum ægræ videbatur.

Dedi tunc lene purgans, unde caput multum levabatur.

Dein iterum in usu cicutæ continuatum est.

Fœmina sensim optime habuit; auctus est appetitus; increverunt vires; somnus fuit maxime tranquillus.

Decimo quinto die, quo cicutam dedimus, jam tumor nobis mollior videbatur, & ex utero prodivit mucus albus, lentus, viscidus, inodorus.

Spatio unius mensis tumor jam dimidio minor fuit & mollis, continuavit autem ex utero prodire mucus.

Observabatur tunc, quod mucus prodiens magnum subinde circa uterum & pudenda ardorem excitaverit.

Mense secundo fere elapso nil amplius tactu poterat distingui, foemina nil conquerebatur, & potuit in omne latus decumbere.

Muci fluxus ex utero fuit minus copiosus, & materies longe tenuior.

Intra paucos dein dies penitus cessavit, & foemina videbatur sanissima.

Nihilominus feci, adhuc continuaret per quatuordecim dies cicutam, ne aliquid remaneret, quod fors recidivæ ansam præberet.

CASUS VIGESIMUS TERTIUS.

INfans, trium annorum, pessima rachitide laborat, facie & toto corpore tumet, & est debilis.

Tentatis multis remediis, quæ alias in hoc morbo salutaria sunt, nil profui, unde infanti cicutam dedi.

Inci-

Incipiebam a grano uno mane & uno vesperi.

Quarto die jam quatuor grana per diem exhibui, infans coepit melius appetere.

Octavo die dedi sex grana per diem, & infans videbatur robustior, pedibus sese sustinuit.

Dosin tunc non amplius auxi, quoniam omnia quotidie meliora facta sunt, & infans alias morosus, piger, meticulosus spatio unius mensis erat agilis, jucundus & optime comedit, & tumor articulorum ad minimum $\frac{2}{3}$ minor fuit.

Color faciei cacheticus in naturalem & rubicantem transivit.

Tertio mense fere finito infans optime sanus fuit; solus ambulavit; bene dormivit, fiebat pinguis, & post cura-

tionem omnia vestimenta erant ei nimis angusta & brevia. Hinc usu cicutæ infans multum increvit, nec unquam malum symptomata observatum est.

CASUS VIGESIMUS QUARTUS.

Puella, quatuor annorum, rachitica, a tribus mensibus utitur cicuta, & jam fere curata est.

CASUS VIGESIMUS QUINTUS.

Virgo, octodecim annorum, jam a quatriennio post meridiem semper vomuit omnia fere ingesta, unde fiebat cachectica, & fere contabuit.

Remedia ab aliis medicis & a me data levamen quidem subinde attulerunt, verum post paucos dies idem malum revertebatur.

Ægra dolorem & pondus in epigastrio conquerebatur, tactu percipiebatur

tur quædam tensio, nulla autem durities.

Tentavi tamen cicutam & spatio quatuordecim dierum vomitus fuit minus frequens; auctæ sunt vires.

Tertia septimana jam vomitus penitus cessavit, verum oriebantur post meridiem anxietates, & noctes fiebant inquietæ.

Dedi tunc haustum purgantem. Ægra magnum inde levamen habuit.

Postea iterum continuavi cicutam & sub finem mensis secundi aderat optima sanitas, aderant vires optimæ.

Menses, qui alias pauci erant, inceperuntque semper cum multo dolore ad os sacrum & in ventre, nunc copiose & liberrime fluxerunt.

CASUS VIGESIMUS SEXTUS.

Fœmina, 23. annorum, ingentem tumorem lymphaticum circa totum genu dextrum habuit.

Nec fomenta usitata, nec emplastra nec unguenta, nec remedia interna profuerunt.

Solo autem usu cicutæ, interno externoque, intra tres septimanas totus tumor dispulsus est.

Bis hoc tempore datum est purgans.

Cicuta in hac fœmina copiosissimam urinam promovit.

CASUS VIGESIMUS SEPTIMUS.

Operarius, qui ab anni fere spatio cataractam in oculo sinistro habuit, solo usu cicutæ & decocto radicis bardanæ spatio trium & dimidii mensium curatus est.

Omni

CASUS VIGESIMUS SEPTIMUS. 155

Omni decimo quarto die datum fuit purgans.

Per sex septimanas quotidie drachmam unam & dimidiam extracti cicutæ assumpfit.

Ultimo autem mense drachmas duas.

Ufu cicutæ hicce homo non tantum visum recuperavit integerrimum; verum & longe robustior factus est, & liberabatur simul a suis doloribus rheumaticis, quibus per totum corpus jam ab octo annis ad omnem temporis mutationem excruciabatur.

CASUS VIGESIMUS OCTAVUS.

Virgo, 25. annorum, post morbum acutum subito privatur visu & afficitur vera amaurosi.

Vidi sæpissime mercurium sublimatum in spiritu frumenti solutum præter
de

decocta resolventia simili in casu profuisse.

Hunc igitur huic ægræ præbui, ejusque usum fatis largum per duos fere menses continuavi, verum fructum inde nullum adverti.

Quoniam vero observavi sæpius, cicutam ibi penetrare, ubi sublimatus non potest, hanc vocavi in usum.

Statim a scrupulo seu viginti granis per diem incepti.

Post tres septimanas frequentes vertigines & scintillationes ægra conquerebatur, & sibi videbatur quandoque lucem & colores distinguere.

Verum lucida talia intervalla mox iterum evanuerunt, & caput inde factum est vertiginosum.

Dedi tunc purgans.

Ver-

Versus finem secundi mensis ægra jam obscure potuit quædam videre, neque a scintillatione neque a vertigine adeo frequenter afficiebatur.

Sub initium tertii mensis jam duas drachmas quotidie de extracto cicutæ absumpsit, & vilus fiebat multo melior.

Hac dosi in quintum mensem ægra continuavit, & tunc potuit omnia videre, distinguere.

Quamvis larga dosi & longo tempore sumperit cicutam, nil unquam inde mali conquesta est, imo augebatur appetitus; increverunt vires & omnes actiones, alias languidæ, restaurabantur.

Menses debito tempore, & debita copia semper habuit.

CASUS VIGESIMUS NONUS.

Vir, quinquagenarius, a trigesimo septimo ætatis suæ anno podagra laboravit, tophi inde non tantum circa pedum articulationes, verum & in manibus & circa genua orti sunt, & materies calcarea partes vicinas arrosit, pedum manuumque motus erat admodum difficilis, & genua penitus rigida, ad omnes aëris tempestatisque mutationes dirissimi dolores has partes occuparunt, & coge batur tunc per plures dies æger lecto inhærere.

Nec balnea, nec remedia interna externave, quibus æger hucusque utebatur, profuere.

Dedi cicutam & serum lactis, externe nil applicui.

Spatio quinque septimanarum & omnes

mnēs tophi soluti sunt, & rediit membrīs mobilitas, nec aëris mutatio magnos dolores amplius produxit.

Feci tamen æger adhuc mediocri dosi cicutam per aliquot septimanas continuaret & copiosum hauriret serum lactis.

Dissipatis autem tophis & materia podagrica conquerebatur per plures dies ingratham, & ad minimum motum valde dolentem sensibilitatem circa articulos & loca, quæ a materie cretacea & tophis alias obfidebantur.

Iussi igitur, quoniam tempus vernale erat, ut balnea Rodaunensia adiret.

Rediit inde pinguis, totus quadratus, robustus, sanus, & omnem aëris injuriam citra dolorem tulit.

CASUS TRIGESIMUS.

Fœmina, Sexagenaria, a viginti aliquot annis pessima podagra afficiebatur, quæ sensim per totum corpus dispersa fuit, & occupavit omnes articulos excitavitque tophos & cretaeos tumores.

Nunquam hæc ægra per integras quatuor septimanas a dolore libera fuit, isque fuit semper tantus, ut ægra nec pedem nec manum potuerit movere, nec cibos ori adferre, sæpius præ nimia doloris acerbitate sibi mortem optavit.

Dedi cicutam & infusum florum sambuci, & quarta septimana, qua his utebatur non tantum potuit ambulare in cubili, sed exivit extra domum, & alios invisit.

Brevi dein omnes tophi & tumores
dissi-

dissipati sunt integre; manus antea ob tumores cretaceos diffformes jam erant iterum tenerrimæ, molles, naturales, pulchræ.

Vires auctæ sunt, & omnes actiones restauratæ.

Nonus mensis jam fere finitus est, quo hæc foemina ab omni dolore immunis & sana vivit.

CASUS TRIGESIMUS PRIMUS.

Vir, quadragenarius, ab octo annis semper tempore verno & autumnali circa pedum articulos advertit tumorem durum, & adeo dolentem, ut orta esset febris, & æger debuerit lecto decumbere.

Lecti tamen tepore & remediis diluentibus spatio quatuordecim dierum vel quandoque trium septimana-

L

rum

rum morbus totus iterum dissipatus est, & vir sanus potuit dein labores suos perficere.

Tempore verno 1760. quo dolores circa pedum articulos iterum debuissent oriri, advertebatur levis tantum & obtusa tensio, æger sibi suum morbum imminere credidit.

Verum hæc tensio altero die disparuit subito, & tunc dolor acute punctorius pleuram sinistram occupavit, finxitque morbum vere inflammatorium.

Iteratæ venæ sectiones & remedia in hisce morbis usitata febris quidem impetum diminuerunt, verum dolor mansit æque vivus.

Sanguis e vena missus semper gessit
cru-

crustam crassam, mucosam, tenacem, variegatam.

Epispastica, vesicantia, aliaque pedibus applicata, ut dolorem a thorace versus loca consueta revellerent, nil juverunt.

Febris tandem penitus desit, licet dolor manserit continuus & vehemens.

Quoniam autem consideratis omnibus symptomatibus constabat morbum hunc adeo pertinacem a materie, quæ alias pedes invasit, productum fuisse, & quoniam multiplici experientia didici in similibus morbis ad dissolvendam materiem serosam, acrem, spissam, tenacem, cicutam multum valere, eam tunc adhibui præter decoctum saturatum radicis althææ.

Externe nec ad pedes, nec ad locum dolentem quidquam applicui.

Tertio die minuebatur dolor punctorius, & articuli pedum sudarunt, & afficiebantur obtuso dolore.

Quinto die cœpit æger sputa reddere, & dolor fuit longe mitior, circa pedum articulos autem nec dolor nec tumor advertebatur.

Duodecimo die æger jam lectum deseruit, & vix amplius sensit dolorem, sputa glutinosa continuarunt copiose prodire.

Decimo tertio die nox fuit anxia, æger fuit debilis, & occupavit ingens dolor dilacerans totum ejus corpus, & omnia membra; tandem sequebatur sudor tenax, foetidus, largus, & postero mane æger optime habuit, fuit agilis, appetiit, & vires erant bonæ.

Infuso florum sambuci, quod sero
lactis

lactis parabatur, & parva cicutæ dosi, ut per tres adhuc septimanas hicce vir uteretur, suasi, rediit dein ad me sanissimus, robustus, vegetus, & egit gratias.

CASUS TRIGESIMUS SECUNDUS.

Fœmina, 23. annorum, a quatriennio in utraque mamma durum & pugno viri majorem tumorem gessit, nec unquam his in partibus sensit dolorem.

Ante decem menses nupsit & gravidam facta est.

Quarto graviditatis mense intumuerunt ambæ mammæ, dolor in iis magnus oriebatur, & color naturalis in profunde rubrum abiit.

Omnes, qui has mammas viderunt,

optimæ foeminæ cancrum pessimum præ-
sagiebant.

Tandem me accessit, horruï ab ini-
tio & nolui dare cicutam, quoniam
eam in gravidis nondum tentavi.

Verum tamen, quum & innumeris
experimentis novi, nullas inde in cor-
pore turbas excitari, & infantes cicutam
impune ferre, incepti a leni dosi.

Brevi magnus sequebatur effectus,
prodiit urina crassa, albicans, mucosa
flocculenta.

Quarto die jam mammarum color
fuit naturalis, tumor minor, mollior.

Auxi dein cicutæ dosin & spatio u-
nius mensis jam drachmam dimidiam
quotidie dedi, nec dein opus fuit, ut
plus darem, nam quotidie magna in
melius mutatio observabatur, & octavo

graviditatis mense mammæ ambæ fuerunt penitus naturales.

Sub usu cicutæ hæc fœmina longe sanior fuit quam antea, liberata est a frequenti vomitu & a continua cephalalgia, quibus ante usum cicutæ multum vexabatur.

Nullam in hac gravida fœminaurbationem observavi.

Alvus prodiit quotidie naturalis, urina fluxit longe copiosior, flocculenta, mucosa, tunc autem minus copiosa prodiit, & habuit colorem penitus naturalem, dum mammarum tumores erant dispulsi, licet adhuc per aliquot dies cicutæ sat fortis dosis fuisset data.

CASUS TRIGESIMUS TERTIUS.

Virgo, 24. annorum, toto corpore, præfertim vero circa articulos ferroso, subflavo tumore erat inflata.

Integro quinquennio ea omnia adhibuit, quæ artis medicæ magistri confu-
luerunt, nil tamen inde levaminis percepit, imo vires diminutæ sunt, oriebatur sicca tussicula, & membra omnia fiebant immobilia.

Ego quoque diversa remedia incassum in hac ægra tentavi.

Demum eam usu cicutæ & fero lactis intra mensis spatium sanavi.

Statim in principio cicuta excitavit magnum appetitum, dein promovit urinam admodum copiosam, subviridem, cum sedimento crasso, tenaci, glutinoso.

Tumor per totum habitum corporis
ris

ris jam duodecimo die abfuit; ille vero circa articulos fuit paulo pertinacior.

Hæc ægra purgante opus non habuit, etenim a cicuta bis quotidie solvebatur alvus.

CASUS TRIGESIMUS QUARTUS.

Vir, quadraginta septem annorum, a fefqui anno tumorem durum, fcirrhofum, pugno virili majorem in fcroto gessit.

Testiculi ambo erant immunes, fanī.

Tumor hicce a gonorrhæa, subito per injectionem adstringentem fuppreffa, originem habuit.

Remedia mercurialia fortiffima, ipfa falivatio, decocta antivenerea, fomenta externa & emplafta nil prorfus juverunt.

Hæc dum vidi, cicutam dedi, & copiosum decoctum radicis bardanæ.

Quamvis autem jam vigesimo die integram drachmam quotidie cœperit æger absumere, nulla tamen in tumore mutatio adhuc observata fuit.

Trigesimo die dedi drachmam unam cum dimidia de extracto cicutæ.

Trigesimo tertio die mollior erat tumor & æger bene se habuit.

Trigesimo sexto die dedi purgans mercurio dulci mistum.

Quadragesimo die æger jam assumfit drachmas duas de extracto cicutæ quotidie, & tumor fuit minor.

Hac dosi interponendo omni decimo quarto die lene purgans mercuriale in quintum mensem continuavi, & tunc erat tumor penitus dissolutus, & homo integre sanus.

CA.

CASUS TRIGESIMUS QUINTUS.

Juvenis, 19. annorum, lue venerea pessime erat exulceratus per totum corpus, ossa utriusque tibiæ erant profunde cariosa.

Remedia antivenerea cujuscumque generis nocuerunt, & vires debilitatæ sunt, & jam aderat summa macies.

Dum hicce æger meæ curæ traditus fuit, mihi omnes curandi methodos exposuit, dubitavi: an fors recta dosi & debitis cautelis remedia antivenerea fuissent administrata.

Varia igitur iterum tentavi, verum actum egi.

Dominus *Haffner*, optimus mei nosocomii chirurgus, & ego tunc conclusimus tentare cicutam.

Externe igitur ulcera & loca cariosa

fa

sa linteis carptis fomento cicutæ madidis deligata fuerunt, interne datum est extractum cicutæ & largum decoctum radicis bardanæ cum tertia parte lactis.

Intra paucos dies magna in melius mutatio contigit, & vires increverunt.

Sub finem secundi mensis jam omne cariosum erat optime separatum & ulcera plura obducebantur firmissima cicatrice.

Dolores, qui ægrum tota nocte atrocissime divexarunt, jam filuere penitus.

Finito tertio mense optima videbatur adesse sanitas; nulli observabantur dolores; vires erant bonæ.

Mediocris cicutæ dosis ad curandum hunc pertinacissimum venereum morbum suffecit.

Ma-

Maxima dos intra 24 horas fuit drachma una.

CASUS TRIGESIMUS SEXTUS.

Juvenis, tredecim annorum, tinea capitis pessima, & contra omnia remedia rebelli jam per quinque annos laboravit.

Tandem dedi decoctum radice lapathi acuti & extractum cicutæ, & totum caput bis quotidie decocto cicutæ, quod lacte fiebat, curavi lavari.

Hac ratione intra sex septimanas integre sanatus est.

Erat hicce juvenis antea pallidus, totus cachecticus, macilentus, & inani tussi ac continuo in pectore ardore afficiebatur.

Hæc autem Symptomata usu cicutæ omnia evanuerunt.

CASUS TRIGESIMUS SEPTIMUS.

Juvenis, 16. annorum, sartor, scabie
foedissima ante biennium afficiebatur.

Dato unico purgante remedio, mox
unguenta adhibebantur, quibus scabies
retropulsa fuit.

Nata est propterea anxia respiratio
& tussis convulsiva.

Tentata quaecumque parum profue-
runt, & juvenis, fere consumptus fe-
bre lenta, tandem fertur ad meum noso-
comium.

Observavi sæpissime cicutam in sca-
bie cutanea maxime pertinaci mira præ-
stitisse, experiri igitur quoque volui,
quid in scabie retropulsa possit.

Exhibui itaque saturatum decoctum
radicis althææ & extractum cicutæ, to-
tumque corpus bis quotidie feci lavari
lacte.

lacte tepido, in cujus libris quatuor uncia dimidia saponis veneti soluta fuit.

Post octo circiter dies per univ-
sum corpus oriebatur pruritus admo-
dum ingratus, & proruperunt pustu-
læ rubicantes, acri humore repletæ.

Respiratio tunc facilior fuit, & tuf-
fis minus frequens, & æger noctu jam
tranquille dormivit, & cœpit sputum
glutinosum prodire.

Quamvis totum corpus similibus
pustulis fuerit oblitum, jussi tamen bis
quotidie lavaretur.

Circa decimum diem multæ tales
pustulæ iterum evanuerunt, aliæ au-
tem ruptæ sunt, & fuderunt serum acre,
& nascebatur crusta fusca, scabra, re-
diitque scabies talis, quali ante biennium
æger laboravit.

Capitis pars capillata quoque exulcerata est.

Tunc æger liberrime respiravit, sputa copiosa rejecit; febris lenta penitus desiit, & auctæ sunt vires.

Drachmam dimidiam extracti cicutæ tunc per diem exhibui, & quoniam vidi hanc dosin sufficere, nolui amplius eam augere.

Corpus totum bis quotidie lacte & sapone veneto lotum est.

Vigesimo die æger sat bene se habuit, verum sputa prodibant minus copiosa, licet in pectore audiretur strepitus materiæ mobilis.

Hinc loco decocti radicis bardanæ tunc dedi infusum stipitum dulco-amaræ.

Hoc infuso, & extracto cicutæ &
lo-

lotione externa , sedulo continuata , non tantum pectus ab omni acri & glutinoso liberatum fuit , sed & scabies foedissima , quæ sub usu cicutæ renascebatur , intra binos fere menses integre curata est , & juvenis optimam sanitatem obtinuit.

Hi sunt præcipui casus , quos ex mea propria experientia adducere volui.

Nimis longus & forsan tædiosus forem lectoribus , si plures adhuc casus enarrarem.

Scrophulosos , strumososque fere innumeros sola cicuta curavi.

Vidi scæminas toto corpore optime formatas , habentes faciem pulcherri-
ma imagine pulchriorem , verum glandula thyroidea iis dura fuit , & solito

M

longe

longe major , hinc habebant vitium , quod in hominum oculis maximam venustatis lucem obscuravit.

Talibus plerumque cicuta profuit , dum tumor ab obstructione vel infarctione ortus erat.

Leviores in mammis , sub axillis , in inguinibus , in vagina uteri , & ipso utero scirrhus sola cicuta solutos hic non memoro.

Obstructiones indurationesque hypochondriorum atque varios in diversa abdominis regione tumores hoc unico remedio vix non semper dissipavi.

Fœmina ; sexaginta aliquot annorum , a sedecim annis ultra viginti tumores durissimos , quorum quilibet magnitudine ovum anserinum æquavit , per totum abdomen dispersos , habuit.

Di-

Diverſa remedia nil juverunt, & malum ſenſim adeo increvit, ut urina fuerit ſuppreſſa, & ut catheter debuerit applicari ſæpius.

Sumpta cicuta liberrime prodiit urina; auctus eſt appetitus & redierunt vires.

Imo quidam tumores emolliti ſunt, & exſtillavit multa materies purulenta ex utero.

Si ægra abſtinet per aliquot dies a cicuta, mox tenditur venter, retineturque urina, & mala oriuntur ſymptomata.

Quo autem major materie per uterum copia fluit, eo molliores & minores ſiunt quidam tumores, quidam vero immutati perſtant.

Ingens levamen hæc ſcœmina a ci-

cuta habet, & si continuet, fors integre curabitur.

Nec timeo suppurationem, quæ lethalem tympanitidem adferret: quoniam materies soluta invenit exitum per uterum, neque ulla adfunt resorptionis signa, quæ febrem depascentem minitarentur.

In cardialgiis chronicis optimo cum successu per frequenter dedi cicutam, & sistebatur brevi omnis ardor, dolor, omnis vomendi conatus & homines languidi ac emaciati sub usu cicutæ optimas recuperarunt vires, & pinguescebant.

Cessarunt quoque inveteratæ cephalalgiae, aut hemicraniae annosæ.

Dum observavi circa systema renale vel uterinum esse obstructions aut
feri

feri acris & tenacis stagnationes, deducutam, & vidi fere semper menses inde copiosiores fuisse, & prodiisse sanguinem magis sanum, cessasse diros illos dolores colicos, anxios vomendi conatus, vel & vomitus æruginosos, dissipatas esse tensiones dolentes in inguinibus & ad os sacrum, nec rediisse amplius capitis dolores, caligines aut vertigines.

Habui binas fœminas, quæ dirissimis symptomatibus afficiebantur semper circa tempus menstruum, & utebantur jam per plures annos marito, nunquam tamen potuerunt concipere.

Sumpta cicuta non tantum ab his malis integre liberabantur, sed & fiebant longe alacriores, & ambæ impregnatae sunt.

Quid jam amabilis fœmineus Sexus
ultra a cicuta petit?

Phthifin ferophularem, sola cicuta &
lacte sæpius curavi; eundem fucceffum
a cicuta habui in chronicis & pertina-
ciffimis anginis ulcerofis, puftulofis,
fcorbuticis, ferofis, aut ab acri qua-
dam fluxione ortis.

In plurimis morbis desperatis, in
qnibus vidi remedia optima, continuo
ufu & longo tempore adhibita nil pro-
fuiffe, tentavi cicutam, & hac sæpe-
numero falutem adtuli.

Hydrops, ab induratione vifcerum
abdominalium ortus, sæpe foli cicutæ
ceffit; sæpe & alia remedia fimul requi-
rebantur, sæpe tamen nequaquam po-
terat curari.

Annofam arthritidem, inveteratos
rheu-

rheumatismos, spinam ventosam, luem veneream, surditatem, melancholiam tristissimam (a materie) scabiem, tineam capitis, serpiginem pessimam, ulcera foedissima, sinus & fistulas maxime pertinaces sola cicuta plerumque feliciter debellavi, sanavi.

Obtulerunt tamen & mihi casus in quibus cicuta non profuit, usu quamvis longo & larga dosi adhibita.

Virgo, 20. annorum, ob tumorem, pugno virili majorem, ex bucca sinistra ortum, & cum maxilla inferiore firmissime concretum ultra dimidium annum cicutæ extractum magna dosi quotidie assumpsit, & inde nullum habuit levamen, unde pertœsa abstinuit.

Alia virgo, 25. annorum, tumorem ingentem, & nigricantem in latere

colli dextro a multis annis habuit.

Tentavi cicutam, verum mox oriebatur febris, & ægra fiebat debilis.

Alia tamen remedia contra hunc tumorem exhibita & externe applicata nil quoque juverunt.

Hinc Dominus *Collin* & ego diversa sub forma & minima dosi & additis aliis medicamentis cicutam denuo in hoc subjecto voluimus experiri; verum priora mox iterum symptomata orta iunt, & ægra ex usu cicutæ, quamvis maxime limitato, languit, & angebatur.

Unde tumor sibi erat relinquendus.

Fœmina, 42. annorum, in mamma dextra scirrhum admodum dolentem a sex mensibus advertit, ab eo nimirum tempore, quo cœpit, menstruo fluxu carere.

Chirur-

Chirurgus pro fomento externo suadet fœces vini in vino coctas.

Intra biduum scirrhus fuit longe major, durior, cutis livuit.

Dein rupta est epidermis, & acre, fœtidumque serum transfudavit.

Per plures dein septimanas varii chirurgi & medici varia tentarunt.

Verum morbus semper fiebat pejor, ægra conquerebatur siccam tussiculam, & ardorem in pectore, incipiebat noctu sudare, emaciari.

Tandem ego, in consilium vocatus, suasi cicutam, decoctum hordei crudi, & copiosum lac.

Vires inde auctæ sunt; cessavit sudor nocturnus; rediitque appetitus, & mammæ color fiebat rutilus, & durities minor.

Per binos fere menses spes erat optima curandi hanc foeminam.

Dein, nescio quo casu, subito orta est tussis, quæ adeo violenta fuit, ut sanguis sputo prodierit.

Hinc debebam a cicuta abstinere, & ægra tandem phthisi consumpta est.

Alia foemina, cancro aperto laborans in mamma dextra ex usu cicutæ melius habuit, & durities exulcerata erat ad minimum $\frac{2}{3}$ minor.

Verum supervenit febris tertiana, quæ vires omnes prostravit.

Cicutam tunc ilico removi, & larga manu dedi corticem peruvianum.

Febris fugata est; redierunt vires, & ex usu corticis peruviani omnia videbantur meliora.

Hinc corticem per binas septimanas adhuc continuavi.

Ac-

Accessit autem tunc asthma glutinosum, quo hæc ægra jam ante tres annos laboravit; sputa nulla prodierunt; hinc suffocata obiit.

Vir septuagenario major, prehenditur apoplexia, unde brachium finistrum & pes ejusdem lateris paralyfi afficiebantur.

Magna simul tussi hicce æger laboravit, & habuit in latere colli dextro tumorem, binis pugnibus majorem, farcomatosum.

Dum medici & chirurgi plurima medicamenta sine effectu per multos menses adhibuerunt, relinquebant tandem fati hunc miserum.

Et tunc ægrotantis uxor me rogavit: ut accederem.

Vidi ægrum senectute & morbo ferere

re consumptum, difficulter respirantem, reddentemque sputa pauca, difficilia, glutinosa, tumor colli erat durus, lividus, purpureus & in eo rosit continuus dolor.

Malam statim prognosin uxori dedi, & nil promisi, blando tamen sermone tristem senem erexi, præscripsique remedia, quæ levamen essent allatura.

Prodiit sputum copiosum, & pectus fiebat magis liberum; vires paulisper augebantur.

In tumore autem mansit dolor continuus, & augebatur ejus moles.

Hinc ipse æger institit multis precibus, ut cicutam contra hunc tumorem tentarem.

Novi, cicutam etiam debilissimis
seni-

senibus nequaquam nocere, dedi igitur mane & vesperi grana duo; præterea autem continuavi remedia, quæ petus a sputo liberarent.

Mirus advertēbatur cicutæ effectus; sputa prodibant copiosa, & magis cocta, & spatio paucorum dierum in partibus paralyticis major motus, & sensibilitas advertēbatur; in tumore dolor est multo imminutus, nec amplius fuit continuus, sed tantum per vices rediit; vires autem auctæ non sunt, & appetitus mansit deletus.

Dosin cicutæ non auxi.

Mense circiter elapso tumor videbatur mollior, reliqua autem erant in priori statu & æger nil fere nutrimenti assumpsit.

Nihilominus eum in quartum mensem

sem conservavi; dein vero omnes vires ex defectu nutrimenti conciderunt, & intra octo dies miser exstinguebatur.

Aliquoties dedi cicutam in catarracta, & longo usu & forti dosi tandem profui; pluries autem nullum inde in hoc morbo effectum observavi.

Circa uteri ulcera cancrofa quatuor habui foeminas, quas cicuta optime sanavi; plures alias habui, quibus cicuta per aliquot tempus adtulit levamen, verum eas nequaquam restituit.

Aliis hoc morbo laborantibus cicuta plane non profuit, & fuerant quædam, quæ hoc remedium non poterant ferre, conquerentes inde majores dolores, virium dejectionem, & fluxum ichoris magis foetidum, acriorem, copiosorem.

An propterea cicuta proscribenda?
similibus in casibus non debet dari usu
continuato?

Hæc oportuit candide & sincere hic-
ce loci adnotare, ne quis posset ogge-
rere, me velle meris cicutæ laudibus
mundo litterato imponere.

CAPUT III.

*Nunc quædam aliorum medicorum observata
referam, convenit.*

Eruditissimus Petrus ab Armis, medi-
cus Tridentinus, in humanissima
sua epistola, quam mense Augusto 1760.
ad me dedit, sequentia habet:

„ Interim per me tibi gratias agit
„ ingeniosissima puella, quam tuo du-
„ ctu cicuta tua a scirrho in mamma fi-
„ nistra felicissime curavi.

Celeberrimus *Josephus Baader*, Me-
dicinæ

dicinæ Professor Friburgensis circa cicutam hæc scribit; „ ope cicutæ, quam „ jam officinalem hic feci, intra septem hebdomadas perfectum & apertum carcinoma mammæ in foemina „ sanavi.

„ Scirrhi illi sublinguales admodum „ dolentes in alia foemina, de qua jam „ alia occasione mentionem feci, ita „ modo se habent, ut ex latere sinistro „ vix vestigium amplius adsit, ex dextro vero latere scirrhus multo minor „ fit, parumque jam doleat, licet per „ quatuordecim annos eundem jam mulier senserit.

„ Scirrhum alium in collo, quem „ juvenis jam per decem & ultra annos ad omnia remedia rebellem „ gesit, intra quinque menses usu extracti

” tracti & fomenti de cicuta resol-
” vi.

Celeberrimus *Martinus van der Belen*
Medicinæ Professor Primarius in Alma
Universitate Lovaniensi &c. - - -

” quamvis autem eæ, quæ in tuo libro
” exponuntur, observationes certam
” fidem satis evincant, tibi non displi-
” citurum autumo, si & successum cu-
” ræ, quam cum cicuta institui, bre-
” viter communicavero.

” Quadraginta annorum virgo ante
” tres circiter annos, citra causam ex-
” ternam sensibilem, scirrhus in mam-
” ma sinistra corripitur, cui initio ni-
” hil opposuit: postea vero varia, quæ
” ab amiculis commendabantur, reme-
” dia applicuit, donec magis aucto tu-
” more, & incrementis indies doloris

N

” vehe-

” vehementia mense Majo 1760. chi-
” rurgum advocaverit, qui mali impe-
” ritus ad maturandum tumorem ter-
” de die cataplasma imponere jussit, eo
” quidem effectu, ut jam omnia cele-
” rius in pejus ruerent.

” Interim nullo capto consilio ad
” aperturam tumoris nefando ausu pro-
” cessit, ex quo malignitas aucta est,
” & sanguinis profluvium aliquoties ac-
” cessit.

” Tandem mense Julio accersitus
” vidi, horrendo spectaculo carcinoma
” ingentis adeo voluminis latus fini-
” strum occupare, ut a clavicula ad
” ultimam costam veram, & a sterni
” margine usque ultra costarum maxi-
” mam curvaturam extenderetur, sub-
” jectis totum accretum.

” Vari-

„ Varicosæ venæ in superficie digi-
„ tum fere latæ spectabantur, vasaque
„ arteriosa eum in modum dilatata e-
„ rant, ut singulis pulsibus sibi com-
„ missa ponderosissima tumoris moles
„ tota elevaretur.

„ Debilis cæterum & emaciata ægra
„ febre continua hectica laborabat, ca-
„ tameniis tamen suo tempore, ut sem-
„ per ante factum fuerat, rite fluen-
„ tibus.

„ In hoc rerum statu spem unicam
„ in cicuta posui, quam ad tui præ-
„ scripti normam, sensim aucta dosi,
„ ita præbui, ut ægra indies xxiv. pil-
„ lulas granorum duorum assumeret,
„ imposito simul cataplasmate ex an-
„ tisepticis & cicuta ad pondus o-
„ mnium.

„ Quo factum est, ut post aliquot
„ septimanas tumoris tota massa gan-
„ grænosa evaserit, adeo, ut eam ite-
„ rata sectione auferre oportuerit,
„ cute, quousque affecta non fuerat,
„ servata.

„ Subjecta sana apparuerunt, jam-
„ que pure discreta fuerant, in quo ta-
„ men odor, qualis a gangrænoso ta-
„ bo spirare solet.

„ Itaque digestiva cum antisepticis
„ superponenda, pilulas excicuta, mi-
„ nuta tamen dosi, continuandas, si-
„ mulque tres corticis peruviani drach-
„ mas singulo die præbendas jussi.

„ Brevi omnia spem feliciter absol-
„ vendæ curationis fecerunt, tumque
„ solis externis præfidiis ulcus eous-
„ que coaluit, ut minima saltem a-

„ per-

„ pertura, dum hæc scribo superfit,
„ nullaue sub toto curationis tempore
„ fungosa propululaverit caro, adeo,
„ ut de integerrima sanatione secura
„ videatur, jamque pristina officia re-
„ sumpserit &c.

Summas celeberrimo ac eruditissi-
mo huic Professori gratias hic publice
ago, quod casum adeo pulchrum mihi
communicare voluerit.

Etenim ex tota hujus morbi histo-
ria nos omnes optime docemur, qua
methodo artem nostram exerceri oport-
teat.

Nam patet inde: non uni semper
remedio esse fidendum, sed debere quan-
doque alia simul tum externa, tum in-
terna vocari in usum, debere quando-

que quædam demi , & alia addi , ut optatus eveniat effectus.

Atque ideo ars jubet , medicum esse rationalem.

Quandoque instrumenta chirurgica in usum vocanda sunt.

Doctissimus castrensis medicus Dominus Joannes *Kollman* mihi hæc retulit :

„ Cæterum non possum satis laudare virtutes extracti cicutæ.

„ Habui inter meos ægros militem , qui in hypochondrio sinistro ingentem tumorem , admodum durum , gravantem , dolentemque a longo tempore gessit.

„ Demum incepit ingesta omnia vomitu reddere , sensitque continuum & acutum dolorem , & emaciabatur.

Pul.

„ Pulsum habuit febrilem, eleva-
„ tum, & propterea ilico venam feca-
„ ri jussi, externe applicui cataplasma-
„ ta emollientissima, injeci enemata
„ oleosa, & præscripsi decocta resol-
„ ventia, nitrosa, mellita, cum in-
„ terpollatis paregoricis.

„ Per hæc saltem ulteriorem in-
„ flammationis progressum impedivi,
„ febrem mitigavi, dolorem minui;
„ tumor autem non minor, sed potius
„ major duriorque factus est.

„ Dedi igitur serum lectis cum mul-
„ to sale polychresto, & melle, atque
„ pilulas ex sapone veneto, & gummi
„ ferulaceis.

„ Sed diuturno usu his quoque nil
„ effectum fuit.

„ Tandem deveni ad extractum ci-

cutæ, quo ad drachmas duas forma
misturæ quotidie assumpto, sensim
minuebatur tumor, & post mensis
spatium nec tantillum supererat, &
æger bellissime habuit, recuperavit
vires, & firmam sanitatem.

Omnes, qui mecum viderunt hunc
ægrum, felicissimum curæ eventum,
atque celerem & fere inexpectatam
cicutæ efficaciam satis mirari non po-
tuerunt.

Scirrhus inveteratos, & ad omnia
reliqua remedia rebelles, in diversis
corporis partibus sola cicuta, usu in-
terno data, sæpissime resolvi &c.

Clarissimus *Crampagna*, Consiliarius
& Archiater *Serenissimi Lotharingæ Du-*
cis CAROLI, Bruxellis multa experi-
men-

menta usu cicutæ instituit, & fere semper felicem vidit effectum.

Iter tamen, quod Viennam erat faciendum, virum hunc doctissimum impedivit, quo minus potuerit ipse omnium curationum exitum expectare.

Unde, pro innata sua humanitate, sequentes casus hic Viennæ mihi communicare est dignatus.

„ Fœmina, quadraginta quinque annorum, a longo tempore scirrhus, qui ovum gallinaceum magnitudine æquabat, in mamma dextra laboravit.

„ Remedia externa internaque ex consiliis medicorum ac chirurgorum applicata, nec minimum præstiterunt effectum, tandem præscripsi pilulas de cicuta, & sensim dedi drach-

” mam dimidiam quotidie, externe ap-
” plicabatur cataplasma ex cicuta, &
” lacte paratum.

” Spatio trium septimanarum eva-
” nuerunt dolores, & scirrhus in plu-
” res moleculas divisus est.

” Hoc in statu reliqui ægram, quo-
” niam Viennam debui proficisci.

” Propter idem iter non poteram
” intregre finire casum sequentem.

” Fœmina, 50. annorum, venit ad
” me petitura consilium contra can-
” crum apertum, quem in mamma dex-
” tra gerebat, & sub axilla ejusdem
” lateris hæsit scirrhus, nuci juglandi
” par.

” Præscripsi statim pilulas & fo-
” mentum de cicuta, scirrho sub axil-
” la imposui emplastrum de cicuta, &

” ulcus

„ ulcus cancrosum deligabatur linteis,
„ carptis, decocto cicutæ madidis.

„ Post quindecim dies, dum ægram
„ vidi, mirabar summopere celerem &
„ ingentem mutationem, quam inve-
„ niebam.

„ Etenim ægra jam bene appetiit,
„ tranquille dormivit, nec ullum am-
„ plius dolorem percepit, & ipsa fate-
„ batur sponte, quod ex usu hujus re-
„ medii non tantum actiones omnes
„ insurgant, & corpus suum vigorem
„ recuperet, sed etiam, quod mens
„ inde recreetur.

„ Scirrhus sub axilla erat, jam per-
„ fecte solutus, dissipatus.

„ In ulcere cancroso optimum pus
„ reperiabatur.

„ Usu pilularum de extracto cicu-

„ tæ,

” tæ, emplastro de cicuta, frictione,
” & iterata applicatione vaporum a-
” ceti ad locum affectum integre diffi-
” pavi scirrhum admodum magnum,
” & rebellem, quem virgo, 13. ann.,
” circa aurem sinistram habuit.

” Fœminæ, 30. ann., propter scirr-
” hum in mamma consului bis de die
” acetii vapores applicaret, & dein im-
” poneret emplastrum de cicuta; pro
” usu interno præscripsi unciam unam
” extracti cicutæ in pilulis, granorum
” duorum, ut ægra inde quotidie su-
” meret quindecim.

” Absumtis his pilulis putavi, alia
” adhuc dosi forsitan opus esse, verum
” fœmina egit gratias, mihiq̃ue osten-
” dit, se usu horum remediorum brevi
” temporis spatio esse integre sanatam.

” Fœ-

” Foemina, 46. ann. , cancerum aper-
” tum in mamma habuit , cujus pro-
” gressum applicatione pulveris corti-
” cis peruviani jam aliquo tempore im-
” pedivi.

” Mamma præterea tota scirrhusa
” fuit, & pectori firmissime adhæsit.

” Clarissimus *Manderlier* consiliarius
” & Archiater, collega meus , hanc
” ægram quoque vidit.

” Dedimus ei statim pilulas de ci-
” cuta, quas dominus *Manderlier* vien-
” na accepit, super tota mamma posui-
” mus cataplasma ex cicuta, & ulcus
” fecimus deligari linteis carptis, for-
” ti cicutæ infuso madidis.

” Post paucos dies videbamus opti-
” mam suppurationem , mammæ scirr-
” hus fuit multo minor , & ægra vix
” amplius sensit dolores. ” Dum

„ Dum Bruxellis iter Viennam suscepī, vidi hanc foeminam in statu
„ admodum bono, & omnia tendebant
„ in sanationem.

„ Et doctissimus Archiater *Mander-*
„ *lier* nunc paucis abhinc diebus me lit-
„ teris certiores reddidit, ulcus can-
„ crosum optima cicatrice esse perfecte
„ consolidatum, & mammæ tumorem
„ scirrhusum & cancrosum integre dis-
„ sipatum.

„ Foemina, 45. ann., me consuluit su-
„ pra tumore ad costas spurias, qui pu-
„ gnum virilem magnitudine superavit.

„ Magna cum attentione hunc tu-
„ morem examinavi, & manifeste ob-
„ servavi : materiam in eo esse colle-
„ ctam.

” Præterea una ex his costis spuriiis
” erat valde crassa, tumida, elevata.

” Boni effectus, quos ex cicuta sæ-
” pius vidi me quoque determina-
” verunt, ut hoc remedium in hoc quo-
” que casu tentaverim &c.

” Præscripsi præterea lenes frictio-
” nes, & bis quotidie aceti vapores ap-
” plicui, dein tumorem emplastro de ci-
” cuta texi.

” His vidi magna cum lætitia, id
” effectum esse, ut tumor disparuerit,
” & costa redierit ad statum natura-
” lem &c.

” Homo, quem alias remediis anti-
” scorbuticis a pessimo scorbutico aliquo-
” ties curavi, nunc iterum in eundem
” morbum incidit.

” Remedia autem antiscorbutica
nequa-

nequaquam profuerunt, imo morbus
semper altiores egit radices, & erat
de hujus hominis vita timendum.

Hoc in statu adhibebatur cicutæ
extractum, & æger ex pessimo mor-
bo optime convaluit.

Dexterrimus, Dominus *Cambon*, Con-
filiarius & Primus Chirurgus *Serenissimæ*
Ducis Lotharingiæ binos casus mihi com-
municavit.

Homo, quinquagenarius, a sex
annis habuit ulcus in interna & me-
dia cruris dextri parte.

Ad hoc ulcus curandum multi me-
dici & chirurgi plurima artis auxilia
tentarunt; ast æger nil omnino leva-
minis sensit.

Tandem mense Martio 1760. me
accessit petiturus consilium.

Agno-

” Agnovi statim ulcus cancrosum
” esse.

” Per tres menses varia interna, &
” externa remedia huic ægro præscripti,
” & ego impfemet ulcus mundavi, de-
” ligavi.

” Verum omnis mea opera, quam-
” vis exactissima & magna cum attenti-
” one sedulo applicata, incassum fuit.

” Ulceris labia manebant livida,
” callosa, fungosa, & venæ in toto
” ambitu varicosæ, & nulla omnino in
” melius mutatio observata est.

” Arte igitur ulceris labia & totum
” fundum satis profunde abstuli, ut hac
” ratione fieret vulnus recens & purum,
” quod sola consolidatione opus haberet.

” Verum hæc operatio æque parum
” profuit, ac omnia remedia huc us-

que tentata; nam prius malum, ad-
hibita licet omni cautela, repulula-
vit.

Hoc ulcus jam pro incurabili ha-
bui, & miserum dimissem sine ope,
nisi tunc temporis mihi innotuisset,
esse experimenta quædam Viennæ edi-
ta, quæ demonstrabant, cicutam in
similibus casibus mira præstare.

Extractum igitur cicutæ statim ex-
hibui, idque felicissimo cum successu.

Etenim post paucos dies lætus vi-
di, magnas & velocissimas in melius
mutationes.

Nec ullum malum symptoma super-
venit, & ulcus cancrosum, antea
adeo rebelle, spatio trium septima-
narum perfectissime sanatum est.

Antequam hic homo cicuta esset
usus,

„ usus, conquerebatur semper salivam
„ falsam, acrem, erodentem; mox au-
„ tem sub usu cicutæ hicce sapor eva-
„ nuit, & saliva erat insipida, naturalis.

„ Homo, triginta aliquot anno-
„ rum, monstrosum tumorem in collo
„ habuit.

„ Remedia tam vegetabilia, quam
„ mineralia penetrantissima nil prorsus
„ juverunt, quamvis longo tempore &
„ usu largissimo fuerint adhibita.

„ Solum extractum cicutæ magna
„ dosi interne datum tandem hunc per-
„ tinacissimum tumorem emollivit, dis-
„ sipavit.

„ Externe præter emplastrum de
„ cicuta nil appositum est.

Clarissimus *Kaisin*, qui Leodii præ-
xim medicam summa cum laude exer-

cet, in doctissima sua epistola, ita ad me scribit.

„ Ego tuam methodum exacte fui
„ secutus; a parva dosi semper incepti,
„ crederem affirmative respondendum
„ esse, ad tuam quintam quæstionem,
„ quæ de remediis purgantibus (an sub
„ usu cicutæ conveniant) agit.

„ Etenim fere omni septimana da-
„ bam meis ægris purgans, & eis con-
„ ducebat.

„ Eadem phænomena sub usu cicu-
„ tæ observavi, quæ descripsisti: vidi
„ cutis colorem lividum abire in ru-
„ brum, rubrum in naturalem, dolores
„ sub initium minuebantur, & tandem
„ solo cicutæ usu cessabant penitus.

„ Sanies pessima convertebatur in
„ pus bonum, durities scirrhusæ divide-
„ bantur

„ bantur in molleculas, & dein insensi-
„ biliter fundebantur, subinde vero be-
„ nigna suppuratione consumptæ sunt.

„ Vir, septuaginta septem anno-
„ rum, a triginta annis habuit duri-
„ tiem indolentem in scroto, hæc fen-
„ sim augebatur, & supervenit hy-
„ drocele.

„ Ego advocabar, & inveniebam
„ symptomata, quæ, considerata hujus
„ viri ætate, mortem minitabantur.

„ Jussi tunc advocaretur Dominus
„ *Falise*, chirurgus expertissimus, & con-
„ clusimus statim dare cicutam, & ex-
„ terne apponebamus emplastrum de
„ galbano.

„ Spatio quindecim dierum omnia
„ in melius mutabantur: ægri facies
„ alias plumbea, nunc habuit colorem

„ naturalem, auctæ sunt vires, & re-
„ diit appetitus, & tumor scirrhus in-
„ cipiebat suppuratione solvi.

„ Nos nullam fecimus aperturam,
„ donec sponte integumenta fuerunt
„ rupta.

„ Pus multum profluxit, aquæ au-
„ tem reclusæ manebant.

„ Unde has punctiōne eduximus.

„ Demum benigna suppuratione in-
„ sensibiliter totus tumor consumeba-
„ tur, integumenta rupta concreverunt
„ cum testiculo recto.

„ Hicce vir, habita ratione suæ æ-
„ tatis, perfecta nunc fruitur sanitate.

„ Erat autem a sua juventute ne-
„ phriticis doloribus multum divexa-
„ tus, ego ei jam per tredecim annos
„ remedia, his in casibus usitata, præ-
„ scripsi

scripsi, & inde sat commode vixit,
verum semper prodiit urinæ loco me-
rum pus, & mucus.

Nunc autem post usum cicutæ u-
rina prodit facile, & est penitus na-
turalis, subinde tantum paucum pu-
rulentum sedimen advertitur.

Videns, quod remedium nunquam
sanitatem turbaret, & cogitans apud
me, dari quandam analogiam inter
fistulas in aliis corporis partibus, &
inter eas, quæ circa anum sunt, sta-
tui cicutam in fistula ani tentare.

Vir, 50. annorum, qui jam a
quadriennio hoc malo laborat, &
cui jam dudum suasi operationem,
quàm vero neglexit, nunc a tribus
mensibus utitur cicuta & evanescunt

„ dolores, & materie fluxus multum
„ minuitur.

Clarissimus medicus Bruxellenfis Jo-
annes *van der Belen* &c. hæc habet:

„ - - - nunc audi, si
„ placeat, quod pluris est, quam o-
„ mnia: in podagra plurimorum pul-
„ cherrimos vidi effectus.

„ Externe applicui herbam cicutæ
„ lacti incoctam, interne dedi cicutæ
„ extractum in quadam mistura dilutum,
„ dosi satis larga.

„ Ope cicutæ plurimos curavi sca-
„ biosos, sed cura semper admodum
„ tarda fuit, idem quoque in rheuma-
„ ticis mihi contigit.

„ Quoad cataractam incipientem in
„ ambobus oculis, unicam foeminam
rusti-

„ rusticam habui, quam feliciter cu-
„ ravi.

„ Verum hoc opus, hic labor fuit,
„ ascendi usque ad drachmas sex ex-
„ tracti cicutæ singulis viginti quatuor
„ horis, ea scilicet conditione, ut lar-
„ ga manu superbiberet infusum sum-
„ mitatum Euphragiæ cum seminibus
„ foeniculi dulcis, & liquiritia.

„ Hæc foemina a vigesima secunda
„ Aprilis usque ad tertiam Novembris
„ 1760. sumsit extracti cicutæ uncias
„ sexaginta octo.

„ In phthisi stupendam cicutæ effi-
„ cacious frequenter observavi, quos-
„ dam jam penitus desperatos extracto
„ cicutæ restitui.

„ Pessimis cachectis, in quorum ven-
„ triculis nimia muci, & glutinis co-

” pia fecernebatur, extractum cicutæ,
” junctum cum elixiriis stomachicis,
” sæpissime profuit, ubi alia remedia,
” longo tempore adhibita, nil prorsus
” effecerunt.

Hermannus *Gleisner*, græcensis Phy-
ficus Celeberrimus: - - -

” en historiam Cancri, a me cicuta per-
” curati:

” Vir, quadraginta aliquot anno-
” rum, temperamenti cholericus, ab a-
” liquo tempore glandulas inguinales
” tumidas, & dein dolentes gessit;
” has barbi tonsor audacter discidit, ex
” vulnere fluxit merus sanguis sine pu-
” re, oriebatur ingens dolor, & appli-
” catis variis corrosivis, multoque la-
” pide infernali foedum evasit ulcus.

” Post integrum fere annum, & ap-
” pli-

” plicatis omnis generis medicamini-
” bus æger miserrimus lecto jam conti-
” nuo affixus meam tandem opem in-
” vocavit.

” Vidi, ulcus occupare inguen dex-
” trum, & deorsum versus orificium
” ani, sursum versus umbilicum ex-
” porrigi, aggredique jam scrotum &
” penem.

” Labia retorta, ichor cadavero-
” fus, dolor ingens, frequens hæmor-
” rhagia, & malum semper ulterius
” serpens, & ad omnia quæque reme-
” dia hætenus rebelle, mihi cancrum
” accusabant.

” Consului desuper Dominum *Buck*,
” dexterrimum chirurgum, obstetricum-
” que hic loci magistrum, qui etiam
” ulcus

„ ulcus primo intuitu carcinomaticum
„ agnovit.

„ Dedi igitur cicutam interne, ex-
„ terne, & viro adeo exhausto exhi-
„ bui hydrogalactam pro potu ordi-
„ nario.

„ Primum erat, quod post aliquot
„ dies pessimam nephytin abire, & tan-
„ dem omnem locum ichoris vice pul-
„ cherrimo madere pure observave-
„ rim.

„ Demum ad marginem labiorum
„ ulceris nova exorta sunt ulcuscula,
„ ipsa labia (quod aspectu mirum e-
„ rat) sensim & sensim solvebantur,
„ tota plaga ulceris magis & magis e-
„ molleiebatur, & quasi fundebatur,
„ usque dum conditionem sani vulne-
„ ris induxit.

„ Spa-

” Spatio quatuor mensium hoc ul-
” cus perfecte sanatum est.

Diligentissimus ac expertissimus Do-
minus *Koller*, chirurgus, sequentem mi-
hi epistolam ex Bohemia scripsit: - -

” Fœminæ, 36. ann., anno circiter
” abhinc oriebatur in labio oris inferio-
” re tuberculum, lentis magnitudine.

” Hoc tuberculum sensim augeba-
” tur, & tandem, dum nucem avella-
” nam adæquavit, supprimebantur men-
” ses, & cutis circa tumorem fissa est,
” atque transfudavit continuo humor
” acer.

” Varia externe applicata sunt; ve-
” rum res semper in pejorem statum mu-
” tabatur.

” Mense Novembri 1760. ægra ad
” me adducebatur: re bene considera-

” ta,

„ ta, vidi ulcus pessimum, cancrosum,
„ inveni musculum orbicularem labii in-
„ ferioris usque ad medietatem musculi
„ mentalis seu quadrati exulceratione
„ cancrosa consumptum.

„ Uterque angulus oris, præfer-
„ tim vero dexter jam erat ad pollicis
„ latitudinem sat profunde exesus, cor-
„ rosus.

„ Foedum erat & nauseosum, vi-
„ dere hoc turpissimum ulcus; ulceris
„ autem labia undequaque fuerunt cal-
„ losa, retorta.

„ De amputatione serio apud me
„ cogitavi; verum collatis omnibus,
„ vidi vulnus inde oriturum ingens,
„ quod ob necessarium musculorum ad-
„ jacentium motum nequaquam posset
„ obduci cicatrice; aut si id cicatrice fir-

„ mare-

” maretur, maneret cavum foedissimum,
” nunquam reparandum.

” Omisi igitur operationem, & ex-
” tractum cicutæ sequenti ratione ad-
” hibui.

” Dedi statim in principio quotidie
” triginta duo grana extracti cicutæ, di-
” luti in mistura.

” Et quamvis observaverim, jam
” primis octo diebus dolores multum
” diminutos fuisse, per integrum tamen
” mensem eadem extracti dosi conti-
” nuavi.

” Externe applicui ad totum ulcus
” lintea carpta, sequenti remedio ma-
” dida:

R. Extracti cicutæ dr. ij.

 solve in aquæ calcis primæ in-
 fusionis Lib. i.

” Ul-

” Ulcus hac ratione toties deligavi,
” quoties adverti, ferum acre ex can-
” croso ulcere profluens jam penetrare
” lintea carpta.

” Sub initium necesse erat, ut &
” noctu aliquoties deligatio renovare-
” tur.

” Hoc idem remedium externum a
” principio ad finem usque curationis
” adhibui, ea tantum differentia: quod
” ultimo mense, dum vidi carnes re-
” crevisse, ulcusque esse consolidatio-
” ni proximum, applicuerim id paulo
” levius sequenti modo:

R. Extracti cicutæ. dr. i.

aquæ calcis secundæ infusionis

Lib. i.

” Finito primo mense jam omnia
” erant in statu longe meliori, salivæ

” pro-

profluvium, quod antea continuum
& copiosum erat, jam vere desiit,
saniei loco aderat optimum pus,
omne callosum sensim emollitum,
& dissipatum est, & sanissimæ carnes
unde quaque recreverunt, ægra opti-
me dormivit, bene appetiit, & quod
maximum, rediit fluxus menstruus.

Extracti cicutæ dosim tunc dimi-
nui, & loco granorum triginta duo-
rum, dedi tunc quotidie grana vi-
ginti quatuor, & hac quantitate ite-
rum per integrum mensem continua-
vi.

Tertio & ultimo curationis mense,
quum omnia optime procederent, de-
di tantum quotidie grana duodecim
extracti cicutæ, & hæc dosis ad per-
fectam curationem suffecit.

” Tempore curationis ægram quin-
” quies purgavi, remedio sequenti :

℞. pulv. rad. jalap.

dr. ß

cremor tart. gr. x

m. f. pulv. pro dosi.

” Ab hoc remedio alvus semper
” quinquies aut sexies mota fuit.

” Fœmina pauperrima erat , hinc
” facile patet, qualem diætam potue-
” rit observare, ea nimirum assumpfit,
” quæ ab aliis sponte ex misericordia
” offerebantur.

” Quemadmodum autem ante usum
” cicutæ ob enormes continuosque do-
” lores, & ob ingentem salivæ deper-
” ditionem, tota cachectica, emaciata,
” & fere consumpta fuit , ita e con-
” trario

trario post curationem fuit pinguis,
quadrata, firma, robusta.

Et quod plurimum debemus admirari: omnes partes ulcere cancroso erosæ & consumptæ integerrime recreverunt.

Cicatrices circa utrumque oris angulum adeo pulchræ, & naturales sunt, ut fere nihil observetur.

Labium oris inferius debitam altitudinem recuperavit, & ad superius potest bene admoveri, paulo tantum angustius est, quam in statu naturali esse deberet. - - -

Curatio hæc certe pulcherrima est, & chirurgus magnam meretur laudem, etenim optimi chirurgi, & medici vices prudentissime implevit.

Experientia, judicium & industria

in arte medica & chirurgica plurimum valent.

Dominus Sebastianus *Kaim*, chirurgus, mihi communicavit casum puellæ quatuordecim annorum, quæ ulcus cancrosum in latere sinistro habuit.

„ Hoc ulcus ab aure usque ad medietatem menti se se extendit, & duos pollices serpsit infra mentum, versus superiora ultra os jugale ascendit.

„ Horrendum erat, videre hoc ulcus, etenim omnia erant putridissima sanie corrofa, & ad ossa usque exesa.

„ Decocta diversissima, fomenta, & emplastra, ipsa remedia mercurialia & antimoniata nil profuerunt, & malum semper in latum & profundum repfit.

„ Da.

„ Data autem cicuta, & applicato
„ ex eadem herba fomento [externo
„ perfecta curatio sequebatur.

Eruditissimus Georgius *Hasenöhr*,
physicus solertissimus in nosocomio Hi-
spanico militari - - - „ fre-
„ quentem nactus occasionem experi-
„ menta faciendi in ægris, quorum cu-
„ ram gerebam in nosocomio, id ob-
„ servavi, duros annososque colli tu-
„ mores ope cicutæ fusos, liquatos-
„ que fuisse.

„ Inter alios erat miles, qui col-
„ lum totum ob ingentes, & ad omnia
„ remedia rebelles scirrhus rigidum ha-
„ buit, sola tamen cicuta integre cura-
„ tus ex nosocomio discessit.

„ Cancrum occultum in mamma si-
„ nistra, a causa externa ortum, duri-

„ tie & mole insignem diuturno cicutæ
„ usu penitus curavi.

„ Cancro aperto circa angulum o-
„ ris finistrum undique jamjam profer-
„ penti intra sex septimanas usu cicu-
„ tæ frænum injeci, & trimestri spatio
„ malum eodem remedio funditus ex-
„ stirpavi.

„ In spina ventosa semel iterumque
„ cicutam profuisse, vidi.

„ In ulceribus cacoëthicis, in sca-
„ bie foedissima, inveterata, & maxi-
„ me rebelli idem medicamentum inte-
„ gro cum successu pluries adhibui.

Josephus *Quarin*, perspicacissimus
apud fratres misericordiæ Physicus &
Cæs. Reg. sanitatis Consiliarius &c. - -

„ Multos sola cicuta curavi inte-
„ gerrime, qui annosa arthritide, aut
„ rheu-

” rheumatismo laborarunt, quique plu-
” rima remedia hucusque incassum ten-
” tarunt.

” In tumoribus arthriticis pulcher-
” rime prodest decoctum cicutæ, si pars
” affecta ei immergatur.

” Pertinacissimos parotidum, glan-
” dularum colli, subaxillariumque &c.
” scirrhos solo extracto cicutæ facile,
” & cito sæpius dissipavi.

” Dedi autem plerumque his ægris
” statim in principio largam dosin, alvus
” quandoque inde cum euphoria mo-
” vebatur; externe in aliquibus appo-
” sui emplastrum de cicuta.

” Inter alios vir, 32. anno-
” rum, surdus, ingentes scirrhosas
” & fere lapideas parotides habuit,
” & glandulæ colli erant quoque scir-

hosæ, & adeo magnæ, & penetran-
tes versus interiora, ut respiratio-
nem fecerint laboriosam.

Hunc solo extracto cicutæ, & fo-
mento ex eadem herba parato, opti-
me restitui.

Etenim omnes tumores disparue-
runt, & rediit auditus, & respiratio
erat sanorum similis, & homo antea
emaciatus sub usu cicutæ recuperavit
carnes, & vires.

In tussi pertinaci cum levi pulmo-
num ulcere pulchrum effectum mihi
edidit cicuta.

In binis progressum cataractæ im-
pedivi ope cicutæ, sed cataractam
inde diminui, non vidi.

Leopoldus *Auenbrugger*, Medicus
vigi-

vigilantissimus in nosocomio nationum
Hispanico

„ Scrophulosos valde multos ex-
„ tracto cicutæ percuravi, neque ho-
„ rum historias longius explicandas
„ putavi, quia remedia præstantia in hoc
„ genere mali aliunde ab tuis aliorum-
„ que experimentis iterum iterumque
„ confirmata fuit.

„ Unius tamen scrophulosi historia
„ mihi notatu dignissima videtur.

„ Militi, cui submaxillares glandulæ
„ omnes duro tumore vehementer tur-
„ gebant, obtuli extractum de cicuta
„ eadem, qua proposuisti methodo.

„ Levamen notabile inde consecu-
„ tus est æger; atque ideo idem reme-
„ dium repetii.

„ Sanitatis suæ citius recuperandæ

„ causa secum reputavit æger: quod si
„ pilulas in majori numero frequentius
„ caperet, citius ad sanitatem reditu-
„ rus esset.

„ Infcius ego suæ intentionis feci
„ ex uncia dimidia prædicti extracti
„ formari pilulas granorum duorum,
„ ut per plures dies sufficerent.

„ Sed en! has pilulas spatio unius
„ diei bona fortuna devoravit, eo effe-
„ ctu, ut sine ullo incommodo vel do-
„ lore ultra quinquagesies per triduum
„ dejiceret, totusque tumor intra hoc
„ tempus disparuerit sic, ut præter ad-
„ modum parva vestigia induratarum
„ glandularum nil fuerit relictum.

„ Torosus & juvenis iste æger vi-
„ gesimum quintum annum nondum
„ superavit.

„ In cancroſis, cacoëthiſis, gangræ-
„ noſis ulceribus ſæpius extractum ci-
„ cutæ optimo cum effectu exhibui.

„ Et vidi hujus remedii uſu partes
„ gangrænoſas longe citius ſeparari a
„ ſanis, quam uſu corticis peruviani.

„ Fœminam gravidam, quæ aperto
„ in mamma cancro laboravit, ope ci-
„ cutæ optime ſanavi, & peperit infan-
„ tem ſanum.

„ Mamma tamen ob exiguaſuam
„ molem, & ob ſœdam cicatricem ad
„ lactandum infantem inepta eſt.

„ Verum ex ſana mamma infans ſa-
„ nus, & roboſtus egregie fugit.

Doctiſſimus Joſeph. Henricus *Collin*,
meus in noſocomio Pazmariano Colle-
ga, præter alia experimenta, quæ circa
varia vegetabilia, hucusque minus uſi-
tata,

tata, optimo & miro cum effectu in casibus difficillimis instituit, quæque in proximo anno medico litteratis sincere & candide communicabit circa cicutam hæc habet.

„ Scirrhus ingentes, annosos, dolentes, circa parotides, sub axilla, in collo, in mammis &c. solo cicutæ usu interno, externoque solvi, dissipavi.

„ Ulcera saniosa, serpentia, cancerosa, & ad omnia remedia rebellia, inde optime sanata, & fistulas, profunde penetrantes, claudas sæpius vidi.

„ Magnos ad genua tumores, quos alii medici, & chirurgi pro incurabilibus declararunt, ego & Dominus Hassner, expertissimus in nostro nosocomio

” comio chirurgus, sola cicuta pluries
” integre dispulimus.

” Et rediit hujus articuli optima
” mobilitas, & usus pedis, imo pedes
” antea emaciati dispulso hoc tumore
” iterum torosi fiebant.

” Materiem fluctuantem dum in his
” tumoribus latere observavimus, cul-
” tello excitus parabatur.

” Sinus, & fistulas, & cavitates,
” quandoque in his tumoribus latitan-
” tes, saturato cicutæ infuso sæpius per
” diem eluimus, & externe cataplasma
” ex cicuta paratum, continuo cali-
” dum, applicuimus.

” Datum præterea subinde est pur-
” gans.

” Hac ratione desperatissimos ægros
” integerrime sanavimus.

” Ossa

„ Ossa tamen si circa has articula-
„ tiones corrupta, & integre corrofa
„ fuerunt, in statum naturalem redi-
„ gere non potuimus, hinc quibusdam
„ dispulso tumore articuli mobilitas
„ non rediit, licet circa reliqua sym-
„ ptomata optimum senserint levamen,
„ & vires recuperaverint.

„ Plurimi horum ægrorum erant
„ cachetici, & cœperunt contabescere,
„ his autem malis sola cicuta brevi quo-
„ que medebatur.

„ Famosi quidam ex nostris chirur-
„ gis tumores lymphaticos nolunt ape-
„ rire, dicentes ægros citius tumore
„ aperto mori.

„ Hinc tales tumores pelle lepori-
„ na tegunt, & ægros sine solatio re-
„ linquunt fati.

„ Ve-

” Verum quidem est , apertis his
” tumoribus magnam lymphæ copiam
” effluere , & perpetuo hujus lymphæ
” stillicidio posse tales ægros confumi.

” Nullo hucusque remedio hi chi-
” rurgi noverunt tale stillicidium com-
” pescere , & factum vulnus curare.

” Ego autem & Dominus *Haffner*
” ad vulnus arte factum lintea carpta
” infuso cicutæ madida applicuimus , &
” interne dedi cicutam , & lac recens ,
” atque hac methodo omnes restitui-
” mus.

” Inter alios casus maxime dignus
” est unus de puella octo circiter an-
” norum , quæ a tribus annis ingentem
” tumorem lymphaticum ad femur dex-
” trum gessit.

” Hicce tumor semper increvit ,
” puel-

” puella incidit in febrem hecticam, &
” jam erat tota emaciata, languida &
” morti proxima.

” Medici hanc jam deferuerunt,
” & chirurgi annosi, & ex multa pra-
” xi periti, hujus tumoris aperturam
” summopere prohibuerunt.

” Nihilominus Doctissimus Domi-
” nus *Haffner* & ego ex multis felicissi-
” misque casibus audaciores, anceps
” tentavimus remedium.

” Dominus *Haffner* me praesente per-
” tudit tumorem, & effluxerunt octo
” libræ feri fatis acris.

” Sinus & fistulas profunde pene-
” trantes undequaque invenimus, unde
” casus adhuc erat difficilior.

” Data tamen cicuta, factisque ali-
” quoties per diem injectionibus ex in-

” fuso

” infuso cicutaë , & applicatis linteis car-
” ptis eodem infuso madidis intra pau-
” cas septimanas hanc puellam perfecte
” curavimus.

” Ex hoc casu patet ignorantia chi-
” rurgorum aut medicorum posse quan-
” doque vitæ dies abbreviari, vera au-
” tem scientia medica eosdem posse
” prolongari.

” Si tumorem non aperuissemus , si
” remedia convenientia non fuissent ap-
” plicata, hæc puella certo certius in-
” tra paucos dies obiisset.

” Multos scabiosos, arthriticos, &
” rheumaticos, ubi jam alia quæcun-
” que remedia nil juverunt, sola cicu-
” ta interne, externeque adhibita fe-
” licissime sanavi, & membris rigidis,

ac immobilibus hac ratione rediit mobilitas.

Fœmina, penitus emaciata habuit mammam finistram mole ingentem & scirrhosam, & plura cancrofa, fungosa ulcera hanc mammam sat profunde exederunt, profluxit sanies copiosa acerrima, cadaverosa, & dolores rodentes ac lacinantes, dies noctesque inquietas, & anxias reddiderunt.

Symptomata omnia adeo mala, viresque adeo parvæ erant, ut vix ulla curationis spes superfuerit.

Nihilominus dato extracto cicutaë, & externe applicato cataplasmate ægra non tantum a scirrhosa mole, sed & a cancro aperto integerrime liberata est.

Ipse

„ Ipsæ glandulæ subaxillares ejus-
„ dem lateris erant quoque scirrhusæ
„ dolentes.

„ Hæc ægra curationis tempore
„ multum lac, aqua pura, vel decocto
„ quodam emollienti dilutum, bibit.

„ Celeberrimus Anatomix Profes-
„ sor, Laurentius Gasser, Clarissimus Se-
„ renissimi Ducis Lotharingix Archiater
„ Crampagna, exactissimus ac dexterri-
„ mus chirurgus Cambon, Dominus Le-
„ ber &c. hanc ægram periculose de-
„ cumbentem, dein curatam viderunt.

„ Lætabar vehementer, dum hi viri
„ in arte maxime insignes me meum-
„ que nosocomium sua præsentia aliquo-
„ ties honorarunt, & testabantur sem-
„ per se admodum contentos, dum ca-

” fus numerosos mirosque, & curas fe-
” liciter procedentes, conspexerunt.

Diligens, perspicax, & ad omnem operationem aptissimus chirurgus Dominus Ferdinandus *Leber* multam impendit operam ad experimenta usu cicutaë facienda, & sequentia ad me retulit.

” Foemina, 35. ann., ex contusione
” habuit mammam dextram admodum
” tumidam, duram.

” Usa est variis remediis sine effe-
” ctu, & accessit demum ingens dolor,
” & papilla, corrupta, decidit.

” Præterea hæc foemina gravida fuit.

” Me dum accessit dedi pilulas de
” cicuta & externe applicui emplastrum
” diapomphol. & dolores inde bre-
” vi sedabantur.

” Post

Post quatuor septimanas mamma
fuit melior; verum ægra conquere-
batur vertigines, pectoris appressio-
nes, & infomnia; hæc autem sympto-
mata ex plethora proveniebant, hinc
unica venæ sectione sopiebantur.

Nona septimana, qua pilulas as-
sumpsit, peperit infantem sanum.

Toto puerperio assumpsit pilulas,
& externe applicatum est emplastrum
diapomph. infans semper sanus erat,
& ex mamma sana lac fugebat, &
mamma affecta, finito tertio mense
fuit multo minor, & exulceratio cir-
ca papillam tendebat in sanationem.

Quarto mense copiosus sanguis ex
papilla profluxit; sistebatur autem
applicato fungo agarico quercino.

Omnia fiebant semper meliora.

„ Quinto mense applicui externe
„ fomentum ex æquali parte cicutæ &
„ florum sambuci.

„ Octavo mense fœmina erat integre
„ curata.

„ Vir, 61. ann., temperamenti scor-
„ butici, tumorem habuit in bucca dex-
„ tra ex contusione, hunc dissipavi
„ remediis antiscorbuticis, & usu pi-
„ lularum de cicuta.

„ Vetula, 75. ann., a terrore sensit
„ in mamma sinistra dolorem, & paulo
„ post mamma intumuit.

„ Applicuit supra totam mammam
„ butyrum recens, unde & tumor, &
„ dolores aucti sunt.

„ Variis dein usa remediis nullum
„ levamen percepit.

„ Dum me accessit, dedi ilico octo
„ pilu-

„ pilulas de cicuta per diem, & appo-
„ sui externe emplastrum de cicuta.

„ Spatio unius mensis dolores ces-
„ sarunt, & tumor fuit minor.

„ Continuatō dein pilularum usu,
„ & aucta sensim dosi sexto mense mam-
„ ma tota in statu naturali fuit.

„ Puellæ, 11. ann., per totum col-
„ lum scrophulosæ, ultra medium an-
„ num dedi quotidie quindecim pilulas
„ de cicuta sine ullo effectu, emanfit
„ tunc, & adiit alios chirurgos, & me-
„ dicos.

„ Dum vero neque ab his quid-
„ quam in melius mutatum fuit, rediit
„ denuo ad me.

„ Jussi iterum, ut pilulas de cicuta
„ assumeret, & biberet desuper infu-
„ sum florum sambuci, & verbasci.

„ Et dein spatio quatuor mensium curata est.

„ Puella , quæ per plures annos
„ cancrum ad nasi apicem habuit,
„ pilulis de cicuta integre curata fuit.

„ Id autem in hoc casu notandum,
„ quod hæc puella sub initium, dum
„ pilulæ ex cicuta dabantur, frequenter
„ vomuerit , atque diarrhæa fuerit
„ correpta.

„ Postea vero sat largam harum pi-
„ lularum dosin sine ullo incommodo
„ tulit.

„ Fœmina, 60. ann. , cataracta la-
„ borans in utroque oculo, data cicu-
„ ta intra quinque menses perfecte vi-
„ dit.

„ Vir, 40. ann., amaurosi post mor-
„ bum acutum afficiebatur, plurima ad-
„ hibita remedia nihil juverunt.

„ Dedi dein cicutæ pilulas, & post
„ tres menses cœpit lucem distingue-
„ re, & paulisper videre.

„ Decimo mense jam iter trium ho-
„ rarum solus sine duce confecit, inte-
„ rim omnia distincte videre nondum
„ potuit.

„ Decimo sexto mense ex solo usu
„ cicutæ integrum visum habuit.

„ Fœmina, 40. annor., per binos
„ annos habuit cancrum apertum ad
„ palpebram dextram inferiorem.

„ Dedi pilulas de cicuta, per diem
„ applicui externe fomentum de cicuta,

„ Quarto mense erat integre curata.

„ Vir, 44. annor., a quatuor an-
„ nis jam pessima gonorrhæa laboravit,
„ & vires omnes amisit, noctes habuit
„ inquietas, infomnes ob febrem de-

” pascens, quæ omni vespera vehemens fuit.

” Omnia jam remedia, maxime alias efficacia, in hoc ægro sine levamine tentata sunt, imo quæ pro specificis in hoc morbo alias habentur, lentam tabem adtulissent usu diuturno.

” Dedi igitur extractum cicutæ, & infusum florum sambuci cum lacte.

” Intra paucos dies malum emendatum fuit, auctæ sunt vires, incrementum appetitus, noctes fiebant tranquillæ.

” Sexto mense ex his solis miserimus æger integre convaluit, fuit robustus, pinguis.

” Fœmina, 30. annor., post subitum in puerperio terrorem sensit illico in mamma dextra dolorem vehementem.

” hementem, dein mamma rubuit, &
” valde dura facta est.

” Pluribus usa remediis semper pe-
” jus habuit.

” Dum me accessit, vidi mammam
” totam scirrhosam, & paulo infra pa-
” pillam inveni locum mollem, in quo
” materiem purulentam ex fluctuatione
” judicavi latere.

” Applicui tunc fomentum ex ana-
” tica parte herbæ cicutæ, florum sam-
” buci, & verbasci.

” Post paucos dies rumpebatur pars
” mollis & effluxit copiosum pus.

” Reliqua tamen mamma mansit
” valde dura, & dolens.

” Nihilominus eodem fomento, se-
” dulo applicato & datis pilulis de ci-
” cuta, mamma perfecte emollita, & sa-
” nata fuit.

” Hoc

„ Hæc foemina jam a tribus annis
„ habuit quoque tumorem in hypo-
„ chondrio sinistro, quem singulo men-
„ se, dum catamenia instabant, tantus
„ dolor occupavit, ut ægra debilissi-
„ ma debuerit per aliquot dies lecto in-
„ hære.

„ Verum ex pilularum usu, per sex
„ menses continuato, ab hoc tumore,
„ & dolore liberabatur; nunc men-
„ strua fluunt sine omni molestia, & sa-
„ nitas videtur optima.

„ Virum, 32. annor., penitus ema-
„ ciatum, debilem, cacheticum &c. a
„ testiculis tumidis & scirrhosis, at-
„ que a gonorrhæa inveterata, datis pi-
„ lulis de cicuta, spatium quinque men-
„ sium curavi, perfecte restitui.

„ Foemina, 34. ann., post terrorem
„ habuit

„ habuit mammam induratum, dolen-
„ tem, moles duritiei semper increvit,
„ & aucti sunt dolores.

„ Data cicuta mox melius se habuit,
„ & intra binos & dimidium menses
„ fuit penitus sanata.

„ Virgo, 17. annor., cancrum aper-
„ tum, non admodum magnum, in
„ mamma sinistra habuit, & pedes am-
„ bo foedissimis ulceribus erant exesi.

„ Mammam sola cicuta spatio trium
„ mensium curavi, verum ad ulcera
„ pedum consolidanda quinque mensi-
„ bus erat opus.

„ Dedi fere omni tertia septimana
„ purgans.

„ Foemina, 24. annor., cancrum ex-
„ ulceratum in mamma sinistra a binis

„ annis

” annis gessit, & usa est plurimis re-
” mediis sine effectū.

” Datis autem pilulis de cicuta, &
” applicato fomento, ex eadem herba,
” spatio septem mensium curabatur in-
” tegre.

” Fœmina, quadragenaria, a plu-
” ribus annis habuit mammam finistram
” duram, tumidam, circa papillam erant
” plures scirrhi rotundi, valde do-
” lentes.

” Emplastra, fomenta, unguenta
” exterre diu applicuit, & a variis me-
” dicis varia remedia assumpsit sine le-
” vamine.

” Dedi dein ei cicutam, & spatio
” novem septimanarum restituebatur.

” Viro, qui in ambobus oculis ca-
” taractam habuit jam per integrum an-
num

num, dedi sensim spiritus frumenti
cum mercurio sublimato libras duas
& dimidiam, exiguus inde sequebatur
effectus, & æger jam renuit hoc re-
medium.

Unde transivi ad usum cicutæ, &
quarto mense dum ea utitur, solus
ambulat, & colores distinguit.

“ Vir, 44. annor., ex arthritide
prægressa habuit mammam sinistram
tumidam, duram, & valde dolentem.

Varia sine effectu applicuit.

Assumpsit dein cicutam, & spa-
tio sesqui mensis integre convaluit.

Virgo, 17. annor., ex retro pres-
sa scabie cœpit dolorem circa articu-
lum femoris dextri conqueri, dein
claudicavit.

Variis remediis, & balneo Baden-

si

” si usa, nullum habuit levamen, & fie-
” bat tota cachectica, macilenta.

” Adhibui cicutam, & mox muta-
” tus est totus corporis habitus, jam
” minus dolet, nec multum amplius
” claudicat.

” Hinc spero non absque ratione
” eam brevi integre sanam futuram.

” Vir, 48. annor., cancrum serpen-
” tem in palpebra inferiori oculi sinistri
” a longo tempore habuit.

” Applicui externe infusum cicutæ,
” & interne dedi pilulas de cicuta, &
” cancer perfecte curatus fuit.

” Vetula, 70. annor., jam ultra an-
” num sensit continuum dolorem & tu-
” morem in hypochondrio sinistro.

” Dedi ei cicutam, & spatio medii
” anni evanuit tumor, & dolor.

” Puero

” Puero, 11. annor., pessime cache-
” ctico dedi quotidie grana octo extra-
” ctī cicutæ & eum brevi curavi.

” Multos adhuc in cura habeo, quī
” cancro, scirrhis, cataractis, amaurosi,
” ulceribus pessimis, cachexia &c. la-
” borant, & spem habeo optimam eos
” restituendi; quoniam jam omnia mu-
” tantur in melius.

” Alios tamen habui, quos cicuta,
” longo licet usu adhibita, nequaquam
” juvit.

” Tres fœminæ, cancro mammæ la-
” borantes, nec ex usu cicutæ, nec ex
” aliis remediis multum levamen per-
” ceperunt, & sensim mortuæ sunt.

” Una ex his ex nimis frequenti
” hæmorrhagia occubuit, aliæ autem
” duæ contabuerunt.

Dominus Alexander *Engelberg*, qui olim per plures annos in Abbatia Claustro-Neoburgensi prope Viennam summa cum laude praxin medicam felicissime exercuit, & nunc Constantiæ Physicus ac medicus practicus est celeberrimus, sequentia de cicuta observata mihi retulit.

„ Vir, 60. annor., a sua juventute
„ hucusque variis morbis venereis affi-
„ ciebatur, tandem totus exhaustus fe-
„ re contabuit, urina penitus purulen-
„ ta, foetida jam per plures annos inter-
„ diros tenesmos ac dolores, prodiit.

„ Remedia similibus in casibus a-
„ lias utilia jam potius nocuerunt.

„ Igitur cicutam præbui a parva do-
„ si sensim ascendendo.

„ Bini nunc sunt menses, & jam vi-

res augentur , redit appetitus , somnus est tranquillus , & urina penitus naturalis , absunt dolores , & tenebræ.

Fœmina , 40. aliquot annorum , hæmorrhagiis uterinis alias erat valde subiecta.

Tandem cœpit ex utero prodire materies foetida , ichorosa cum ingenti & continuo dolore urente , erodente.

Materies hæc utero prodiens haud raro erat permixta striis sanguineis.

Tentavi plurima remedia , quædam effectum videbantur præstare , & materies fiebat minus maligna , verum dolores manserunt æque violenti , neque vires auctæ sunt , nec in-

” crevit appetitus, & tandem cœpit
” iterum materies pessime foetere.

” Hinc tentavi extractum cicutæ.

” Sub initium materies longe foeti-
” dior, & copiosior reddebatur, dolo-
” res autem intra paucos dies imminu-
” ti sunt.

” Continuato per aliquot septima-
” nas cicutæ usu dolores cessarunt pe-
” nitus, ægra quiete dormivit, appe-
” tit, & demum optimas recuperavit
” vires, & materies ex utero effluens
” tenuis fiebat, inodora, limpida.

” Nunc jam paucae tantum guttæ
” sine ulla molestia prodeunt, & fœ-
” mina videtur sana; nil enim conquie-
” ritur, habet bonas vires, appetit,
” digerit, dormit, urina libere fluit,
” alvus deponitur bene cocta sine do-
” lore, & tenesmo.

” Jū-

„ Juvenem habui, qui sæpius per
„ septimanam atrocissima epilepsia affi-
„ ciebatur, medicamenta, in hocce
„ morbo alias decantata, fere nihil ef-
„ fecerunt.

„ Unde dedi per integrum mensem
„ extractum cicutæ dosi satis forti, &
„ brevi paroxysmorum violentia mi-
„ nuebatur, tandem nullus amplius e-
„ pilepsiæ impetus observatus est.

„ Nunc per plures menses jam sa-
„ nus fuit, longe fortior est, agilior, &
„ mens ipsa, quæ antea erat suppressa,
„ & hebes, jam maxime serena, & ad
„ omnia habilis videtur.

„ Juvenem, 24. annor., qui a pluri-
„ bus annis scirrhus admodum magnos
„ per totum collum habuit, & partes
„ vicinas adeo tensas, ut caput nequa-

R. 3

„ quam

quam potuerit circumvertere , em-
plastro & extracto cicutæ integerrime
curavi.

Chirurgi , & multi medici varia
tum externa , quam interna remedia
in hoc juvene incassum tentarunt.

Virginem , 20. annor. , quæ in-
gentes scirrhus circa aures , infra ma-
xillam , & in toto collo gessit , ea-
dem ratione brevi restitui.

Dominus Silvester ô *Hebir* , Cele-
berrimus Pragensis medicus , me de
casu sequenti consuluit.

Matrona , vigesimum primum an-
num agens , scirrhum ab aliquot an-
nis in mamma dextra advertit ; &
quum nec dolorem , nec ullum incom-
modum hicce tumor produxit , nul-
lum applicuit remedium.

No.

„ Novem abhinc mensibus inivit
„ matrimonium, varia confecit itinera,
„ concepit.

„ Mamma tunc cœpit intumescere,
„ fiebat durior, accessit dolor, natura-
„ lis mutabatur color, intumerunt ve-
„ næ, noctes factæ sunt insomnes.

„ Remedia externe applicata mam-
„ mam semper pejorem fecerunt.

„ Multi medici, & chirurgi, qui
„ hanc ægram viderunt, de ejus vita
„ actum esse, prædicebant, vetuerunt-
„ que omnem remedii applicationem;
„ probe gnari his cancrum adhuc oc-
„ cultum aperiri, & tandem adferri
„ mortem.

Hoc in statu ægra offerebatur ce-
leberrimo ô *Hebir*.

Quoniam autem gravida fuit, no-

R 4

luit

luit quoque sine consilio cicutam tentare.

Hinc hac super re mihi scripsit.

Vidi ego in pluribus gravidis cicutam optimo cum effectu, & sine omni noxa exhiberi, unde suasi, ut celeberrimus vir in hoc quoque casu eam tentaret.

Dignabatur meum sequi consilium, & postea sequentem epistolam ad me dedit:

„ Dignitas rei postularet quidem,
„ ut accuratius absolveretur historia
„ morbi illius, de quo tecum egi in li-
„ teris die 27. Julii ultimo elapsi ad te
„ datis.

„ At mihi omnis occasio minutioris
„ instituendæ indaginis abrepta est per
„ numerum aliorum periclitantium,
„ qui

„ qui se se curæ meæ subjecerunt, & ob
„ distantiam loci, qua ab urbe separa-
„ batur Illust. illa Persona.

„ Hinc non ægre feres, si votis tuis
„ justo minus correspondere valens,
„ rem integram rarioribus observatio-
„ nibus expedivero.

„ Percepta mente tua, mihi ante
„ tres menses transmissa, consilium
„ mutavi, & ad normam positam cu-
„ ram accessi: exhibendo pilulas duas,
„ granorum binorum, de cicuta mane
„ & vesp̄i.

„ Dumque sine sensibili effectū hanc
„ administrandi methodum protrahi
„ viderim, duplicari dosin jussi, con-
„ tinuarique.

„ Quod per plures hebdomadas fa-
„ ctum est; at casso hucusque molimi-

ne; imo in deterius jam & præcipiti
passu ruebant cuncta: tumor, duri-
ties increverunt, accessere dolores
enormes, color lividus, vel plus in
nigredinem tendens, verbo: quid-
quid cancrum occultum manifeste de-
signaret, illud omne hic aderat.

In ancipiti hoc stadio nil consul-
tius fieri posse putabam, quam ut au-
gerentur doses.

Quare effeci, ut qualibet die ab-
sumerentur extracti cicutæ grana vi-
ginti quatuor: ut sedulo admoveren-
tur parti affectæ fomenta cum eadem
cicuta parata.

Hæc omnia quotidie repetebantur
per mensem & ultra.

Redeunti denuo mihi, quinta jam
fere expleta septimana, en hæc fuit,

quæ

” quæ sese obtulit pulchra rerum fa-
” cies.

” Mammæ ingens moles quadruplo
” minor conspicitur, quam dum digi-
” tis contrecto in plurima divisam tu-
” bercula invenio.

” Color ater in album & naturalem
” conversus est; de dolore vix conque-
” ritur; quodque in hac praxi dignum
” forte notatu est:

” Hæmorrhoidalem fluxum copio-
” sum commode sustinuit sine ullo vi-
” rium lapsu.

” Palam ergo de incomparabili ci-
” cutæ effectû convictus nil prorsus vel
” addidi, vel detraxi, at eodem tra-
” mite insistendo curam ultra feliciter
” perficiendam pronuncio. &c. &c.

” Illust. hæc matrona jam sese ac-

” cingit

⁂ cingit ad iter Viennam faciendum; ubi
⁂ viva voce hæc cuncta confirmata
⁂ senties.

Ex itinere, & curruum succussu
mamma iterum paulo pejor fuit.

Unde ægra quam primum Viennam
venit me fecit advocari.

Inveni mammam duobus pugnis fere
æqualem, duram, hinc inde purpuream,
non tamen valde dolentem.

Venæ autem fuerunt varicosæ, inte-
rim ægra habuit vires bonas.

Suasi, ut fomentum ex cicuta con-
tinuo applicaretur, ut ægra in lecto qui-
esceret, & assumeret quotidie grana vi-
ginti quatuor extracti cicutæ.

Hæc omnia lubentissimo animo ad-
amissim fiebant, & mamma inter pau-
cos dies habuit colorem naturalem, fuit
mollior, mobilior, minor. Gra-

Gravidatis signa erant optima, & in toto naturæ opere nil mutatum inveniebatur.

Mamma fere quotidie in meliori statu deprehensa est.

Tertia septimana, qua hæc ægra Viennæ fuit, finiebatur graviditatis terminus, instabat partus, & prodiit filia sana, pinguis, pulchra.

Omnium animi erant curiosi, & cupidi videndi: an non tenellæ infanti diuturnus cicutæ usus nocuisset.

Verum bona prædixi, bona omnia inveniebantur.

Sub partu tamen mamma paulo rudius tractata cœpit iterum dolere, & postero die rubuit, intumuitque in molem ingentem, tandem purpurea fuit, dein livuit, & elevebatur in tubera, transf-

transsudavit serum acre, erodens, & merito timebatur, cutim tenerrimam esse rumpendam, oriturumque cancerum pessimum, apertum.

Dolor magnus sese ex mamma per humerum, & totum brachium dextrum extendit.

Primis duobus puerperii diebus ægra nec externe, nec interne cicutam applicuit.

Lochia optime fluxerunt.

Tertio die urgentibus nimium malis in mamma symptomatibus cataplasma ex cicuta appositum fuit.

Dolores inde brevi mitigabantur, & lividus color eo statim die dissipatus est; durities tamen & mammæ moles ingens manserunt, neque mutata sunt tubera, quæ rupturam minitabantur.

Noctu

Noctu denique cataplasma ex cicuta sedulo continuatum fuit.

Quarto die mansit in eodem statu, dolores fuerunt vehementiores.

Quinto die mane & vesperti ægra jam iterum pilulas quinque, granorum duorum, assumpsit.

Dolores multum minuebantur, & quædam tubera subsederunt, & illud acre, quod per cutim transsudavit, & rosit, vix amplius advertebatur.

Sexto die omnia iterum paulo meliora fuerunt.

Septimo die jam grana viginti quatuor de extracto assumpsit, & cataplasma de cicuta, quamvis odorem ingratum sparserit, ægra tamen (viso bono effectu) summa cum patientia applicuit, tulit.

Omnia

Omnia puerperii negotia optime processerunt, infans quoque sanissima fuit.

Omni quarto quintove die dosin pularum auximus.

Spatio trium septimanarum usu caplasmatis, & extracti cicutæ mamma ad magnitudinem pugni virilis redigebatur.

Color fuit naturalis, cessavit omnis dolor, ægra habuit vires, & potuit brachium sat libere movere.

Incipiente quarta septimana jam dabatur quotidie drachma integra extracti cicutæ, & ægra, quamvis tenella & valde sensibilis, nullam inde molestiam advertit, & bene se habuit.

Hac ratione optime finiebatur puerperium, & finito puerperio in mamma
super-

superfuit durities, adhuc scirrhusa, magnitudine nucis juglandis, hæc autem erat mobilis, & in omnem partem volubilis.

Reliquum quod circa hanc moleculam adhuc præternaturale remansit nequaquam durum, sed pastaceum fuit.

Hæc matrona optime se habuit, vires bonas recuperavit, appetiit, bene dormivit.

Sensim assumsit quatuor scrupulos extracti cicutæ quotidie, & cataplasma ex cicuta tota nocte, & tempore matutino sedulo applicatum fuit, post meridiem autem negligebatur, quoniam hæc matrona in liberum aërem motionis gratia se contulit, & in consortio hominum fuit, qui odorem ingratum ferre non poterant.

Et amavi id , ut sensim viderem, quomodo mamma se haberet sine cataplasmate.

Vidi autem inde nil mali oriri.

Decima septimana mammæ moles fuit admodum exigua , illud autem tuberculum scirrhum fere immutatum perstitit.

Nihilominus tamen & hoc sensim inæquale & fibrosum fiebat, quod spem dedit, fore , ut successu temporis, & usu cicutæ integre solvatur.

Separatæ tales glandulosæ portiones scirrhusæ admodum lente quandoque dissipantur ; pertinaci tamen usu funduntur , & evanescunt, & quum mobilia sint, si præter omnem spem remediis non obedirent, arte possent enucleari, dum necessitas exigeret.

Hæc

Hæc Matrona menstruum fluxum jam post puerperium debita copia, & citra omnem molestiam iterum habuit, sana fuit, & brachio lateris affecti, quod alias debile, & ad longiorem motum ineptum erat, uti optime potuit; exiit in liberum aërem, varios exercuit motus, & nil mali inde in mamma sensit.

Maritus vi sui officii tunc cogebatur iter sat longinquum suscipere tempore adhuc frigido, aspero.

Optavit, ut uxor (quæ omni amore, & veneratione est dignissima) secum esset.

Amici omnes, & omnes noti, præsertim autem mulierculæ (quot enim tales, tot medicastræ) hoc iter optimæ huic matronæ dissuaserunt.

Ego autem consideratis omnibus putavi iter non posse nocere; hinc negle-

etis objectionibus (talibus enim, si medicus obaudit, martyr & mancipium est) suasi maritum comitaretur.

Perficiebatur iter felicissime, adven-
nerunt ad locum constitutum ambo, fru-
entes sanitate perfecta.

Mammæ nil mali, nil boni contigit,
manferunt omnia eodem in statu.

Nunc usum cicutæ tum externum,
tum internum continuat, hinc nullus
dubito, fore: ut id, quod superest, in-
tegre quoque solvatur.

Durante puerperio curam hujus Ma-
tronæ gessit clarissimus, ac Magnificus
Archiater *Kestler*.

Primum autem periculum, primas
& maximas cancri minas pertinaci ci-
cutæ usu superavit celeberrimus medi-
cus Pragensis *Silvester o Hebir*; huic
igitur.

igitur maximæ laudes, & grates debentur.

Etenim certo certius hoc malo mater & infans fuissent interemptæ, si vagorum hominum, & medicastrorum consiliis, quæ innumera fere fuerunt, aures, & mentem dedissent.

Infans jam septimum agens mensem adhuc sanissima est.

An igitur inde non patet, cicutam esse remedium innocentissimum, neque nocere gravidis, neque tenerrimis embryonibus.

CAPUT IV.

COROLLARIA.

Corol. I.) *C*icuta non solvit sanguinem in putridum liquamen.

Pluribus, qui larga dosi & longo tempore usi sunt cicuta venam secui, & inveni semper sanguinem, qui habebat bonum colorem, & optimam consistentiam.

Magnificus Archiater *Kestler* Illustrissimæ cuidam comiti, quæ per plures graviditatis menses cicutam assumsit, paucis ante partum diebus sanguinem e vena misit, & vidimus tunc ambo sanguinem sanorum simillimum.

Idem observavit celeberrimus Harlemensis practicus Joannes van *Woenſel* in matrona, cui per plures menses cicutam dedit.

Dum hæc scribo, sanguinem iterum misi alii comiti, quæ cicuta a binis mensibus utitur, & video eundem optimæ ligatum, & longe saniores, quam fuit
ante

ante usum cicutæ , tunc enim semper sanguis erat tenaci, mucosa, & variegata crusta tectus, fibrosus.

Provoco unum quemque medicum vel chirurgum ad experientiam, qui ex recto usu cicutæ alium quam bonum sanguinem observaverit.

Corol. 2.) Cicuta non adfert consumptionem.

Ex meis aliorumque medicorum experimentis (si ea placet adtente considerare) clare patet, ægros cicuta utentes recuperasse vires integras, & totum corporis habitum factum esse opimum, torosum.

Uso cicutæ sæpissime sistuntur nocturni sudores, augetur appetitus, adjuvatur digestio, restaurantur corporis functiones; cur igitur inde sequatur consumtio? S 4 Cla-

Clarissimus sanitatis confiliarius Leopoldus *Erndl* doluit sæpissime, tot pueros puellasque in suo nosocomio phthisi scrophulari consumi, interire.

Varia remedia per plures annos summa cum industria adhibuit, rebelli tamen huic morbo limites ponere nequaquam potuit.

Unde tentavit cicutam larga dosi, & mox omnia mutabantur in melius, pueri alias stupidi, meticulosi, cachectici, emaciati, fiebant alacres, fortes, pingues, & glandularum scirrhi sensim fundebantur.

Doctissimus hicce vir me sæpius ad suum nosocomium humanissime invitavit, & mihi magno cum gaudio ostendit, quam egregios & miros effectus in pueris & puellabus atque etiam in terrimis infantibus præstet cicuta.

Pluribus, experimenti gratia, cicutam jam in secundum, tertium, & quartum annum præbui, sani sunt, vegeti, robusti, agiles, & ad omnia apti.

Cur hi non contabescunt?

Corol. 3.) Cicuta visum non hebetat.

Etenim contrarium semper in meis ægris vidi effectum.

Quoniam multi inter eos fuerunt, qui oculos habebant turbidos, continuo fluentes, aut urentes ex perpetuo acrium lachrymarum affluxu, atque propterea perspicillo utebantur, verum sumta per aliquot tempus cicuta, hæc oculorum vitia emendata sunt, & plures potuerunt perspicillo carere.

Corol. 4.) Cicuta non demit generandi potentiam.

Habui militem, quem largo usu ci-

cutæ intra bimestre spatium a glandulis submaxillaribus tumidis & scirrhis, atque ab ingenti colli struma liberavi.

Integerrime curatus, & sanus ex nosocomio discessit, post quatuordecim dies autem iterum rediit ad me laborans pessima gonorrhæa venerea, quam se altero die, quo ex nosocomio abiit, contraxisse fatebatur.

Hunc eundem militem dato omni octiduo purgante hydragogo, dato decocto bardanæ, & usu cicutæ, spatio quinque septimanarum ab hac gonorrhæa, sat rebeli, sanavi.

Alios viros, qui magna copia, & longo tempore cicutæ extractum assumpserunt, hoc super articulo scrupulose

fæ-

sæpius examinavi, rogavique, mihi verum dicerent.

Ast fatebantur omnes se in naturæ vigore nil mutatum sentire, imo quidam contendebant sibi naturæ opus restauratum fuisse.

Vir sexaginta sex annorum, paralyticus, cicutam jam in sextum mensem assumfit, & quidem tanta copia, ut jam per novem septimanas quotidie drachmam unam cum dimidia deglutiat.

Inter alios bonos effectus, quos inde habet, mihi sponte narravit: naturam jam per duodecim annos integre dormivisse, evanuisse; nunc autem ex usu cicutæ eam evigilare, erigi, & eodem modo agere, atque dum fuit vir triginta annorum.

Uxo-

Uxores dein, quorum mariti cicuta utebantur hac super re serio, & medice rogavi; verum & hæ omni ex parte contentæ erant, & sua mihi conscientia confirmabant, se nequaquam mariti naturam debiliorem experiri.

Eram hoc in articulo admodum religiosus.

Verum ne aliis tantum crederem, id in me ipso (qui homo sum) experiri volui, sumsi propterea cicutæ extractum per tres septimanas notabili fatisdosi.

Neque quidquam in me mutatum deprehendi, nisi: quod urina paulo copiosius fluxisset, & appetitus longemajor exstiterit, quodque fuerim agilior, jucundior; & mansi homo integer.

An cicuta tuto datur in scirrhis abdominalibus? Multi

Multi non abs ratione timuerunt, posse excitari suppurationem, quæ lethalem tympanitidem adferret.

Dico autem ex numerosissima experientia: me multos ope cicutæ scirrhos in ventre dissipasse, me curasse pluries hydropem, a scirrhosis abdominis visceribus ortum, nunquam autem suppurationem supervenisse, neque inde natam esse tympanitidem.

In foeminis quidem sæpius vidi, usu cicutæ ex utero profluxisse materiem puriformem, & scirrhos hac ratione esse solutos; judicavi tunc: materiem solutam ductu naturæ innocuam viam affectasse, & quæsisse naturalem exitum.

Doctissimus Dominus *Collin* mecum frequenter idem adhibuit remedium in
ven-

ventris indurationibus, neque bono inde effectū caruit, mali autem prorsus nihil observavit.

Cum tamen in aliis corporis partibus usu cicutæ quandoque suppurationi oriatur, ratio dicat: posse id & in ventre contingere; verum hæc bonum medicum non debent detertere.

MONITA.

Enarravi plurimos casus, in quibus cicuta convenit, neque tamen contendendo, soli cicutæ semper confidendum esse.

Alia subinde remedia debent jungi cicutæ.

Medicus suas indicationes judiciose sequatur, necesse est.

Chirurgus externe mutet, addat, demat, quæ ratio, experiētiis fundata, jubet. Multi

Multi male meam ex primo de cicuta libello opinionem intellexerunt, etenim putabant: me dare remedium, quod solum sufficiens in omnibus casibus, & universale crederem.

Verum nequaquam id volo.

Sed adfirmo solummodo: cicutam præstare talia, quæ alia remedia, maxime heroica, nequeunt.

Cancrum curat, id, multiplici experientia convictus, vidi.

Nec tamen assero omnem inde cancrum curari.

Nec assero foli tantum cicutæ opus totum esse semper committendum.

Ex centum ægris, quas alii medici dereliquerunt, & habuerunt pro desperatis, si unam ego servo, & curo, mihi sufficit; ast numerus curatarum est longe major.

Mer-

Mercurius curat luem veneream; verum an is semper convenit? an is semper curat? quot non milleni hoc morbo exstinguuntur?

Cortex peruvianus fugat febrem intermittentem, & tamen dantur febricitantes, quos non juvat, quot non sunt, quibus nocuit?

An propterea talia remedia negligenda, & pro nocivis, aut inutilibus habenda sunt?

Idem de aliis remediis specificis dictis judicabunt periti medici.

Si qui sunt, qui ex idiosyncrasia, aut propter complicata symptomata cicutam ferre non possunt, hi abstineant.

Si symptomata, morbo juncta, aliud exposcant remedium, cur illud non simul exhibeatur cum cicuta?

Pur-

Purgans sæpius requiritur.

Subinde necesse est, venam secare.

In plethoricis haimorrhagiæ non illico sunt sistendæ; hæ enim similibus ægris longe melius conducunt, quam venæ sectiones.

In debilibus autem cito, & optime sistuntur fungo agarico quercino.

Agaricus autem tantum eo in loco debet applicari, ubi sanguis prodit; etenim extensus supra totum ulcus aut vulnus nocet, & sæpe lethalis est.

Quandoque antiphlogistica, & refrigerantia præter cicutam indicantur.

Hoc sæpius in arthritide, & rheumatismo contingit.

Externe quandoque emollientia, quandoque digestiva, quandoque adstringentia requiruntur.

T

Quan

Quandoque ferro materiei debet exitus pandi, quod in spina ventosa toties observavi, ut nimirum cariosum, & corruptum a sano posset separari; quandoque cancer fungosus debet cultro tolli.

Ne autem in similibus casibus recidiva contingat, usus internus externusque cicutæ prohibet, & sufficit.

Quandoque autem callosa canceri labia, aut ipsi canceri fungosi solo remedio sequenti consumuntur.

℞. Pulv. herb. cicut. dr. iijß
mell. rosar.

unc iij

Hoc remedium supra lintea carpta extenditur, & loco affecto toties recenter applicatur, quoties medicus aut chirurgus necessarium judicat.

Affi-

Affiduus & judiciosus medicus, bonus & expertus chirurgus, si mutuum in desperatis morbis curam impendunt, sæpenumero præstant miracula.

Si autem hi dissentiant, aut morbum tractare non noverint, æger patiatur, aut moriatur, oportet.

Si foeminæ statim in principio mala sua detegant, & si medici debito tempore cicutam applicent, certus sum: nos intra aliquos annos raro visuros mammarum cancrum.

Cicuta nequaquam strictum exigit vitæ regimen.

Admittit ea omnia, quæ ægri ventriculus facile digerit, & quæ in bonum nutrimentum transeunt.

Neque interdicitur vinum, neque
vetan-

vetantur acida, prudenti & moderata
copia assumpta.

Et quivis medicus ipse novit, quid
ægro suo conveniat, quid noceat.

Lex universalis non datur.




ANTONII STÖRCK,

SACRÆ CÆSAR. REG. APOST. MAJESTATIS CONSILIARI
AULICI, ARCHIATRI, ET IN NOSOCOMIO CIVICO
PAZMARIANO PHYSICI,

SUPPLEMENTUM
NECESSARIUM
DE
CICUTA,


UBI SIMUL JUNGITUR CICUTÆ IMAGO,
ÆRE EXCUSA.



VINDOBONÆ,

TYPIS, JOANNIS THOMÆ TRATTNER, CÆSAR. REGIÆ
APOST. MAJESTATIS AULÆ TYPOGR. ET BIBLIOPOLÆ.

MDCCCLXI.



OFFICE OF THE

SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
JAN 10 1892
RECEIVED
THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.



PRAEFATIO.

Magnorum medicamentorum
historias si attente legimus,
videmus: de eorum efficacia sem-
per & ubique acriter fuisse disce-
ptatum.

Fuerunt medici, qui ea ilico
damnarunt, & tanquam noxia pro-
scripserunt.

Alii autem, factis contrariis experimentis, ea laudarunt, commendaruntque, ut maxime salutaria.

Doctis his litigiis tandem res in ordinem fuit redacta, & recepta in usum communem.

Idem cum cicuta futurum, clare prævideo.

Interim doleo vehementer, quosdam viros medicos, in magna dignitate constitutos, nunc nimis præcociter & severe protulisse suam contra cicutam sententiam, eamque, ut plantam venenatam & inutilem, damnasse, aliis dissuafisse.

Sapit hoc nimiam contradicendi

di cupidinem, & medicinæ rationali repugnat.

Quod autem omnium mihi acerbissimum accidit, est: eos experiri summos adversarios, quos magna semper pietate colui, quos omni officii genere affeci, & quorum potius fuisset, meas tueri partes, quam lædere.

Verum nec inde moveor, nec vindictam fitio: & ut hi mei adversarii vere agnoscant, meum animum propterea nequaquam ab iis esse alienatum (licet opinione dissentiam) has observationes in ipsorum honorem scribo, ipsis offero, & debita reverentia dedico.

Nec tamen ullo modo eos oro, ut
quid in mei favorem faciant; ament
tantum veritatem, agant justos rei
arbitros, & id fateantur ingenue,
quod cedit in decumbentis salu-
tem.

Inanes quorundam clamores non
curo, flocci facio.

Qui foliorum strepitum timet, ne
adeat sylvam.





SUPPLEMENTUM
NECESSARIUM
DE
CICUTA.

Binis voluminibus jam demonstra-
vi, confirmavique, quænam insit ci-
cutæ vis, & efficacia.

Non opus propterea fuisset, ut
denuo super eadem materia uterer ca-
lamo.

Quum vero multi adhuc sint, qui
meæ cicutæ ideam non habent, deque
ejus specie, & caractere disceptant,

neceſſarium erat, hanc plantam ære excudere.

Ut autem hoc rite, & ad omnium intellectum, facillimum, clariffimum, & ſine errore fieret, rogavi celeberrimum ac indefeſſum institutionum, & materiæ medicæ Profefſorem *Crantz*, velit Is hanc herbam in ſuum hortum botanicum ſuſcipere, & accuratiſſimæ expreſſionis gerere curam.

Præſtitit hoc lubentiſſime, & tradidit mihi hanc tabulam, a doctiſſimo Domino *Cipps* Medicinæ Candidato pictam, & ſculptam.

Ex hac quivis in re herbaria vel parum peritus, primo ſtatim intuitu plantam diſtinguet, & ab omnibus aliis dignoſcet.

Extractum vero non ubique ad
meam

meam mentem paratur: fumunt enim succi expressi ingentem copiam, eam in vase cupreo igne satis forti coquunt, foetor inde ingens longe lateque spargitur, avolat, quod est optimum; praeterea nimium sollicite succum & extractum purificant.

Fit hac ratione massa nigricans, tenax, haud multum foetens.

Mea autem methodo dum paratur, debet esse extractum crassum, ex fusco viridescens, & ingratissimum habens foetorem (qualem mures domestici spargunt)

Quidam alias herbas cum cicuta miscuerunt.

Quidam relinquunt herbam recenter collectam in uno cumulo per plures dies, unde flaccescit, & quæ-

dam pars corrumpitur, succus lentescit, fit mucilaginosus.

Subinde succum expressum non illico igni admovent, sed per duos ternosve dies expectant, donec tempus ipsis commodum, & opportunum videatur; fit tunc in succo alteratio, & virtus minuitur.

Hac occasione putavi: non incongruum fore, si iterum adducam quasdam curationes, quas sola cicuta ab eo tempore, quo secundus libellus prodiit, perfeci.

Brevis ero, ne otium turbem, aut tempus, medicis adeo pretiosum, longa narratione absumam.

Ubi dico, me *cicutam* dedisse, semper intelligo cicutæ extractum, id noto, ut lites de vocabulo evitem.

nec

Nec ubique medicamento dosin addidi, quoniam fere semper a parva quantitate incepti, & eousque sensim ascendendi, donec sequeretur bonus effectus, & tunc substititi, nec amplius dosin auxi.

CASUS PRIMUS.

Vir, triginta aliquot annorum per plures menses habuit ingentem in abdomine dolorem & continuum ardorem; non appetiit, urina fuit strangu-riosa, alvus frequens, semper pauca, ardens, & cum tenesmo juncta; color faciei pallidus, corpus totum macilentum.

Remedia cujuscunque generis tentata, nil profuerunt, imo turbabatur somnus, & incipiebant deficere vires.

Ci-

Cicuta sola spatio trium septimanarum juvit ; rediit appetitus , alvus fiebat naturalis , urina libere fluxit , accessit totius corporis robur , & perfectæ sanitatis habitus.

CASUS SECUNDUS.

Juvenis , 15 annorum , jam a tribus annis in gena sinistra gessit tumorem magnitudine nucis juglandis.

Hunc tumorem penetravit fistula , ichorem plorans.

Medici & chirurgi frustra suam artem hic tentarunt longo tempore.

Data autem cicuta , & disparuit tumor , & apertura fistulæ perfecte coaluit , & cessarunt omnes dolores.

CASUS TERTIUS.

Fœmina , 40 aliquot annorum , ultra anni spatium , in manu habuit

buit pessimam serpiginem, & cutis in pluribus partibus ad carnem usque findebatur.

Nec externa remedia, nec interna purgantia & sanguinem purificantia attulerunt levamen.

Cicuta intra binos menses sanavit.

CASUS QUARTUS.

Fœmina, 30 aliquot annorum, in mamma dextra jam a pluribus mensibus scirrhum magnæ molis advertit.

Applicabatur emplastrum, quo & durities & mammæ volumen augebatur, extensumque malum fuit infra axillam.

Color fiebat purpureus, hinc inde erant striæ lividæ, & dolor adeo vehemens, ut diu noctuque ægra dormire non potuerit.

Tan-

Tandem tumor elevabatur in tubera, quæ pessimam exulcerationem minitabantur.

Ego acerfitus rogavi, vellet omne emplastrum femovere, nihilque adponere exterius præter linteum molle.

Pro interno remedio solum cicutæ extractum præbui.

Spatio octo dierum cessavit fere omnis dolor, mutatus est tumoris color, subsederuntque tubera.

Et nona septimana mamma naturalis fuit.

Maxima dosis per diem erat drachma dimidia.

CASUS QUINTUS.

Fæmina, 27 annorum, a viginti tribus septimanis fere omnia ingesta vomitu rejecit, & fere contabuit.

Me-

Medici, chirurgi, agyrtæ, & vetulæ jam omnia artis auxilia attulerunt citra ullam mali emendationem.

Exhibui extracti cicutæ grana viginti in mistura quatuor unciarum, ex qua fumebatur omni bihorio cochleare unum, & brevi cessavit vomitus, fæmina appetit, & redeunt vires.

Et jam tertius mensis est, quo nec vomitus signa advertuntur.

CASUS SEXTUS.

VIr, septuaginta annorum, jam in quintum annum ulcus in brachio habuit; acre transsudans vicinas partes continuo arrosit, & excitavit ardentes pustulas.

Remedia adhibita malum quidem levarunt subinde, mox autem iterum ortus est pruritus, rupta est cuticula,

&

& ulcus denuo coëpit acerrimum ichorem plorare.

Sumpsit dein æger, me suadente, omni mane grana sex extracti cicutæ & totidem vesperi per quinque septimanas, externe applicatum est emplastrum diapompholygos; & jam nunc in sextum mensem firmiter clausum est ulcus, & senex bona gaudet valetudine.

CASUS SEPTIMUS.

Nobilis matrona mammam utramque habuit scirrhosam magnam.

Emplastrum appositum omnia irritavit, excitavitque dolores magnos.

Papilla mammæ dextræ fuit solito duplo major, exulcerata, & continuo ploravit ichorem acrem, erodentem, tumor jam infra axillas extendebatur.

Præ dolore hæc matrona fere nec

lo-

loqui, minus ridere, aut libere respirare potuit.

Data cicuta malum mox emendabatur, papilla intra quatuor septimanas ad statum naturalem redacta est, & quarto mense mammæ ambæ fuerunt sanæ.

Neque opus erat, dosin ultra octodecim grana per diem augere.

CASUS OCTAVUS.

Vir, 30 aliquot annorum, tumorem pugno virili majorem in colli parte dextra habuit jam a longo tempore.

Erat præterea cachecticus, laborabat vehementibus doloribus, qui totum corpus & omnia membra die noctuque torquebant.

Minuebatur propterea appetitus,

B

&

& supervenit corporis macies, & faciei color ex flavo fuscus.

Quæcunque ad sanandum fuerunt adhibita, nil profuerunt.

Quamprimum autem bonus vir me consuluit, dedi cicutam, qua intra paucos dies omnia mutabantur in melius, & post binos menses aderat sanitas.

CASUS NONUS.

FÆmina, 36 annorum, ulcera maligna, quæ nasi apicem, nasi alas, & totum oris labium superius profunde exedebant faciemque totam aspectu turpissimam efficiebant, a binis annis habuit.

Et omnes hæ partes erant lividæ, duræ, tumentes, & dolor vehemens noctes infomnes reddidit.

Ichor

Ichor continuo emanans partes adjacentes arrosit.

Remedia purgantia, antiscorbutica, mercurialia, sanguinem depurantia nil mutarunt, & malum videbatur inde longe pejus fieri.

Adhibita cicuta ichor copiosissimus, sed longe blandior, effluxit, mox partes omnes detumuerunt, dolor evanuit, lividus color mutatus est in naturalem.

Spatio trium septimanarum ingens observabatur mutatio in melius, & agra fuit longe robustior, pinguior.

Abstinit tunc per aliquot tempus a cicuta, verum res mox iterum in pejus ivit, & dolores aucti sunt.

Quamprimum autem cicuta iterum coepit uti, omnia mala symptomata dis-

paruerunt, & continuato dein usu fescui mensis spatium ulcera cicatrice obducta sunt, & omnis tumor evanuit.

CASUS DECIMUS.

FÆmina, 32 annorum, a sex annis habuit dolorem in inguine dextro, aderat præterea ibi tumor durus, & ex utero exstillavit materies acris, purulenta.

Causam hujus mali in ultimum partum rejecit, qui minus felix fuit, & obstetrix magna vi evulsit placentam.

Nec Balnea nec medicamenta, jam in sextum annum adhibita, malum mutarunt.

Usu autem cicutæ spatium sex septimanarum tumor disparuit, fieset dolor, & cessat fluxus materie acris.

CASUS UNDECIMUS.

Homo, 29 annorum, variis malis venereis per multos annos vexatus est, nunquam autem integre curabatur.

Glandulæ colli, inguinum, circa aures, sub axillis &c. demum intumuerunt, multumque dolorem diu noctuque ægro crearunt.

Remedia antivenerea, & in his casibus alias optima, malum auxerunt, & timenda erat consumptio.

Unde abstinuit ab omni remedio suadentibus Medicis.

Res inde nec in melius, nec in pejus mutabatur, nisi quod dolores subinde fuerint admodum atroces.

Tandem derelictus est penitus a suo medico ordinario, qui dixit: rem naturæ committeret.

Æger autem in aliquot aliis vidit bonum effectum cicutæ; unde spe fretus me accessit, rogavitque: an non & sibi conveniret hoc remedium.

Suasi illico, & spatio duorum mensium erat curatus, & nihil de scirrhis superfuit.

CASUS DUODECIMUS.

Virgo, 17 annorum, in tertium annum spinam ventosam habuit in brachio dextro.

Aderant simul fœda ibi ulcera.

Remedia fere innumera externa internaue nil effecerunt.

Venter fiebat durus, magnus, membra occupavit dolor dilacerans, accessit cachexia, virium dejectio, macies.

Cicuta sola ventrem ad molem na-

tu-

turalem reduxit, dispulit dolores, cachexiam, maciem; & sanavit ulcera, & spinam ventosam.

CASUS DECIMUS TERTIUS.

Puer septem annorum, glandulas omnes colli & circa aures habuit scirrhas, magnas, dolentes.

Venter præterea quoque durus, & magnus fuit.

Dabantur mane grana sex extracti cicutæ, & totidem vespere, celer erat inde effectus, atque omnes tumores intra decem septimanas evanuerunt.

CASUS DECIMUS QUARTUS.

FÆmina, 25 annorum, jam in quartum annum tussim vehementem habuit, & pruritum ingratissimum per totum corpus.

Subinde per universam cutim proruperunt pustulæ albicantes, pellucidæ, urentes, rodentes.

Longo remediorum usu tandem cœpit contabescere.

Hoc in statu exhiui bis quotidie quatuor grana extracti cicutæ; & mox prodixit sputis copiosum ac tenacissimum gluten, disparuit pruritus, nunc redeunt vires, bonusque corporis habitus, & adest sanitas.

Hæc dosis non erat augenda, quoniam præstitit, quod optabatur.

CASUS DECIMUS QUINTUS.

Vir, 60 aliquot annorum, post febrem intermittentem habuit ventrem inflatum, hypochondrium dextrum tensum, durum, faciem flavam non appetiit, membra dolore noctur-

no

no excruciantur, & erant emaciata.

Cicuta hunc integre restituit.

CASUS DECIMUS SEXTUS.

Seni, 70 annorum, vomitus violentissimus, quo jam in tertium mensem laboravit, nullo remedio fisti potuit.

Cicuta, in mistura soluta, hunc brevi inhibuit, compescuit.

CASUS DECIMUS SEPTIMUS.

Infans, trium annorum rachiticus nec pedibus poterat insistere, nec libere respirare.

Cicuta fecit, ut morbus totus disparuerit, ut infans respiret commode, curratque alacriter, cæterosque suos fratres sanitate superet, similes casus plures habeo.

In quibusdam quatuor aut sex grana per diem sufficiunt, in aliquibus vero debet dosis ad grana decem, duodecim, aut viginti augeri.

CASUS DECIMUS OCTAVUS.

Virgo, 26 annorum, uteri hæmorrhagiis vehementissimis ab aliquot annis erat subjecta; & fluxu sanguinis cessante prodibat ex utero materies crassa, subflava, acris, omnia erodens.

Alii celeberrimi Medici, egoque longo tempore tentavimus remedia fere innumera, levamen autem inde ægra nullum sensit, imo fiebat cachectica, & intumuit.

In casu adeo rebelli volui experire, quid cicuta sola efficeret; dedi propterea ter quotidie tres pilulas, quarum quælibet habuit grana tria. Post

Post paucos dies vidi totius corporis colorem mutari in naturalem, augeri vires, vigere appetitum; prodiitque urina copiosa cum multo glutine.

Intra mensis spatium totus morbus jam longe aliam faciem habebat.

Etenim libera erat respiratio, quæ antea a minimo motu fere suffocabatur, filuit anxia cordis palpitatio, & somnus fiebat tranquillus.

Quod autem maximum, cessarunt uteri hæmorrhagiæ, comparuitque fluxus menstruus debito tempore, debita copia, & qualitate.

Materies utero effluens nec amplius crassa, nec acris fuit.

Post binos menses hæc optime sanā omnibus videbatur, & paucum tantum

tum, blandumque serum ex utero exstillavit.

CASUS DECIMUS NONUS.

VIr, sexagenario major, sub mento tumorem magnitudine ovi asserini & lapidis instar durum, dolentemque habuit, qui immobilis & immutatus perstitit, licet remedia interna externaque fuissent longo tempore tentata.

Cicuta eum autem solvit, dissipavit spatio duorum mensium.

CASUS VIGESIMUS.

Fæmina, 40 annorum, cachectica, melancholica, cœpit sensim contabescere.

Nullum in corpore manifestum vitium, quod huic morbo causam præberet, poterat detegi.

Fa-

Facies erat terrei coloris , oculi profundi , vox debilis , cordis palpitatio frequens , respiratio ex paulo fortiori motu fiebat anxia , brevis ; appetitus erat penitus deletus.

Remedia , alias usitata in similibus casibus , nullum levamen attulerunt.

Tres autem cicutæ unciaë , successive deglutitæ , restituerunt appetitum , corporis vigorem , animi hilaritatem ; correxerunt cachexiam , & jam hæc fæmina cum omnium admiratione optata sanitate fruitur.

Cachexia & corporis attenuatio , si non pendet a vomica intus latente , aut a corrupto quodam viscere , cicuta plerumque curatur.

CASUS VIGESIMUS PRIMUS.

DEcennis puer a spina ventosa per totum corpus & circa omnem fere articulationem, ut & in facie, & circa oculos misere exulceratus, emaciatus, & totus cacheticus per plures annos varia ab optimis medicis frustra assumpsit, imo morbus semper ruit in pejus.

Data sola cicuta coaluerunt jam omnia ulcera, nec cicatrices foedæ sunt, magna ossium fragm antefecerunt, adsunt bonæ vires, naturalis faciei color, & habitus totius corporis est sanus.

Sensim augendo dosin jam per plures septimanas drachmam integram extracti cicutæ quotidie assumpsit.

CASUS VIGESIMUS SECUNDUS.

FÆmina, quadraginta major cancro aperto, miserrime exulcerato, jam in secundum annum laboravit.

Ufu interno externoque cicutæ ulcus totum jam fere coaluit.

Erat antea tota macilenta, noctu sudavit, non appetiit.

Nunc autem adfunt optimæ vires, color faciei bonus, somnus tranquillus, abest dolor, cessavit fudor, evanuit macies,

Datur jam quotidie drachma una cum dimidia de cicutæ extracto.

In alia fæmina, triginta aliquot annorum, cancrum apertum, magnum, solo cicutæ usu intra sex septimanas ad exiguam molem redegit; & jam incipit formari cicatrix.

Hi

Hi casus in civitatis praxi mihi ob-
venerunt, ea autem, quæ in nosocomio
vidi, & quæ certo mira sunt, & orbis
litterati adtentionem merentur, hic
referre non potui, quoniam Dominus
Collin, optimus meus collega, ea fide-
liter describit, & brevi dabit prælo.

Adeo bonos, & adeo manifestos de
cicuta in nosocomio effectus quotidie
videmus, ut non tantum artis studiosi,
sed alii ignari, qui circa ægros sunt,
mirentur, obstupescant.

Verumtamen sunt quidam casus,
qui non succedunt.

Morbus enim si jam nimium fue-
rit progressus, aut si totius corporis
habitus fuerit penitus destructus, quis
est, qui curabit? aut quænam Medici-
na sanitatem promittet?

Nec

Nos nec facimus , nec cupimus a nostris medicamentis miracula , sed attendimus quousque possimus arte pervenire.

Si obstaculum invenimus , consideramus : an id arte superandum ; dum id præstare non possumus , agnoscimus nos esse homines , & adhuc multa ignorare.

Nequaquam nobis imaginamur , nos aliis esse arte majores , sed cupimus quotidie vel ab infimis doceri.

Rogamus autem quoque alios , ut eadem mente in nos utantur , si erramus , aut erravimus , nobis monstrent debita amicitia & decenti methodo errorem ; & nec erubescemus meliora erudiri , nec erimus pertinaces.

COROLLARIUM PRIMUM.

Cicutæ extractum est remedium maxime innocuum.

Potest, sensim augendo dosin, exhiberi per diem ad drachmas duas, tres, quatuorve.

Et tantæ dosis usus potest per plures septimanas tuto continuari.

Non nocet cicuta infantibus, nec pueris, nec mediæ ætatis hominibus, nec senibus, nec decrepitis, nec fœminis gravidis, nec embryoni in utero latenti, nec nobili, nec plebejo.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Cicuta nec majorem motum, nec in sanguinis circulo turbam excitat. Neque refrigerat, nec calefacit.

COROLLARIUM TERTIUM.

Cicutæ extractum est medicamentum efficacissimum.

Raro tamen alvum movet, & rarissime vomitum, quandoque transpirationem auget, sæpe autem urinam copiosam & glutinosam prolicit.

In plurimis tamen ægris nullam excretionem sensibilibiter auget.

COROLLARIUM QUARTUM.

Cicutæ extractum vim maximam resolvendi habet, & ibi sæpe penetrat, & illuc pertingit, quo fortissima hucusque cognita remedia pervenire non potuerunt.

Obstructa referat; hinc sanguinis circulum turbatum, & impeditum redigit in ordinem.

Unde languorem , torporem , doloremque in membris (a simili causa pendentem) tollit.

Mentem reddit serenam , corpus ad agilitatem roburque naturale disponit.

Auget secretiones , unde sæpe aures , nares , os , faucesque siccas , reddit humidas , transpirantes.

Viros steriles , ob vasorum immedialitatem aut obstructionem , reddit fecundos.

Fœminarum uterum mucosum induratumque reserat , fluxui menstruo a simili causa impedito viam pandit , & conceptioni parat locum.

Infantes a rachitide liberat.

Membris sæpe stuporem , frigus , insensibilitatem , & marcorem aufert ; atque efficit , ut redeat naturalis calor ,

lor, musculorum vigor, & torofitas, fenfusque neceffarius.

Eadem ratione oculorum vafa liberat, vifum impeditum reftituit, difpellit quandoque amaurofin.

Huic eidem remedio sæpe furditas cedit; sæpe odoratus perditus ejus ufus iterum reftituitur; loquela impedita, fit sæpe libera, diftineta.

Refolvendo tollitur sæpe rheumatismus, aut dolor articulorum inveteratus, & pertinaciffimus.

COROLLARIUM QUINTUM.

Cicuta tumores ab obftructione ortos folvit, funditque fcirrhos etiam antiquos, & omnibus aliis efficaciffimis remediis refiftentes.

Nec intereft in quam corporis regione tales tumores lateant; æquali

vi in omnes partes agit: sic referat glandulas sublinguales, subaxillares, circa aures, in collo, sub axillis, in pectore, ventre, inguinibus, in ano, uteri vagina, utero, pene, scroto, testiculis &c.

Ventris scirrhus solvendo sæpe hydropem curat.

Infantum ventres duros infarctosque emollit, & ad statum naturalem reducit.

Unde sæpe cachexiam corrigit, & ipsam phthisin, aut hecticam febrem fugat, sanat.

Pulmonum scirrhus fundit, producitque sputum glutinosum, hinc tollit difficilem respirationem, sudorem nocturnum, tabem.

Articulorum tumores dissipat , & reddit flexilitatem , partiumque motum.

COROLLARIUM SEXTUM.

Cicuta subinde fundit cataractas , aut eorum progressum impedit.

Et hac ratione visum conservat , aut auget , aut perditum restituit.

COROLLARIUM SEPTIMUM.

Sanguinis acrimoniam emendat & morbos inde pendentes tollit.

Curat acres fluxiones , falsedines , pruritus , serpiginem , tineam pessimam , inveteratam & ad omnia rebellem scabiem.

Sanat ulcera maxime maligna , fistulas , sinus ,

COROLLARIUM OCTAVUM.

Tollit ossium cariem, aufert corruptionem; lamellarum separationem adjuvat.

Hinc remedium est in spina ventosa.

COROLLARIUM NONUM.

Cancrum curat, aut emendat ejus acrimoniam, pusque bonum inducit, sopit dolores.

COROLLARIUM DECIMUM.

Remedium est contra fluorem album malignum, contra gonorrhæam inveteratam, rebellem.

COROLLARIUM UNDECIMUM.

Vomitum sistit, & pertinacissimas cardialgias.

COROLLARIUM DUODECIMUM.

Tollit reliquias ex morbo venereo superstites, quæ nulli alii remedio cedunt.

CO-

COROLL. DECIMUM TERTIUM.

Cicuta curat morbos, qui post malignas variolas sequuntur.

Ad hoc confirmandum binas mihi historias scripsit celeberrimus hujus civitatis medicus Dominus *Lebmacher*.

Historia prima est de proprio ejus filiolo, quam ita habet: „charissimus „meus quinque mensium filius, „nissimus, vigesimo sexto Februario „anni 1760 variolis corripitur, quæ, „licet discretæ, non tamen adeo bonæ „indolis erant.

„His dum nono morbi die subita „diarrhœa accederet, factum est, ut „omnes sinistri lateris pustulæ a facie „ad pedem usque collaberentur, dum „illæ lateris dextri elevatæ manerent.

„ Dum hæc fiunt, brachium totum
„ finistrum, genu pesque finister ex-
„ tremus mirum in modum intumue-
„ runt, cum motus impotentia, &
„ dolore summo; quem misellus tri-
„ stissimo ejulatu, si attrectaretur, te-
„ stabatur.

„ Verum hæc mala nullo aperturæ,
„ nec natura, nec arte faciendæ, in-
„ dicio industria dexterrimi chirurgi
„ *Leber* quatuor fere mensium spatio
„ percurata sunt, ut nullum sive mo-
„ tus sive alterius actionis impedimen-
„ tum superfuerit.

„ Interim cum morosus puer neque
„ in variolis, neque toto alio tempo-
„ re ullum medicamentum, seu vi seu
„ fraude assumeret, quin illud subito
„ ore redderet, nec lac maternum cum

„ ci-

” cibis lacteis demulcendæ cacochy-
” miæ variolosæ sufficeret, successu tem-
” poris totum corpus innumeris, icho-
” iosis, pessimis ulceribus a vertice
” ad plantam usque ita depascebatur,
” ut præter turgidum abdomen sola
” ulcerosa cutis ossa tegeret.

” Suo fato in deplorando hoc sta-
” tu usque ad vigessimum primum æta-
” tis mensem, Junium nempe 1761 re-
” lictus puer nullam omnino salutis
” spem dederat, omnibus quotidie in
” pejus ruentibus. Volui tandem ten-
” tare quid extractum cicutæ, quo-
” modocunque ingestum, in hoc mor-
” bo efficere possit.

” Dedi itaque ad initium Junii quo-
” tidie grana duo unum mane in bacca-
” rum caffèæ & hordei tosti decocto

” te-

” tenuiori , addito lacte , & alterum
” vesperi, ne adverteret, in potu cocco-
” latae.

” Sic sensim dosin auxi, ut quoti-
” die grana sex fumeret, nulla interim
” habita dietæ ratione.

” His factum est, ut ulcera bonum
” pus fundere, depurari, consolidari,
” in toto corpore evanescere incipe-
” rent, una alterave crusta in parte
” capillata capitis restante.

” Viribus jam medio Julii ita auctis,
” ut agilis in cubiculo forisque erecto
” capite, oculis nitidis, apertis, cur-
” reret, nec solis radios, nec candelæ
” lumen formidans, quod per duos
” menses ob inflammatos oculos ad-
” motis semper ad easdem manibus de-
” misso capite ferre non potuit.

” Sic

„ Sic sensim morosissimus antea
„ puer jam tota fere die ludibundus
„ alacriter currit.

Simplis autem extracti cicutæ drachmas sex, nec aliud præterea medicamentum.

Lectores optimi! si vel unicus hicce casus esset: an non cicuta maximam laudem mereretur?

Data est cicuta infanti extenuato, ulcerato, pessime cachectico, curatus inde est hicce infans.

Est igitur cicuta remedium innocens, est remedium efficax.

Sunt quidem terribiles in medicina calculatores, qui forsan hanc curationem in decoctum hordei tosti, vel infusum caffèe, vel in coccolatam, vel in vim naturæ ponent.

Ve-

Verum sciant hi, hunc infanem hos potus jam ante usum cicutæ assumpsisse, & tamen res quotidie ruit in pejus, hinc tunc nec vis naturæ egit, nec hicce potus. Sed quam primum cicutæ extractum datum fuit, infans coepit melius se habere.

Unde tibi, cicuta! laus debetur.

Secunda historia, ab eodem doctissimo viro mihi communicata, et sequens:

„ Sub finem Junii 1761 forte con-
„ veni nobilem quandam foeminam
„ viginti trium annorum, quæ octo-
„ decim abhinc annis variolis confluen-
„ tibus laboraverat, quam tristes
„ reliquias adhucdum luget; præter
„ amissum enim dextrum oculum ul-
„ cus in gena dextra cum tumore duro
„ habet.

„ Va-

„Varia, ut illa narrabat, interna, externa ad hoc consolidandum tentabantur remedia; sed omnia (ipsa quoque salivatio) incassum adhibita fuerunt.

„Boni de extracto cicutæ in simili etiam morbo successus memor eidem hoc remedium suasi.

„Quæ licet medicamentorum jam pertæsa, annuit tamen.

„Incepit itaque prima Julii fumere de cicutæ extracto quotidie grana octo.

„Ulcus remoto emplastro, nescio quali, linteo, decocto cicutæ madido, foveri curavi.

„Post octiduum jam tumor minor molliorque apparuit, & in margine ulceris levia cicatricis formandæ indicia videbantur.

„Interim in medio ulceris hinc in-

„ de

” de caro fungosa excrevit, quæ in-
” sperso cicutæ pulvere absumpta est.

” Crustam vero melle rosarum, cum
” eodem pulvere permisto, abstuli,
” quæ toties repetebantur, quoties
” fungosa caro repululavit.

” Interea numerum pilularum sen-
” sim auxi ita, ut tribus elapsis heb-
” domadibus jam quotidie grana tri-
” ginta duo fumeret.

” In qua dosi hucusque permanfi
” uno alterove die intermisso.

” Sub hoc tempus tumor, durities
” fere penitus disparuerunt, ulcus de-
” purari, exficcare, & levi pellicula
” obduci cœpit, jamque ita clausum
” per sex hebdomadas manet.

” Perget hæc foemina in eadem cicu-
” tæ dosi, donec firma fuerit cicatrix.

Ab

„ Ab initio Junii hucusque ad finem
nempe Septembris jam sumpsit uncias
„ quatuor extracti cicutæ.

„ Ex nullo alio medicamento per
octodecim annos quidquam profecit.

„ Nunc autem usu cicutæ appeti-
„ tum augeri sentit, pinguescit, dolo-
„ ribus rheumaticis, quibus alias ve-
„ xabatur, libera est, nec de ulla re
„ conqueritur.

An quis sanæ mentis homo dubitat
de cicutæ efficacia?

Cum autem cicuta agat in veneno-
sas variolarum reliquias, oritur quæ-
stio: an non & in ipso morbo variolo-
so, maligno, parca dosi, & prudenti
manu atque provido judicio eam ad-
hibere licitum esset? Naturæ anologum
est, & infinitis experièntiis constat ve-

getabilia cujuscunque generis in nostro ventriculo posse digeri & in inguinales humores converti; id autem de mineralibus nequaquam verum est.

Vegetabilia igitur facilius a nostra natura feruntur, & longe tutius conveniunt.

Ergo: si aliis licuit in virofa variorum dispositione mercurio uti, & antimonio, cur non & nobis daretur venia sine omni conscientiae remorsu, ut cicutam tentaremus, dum optima remedia hucusque cognita nil efficiant? Hi bini casus a doctissimo Lebmacher hic erant maxime necessarii ad thesin meam comprobendam.

Habeo & ab aliis tam hujatis, quam exteris medicis pulcherrimas, & felicissimas de cicuta historias, habeo

beo & tales, quæ minus feliciter successerunt; verum judicavi omnes has in aliudtempus esse asservandas.

MONITA.

Hæc corollaria ex repetitis experientiis deducta, confirmataque sunt.

Rogo tamen omnes, & singulos medicos, ne sibi persuadeant, me ejus esse opinionis, ut credam: hæc generalia esse & ubique cicutam debere curare.

Dico & fateor palam: me quoque in omni genere habuisse ægros, quibus cicutam non profuit, licet ex morbi similitudine fuisset indicata.

Casus tamen quos enarravi veros esse, non credo, erit, qui dubitet.

Si tamen quis de rei veritate am-

bigeret, meamque probitatem suspectam haberet adeat is *Illustrissimum van Swieten*, qui ægrorum nomina habet, habitationisque locum.

Felicem me! cui sub *tanti viri* auspiciis licet facere medicinam.

Vidi ægras pessimo mammæ cancro laborantes, quas cicuta cito juvit, erant autem plures aliæ, quibus cicuta solummodo levamen attulit, non vero eas curavit; aliæ ex usu cicutæ nullam expertæ sunt mutationem; una alterave cicutam non potuit ferre.

Idem circa alios morbos, in quibus cicutam laudavi, intellectum volo.

Nam tantum contendo: cicutam quandoque prodesse, & mira præstare, ubi alia medicamenta maxime celebrata, & heroica, nil valent.

Si

Si & alii medici alia adhuc remedia inveniant, poterimus successive omnes difficillimos morbos sanare.

Profecto! mihi gratulor, dum audio, plures esse medicos, qui circa diversa vegetabilia meum exemplum sequuntur.

Quot adhuc millia plantarum sunt? quarum virtutes ignoramus. Verum ad has detegendas industria, labore, providentia, & animo, ab omni secta libero, opus est.

Nec jura in verba magistri.

Præterea tamen firmiter semper in mente erit tenendum: arti & medicamenti esse limites.

Cum jam cicuta in eodem morbo quandoque proffit, quandoque autem nil præstet, certum est, debere latere quan-

dam differentiam, cujus signa dignostica nobis adhucdum deficiunt.

Neque ego solus ad ea determinanda sufficio; atque ideo nequaquam potui hucusque dare firmas regulas.

Ii autem, qui me adjuvare potuissent, debuissentque, manum traxerunt de tabula, imo acri discursu, & reiteratis ad artis filios sermonibus mea opuscula damnarunt, proscripserunt, igne ferroque ea deleta voluerunt.

Heu me! misera hominum fors.

Ego in binis meis de cicuta libellis casus felices, & infelices enarravi, & monui præterea semper: citutam non omnibus æque profuturam, dixi jam in secundo libello, mihi futurum satis, si usu cicutæ unum ægrum ex centum conservavero & curavero, qui
aliis

aliis medicamentis non potuisset restitui.

Si ex aliis nonaginta novem medicis quivis tantum præstiterit, quantum ego, tunc omnes centum restituentur.

An quis sincerius, honestiusque posset scribere? mundo licet sua experimenta fideliter & caute proponere, cuivis autem medico liberum dein est, velle uti tali remedio, aut velle illud negligere.

Nec honorem, nec gloriam, nec nomen immortale, nec lucrum desidero, vellem tantum esse utilis misero, & ægrotanti humano generi, vellem calamitates levare, auferre; uti cujusvis medici officium postulat, vellem propterea alii me non turbarent.

Aliquot centenas libras extracti ci-

cutæ ægris exhibui, & vera conscientia affirmo : me nulli unquam nocuisse ; etenim dum vidi rem bono esse in tramite acriter perexi, continuavi, auxi dosin ; quamprimum autem observavi (quod quidem rarissime accidit) ægrum inde bene non habere, abstinui seposuique cicutam. Ita ars jubet.

Cum igitur hoc medicamentum prudenter exhibitum nequaquam possit nocere, artis officium exigit, id omnibus plurimum commendetur, ut fiant innumera experimenta, quæ conferantur inter se, comparenturque secundum omnia signa, symptomata, eventus ; inquirentur dein rationes & causæ, cur in eodem morbo quandoque prodest cicuta, & radicaliter curet,

curet , & cur autem quandoque nil efficiat.

Visa differentia , inventa rei causa clare patebit : quousque cicutæ efficacia se extendat , poteritque dein dari ratio : cur cicuta non in omnibus æqualiter agat , & tunc facile erit determinandum , quibus in casibus evidenter conveniat , in quibus præstet nihil.

His in ordinem redactis poterimus iis in casibus ubi cicuta iners est , de alio remedio cogitare.

Tali ratione cum ingenti reipublicæ emolumento limites nostræ artis ampliores fient.

Ego jam in aliquibus casibus , ubi cicuta id non præstitit , quod ex ea speravi , aliud remedium adhibui , nec in successu inanis fui.

Si hoc non sufficit : iterum aliud paratum habeo.

Sic per gradus ascendam , & spe maxima fretus sum , fore ut Deus optimus meos conatus , qui unice in proximi salutem fiunt , fecundet.

Adversariis meis hic sancte promitto: me eo majorem in hoc studii genere operam impensurum , quo magis ipsi conabuntur me turbare , impedire.

Dum recte facio , neminem timeo.

Licet cicuta sit remedium maxime innocuum , optarem tamen , quivis medicus semper a parva dosi inciperet , sensimque augeret.

Novimus enim quam miræ & diversæ sint hominum idiosyncrasæ , hinc possent quidam esse , qui remedium minus ferrent.

Par-

Parva igitur dosi nemo peccabit, quoniam quivis bonus medicus, dum sinistri quid observat, abstinebit a remedio.

Verum bene semper est considerandum : an accidat id ex medicamento : an ex symptomatibus morbum concomitantibus , an ex errore in rebus sex non naturalibus commisso.

Sunt qui ex assumptis lapidibus cancrorum, qui certo remedium sunt innocentissimum, anguntur, vomunt, febre corripuntur, incidunt in animi deliquia, cur non & esse possent, qui, ex latente causa, a cicuta male haberent ?

Verum an ideo cicuta non est medicamentum ? an cicuta ideo debet damnari ? nemo prudens medicus ita cogitabit.

Si

Si usu cicutæ ægro cuidam damnum infertur, id profecto (si rem medice, & stricto sensuprehendamus) non in medicamentum applicatum, sed in errorem applicantis erit rejiciendum.

Sæpe aliena morbo symptomata junguntur, hinc tunc requiritur, ut & alia præter cicutam remedia præbeantur

Si spasmi urgent aut convulsiones, tunc desiderantur nervina, antihysterica.

Si dolores vehementes sint, necessaria erunt remedia paregorica, opiata; febris magna, & pulsus elevatus refrigerantia, nitrosa exigunt.

In nimia corruptione jungitur cortex peruvianus, aut si sub usu cicutæ oritur febris intermittens.

Sub-

Subinde purgatione opus est , subinde venæ sectione.

Nimius in hunc locum acrimoniæ affluxus fonticulum , aut fetaceum postulat.

Neque externe debet semper fomentum aut cicutæ cataplasma apponi , verum mutanda ea sunt , secundum boni medici aut chirurgi iudicium & experientiam.

Si linteis carptis deligentur ulcera , tunc in auferendo debet magna cautela agi , ne adhærentia nudissimis vasculis filamenta vi avellantur , unde possent omnia lædi ; oriretur haimorrhagia , & inde sæpe caro fungosa propululat.

Omnia debent prius lenissimo cicutæ infuso , aliove apto liquido humectari.

Sym-

Symptomata magis urgentia sæpe jubent, ut cicutæ usus tam externus quam internus interrumpatur pro aliquo tempore, donec hæc curata fuerint, aut saltem mitigata.

Qui cicutam non ferunt, cum his palliative est agendum, quamdiu aliud remedium ignoramus.

Subinde ossa, tumores, scirrhi in suo meditullio maximum habent dolorem; observavi sæpius eo in loco tunc fuisse erosionem corruptionemve; corruptum autem a sano debet separari, id autem perfici non potest, nisi fiat apertura versus exteriora, hæc quandoque applicatione medicamenti chirurgici, aut instrumento chirurgico fieri debet, sæpe autem sponte fit ex usu cicutæ.

Pro-

Prodit tunc sanies, & fit ulcus cavum.

Rem minus intelligentes credunt talia ab usu cicutæ fuisse corrupta, erosive, ubi tamen, continuato in eodem casu cicutæ usu tam interno, quam externo, sæpissime sanitas perfecta sequitur.

Vidi aliquoties ex usu cicutæ quosdam in glandulis scirrhus esse solutos, in aliis autem partibus novos comparuisse.

Mirum id erat; verum ægri semper bene se habuerunt, unde pertinaciter idem remedium continuavi, & ægros restitui.

Talia peritum nunquam terrent: & ideo nequaquam debemus ilico mutare medicamentum.

In

In victu sunt farinacea non fermentata vitanda, ut & aromatica nimium acria.

Acida pro condimento conceduntur, prædominantia vero minus conducunt.

Vinum bonum iis, qui assueverunt, non nocet.

In parte affecta frictus, aut motus fortior plerumque malum augent.

Si ægri vivant in aëre puro, libero, & si mentem quocunque modo erectam, & hilarem conservent, multum ad curationem confert.

Tristitia, melancholia, mentis inquietudines curam retardant, impediunt, nova mala producunt, & sæpe ex scirrho faciunt cancerum.

Tem-

Tempus quo cicuta curet, & tumores resolvat, determinari non potest.

Etenim quandoque cito id perficitur, quandoque admodum lente.

Neque semper eadem tumorum, ulcerum, cancrorumque natura est.

Fœminæ ultra duos annos ob colli tumores dedi cicutam magna dosi, nulla fiebat in his tumoribus mutatio, cum tamen menstrua longe liberius fluerent, vires essent majores, mens alacrior, totusque corporis habitus longe magis perfectus, rogavit ipsa ægra, ne sibi negem has pilulas.

Tandem post binos & dimidium annos fundebantur tumores, & omnia ad statum naturalem redacta sunt.

Nec diuturnus usus nocuit.

Aliam foeminam habeo, quæ ob cancrum mammæ tantum mane sumit duo cicutæ grana, & sequitur adeo bona, & celeris mutatio, tumorisque diminutio, ut adstantes & ego admirerur, licet foemina sit septuaginta annorum.

Urina huic foeminæ copiosissime profluit, cum multo glutinoso sedimine; dum autem uno die a cicuta abstinet, pauca est urina, nec videtur sedimentum.

In morbis circa renes, vesicam urinariam, & urinæ vias data cicuta quandoque pulcherrimos præstat effectus.


Subinde curat urinæ retentionem, stranguriam; sæpe mingendi dolores opio citius sistit.

Nec

Nec in calculi affectionibus contemnendum est cicutæ extractum.

Ex his patet dignum esse, ut cum cicuta fiant experimenta.

Ego interim nullam ejus virtutem specificam assero, sed ad regulas formandas mutuam bonorum medicorum operam exspecto.






Cicuta aff. *HALL*: *Aliorum*.
Germanis, Schierling. Gallis, Cigue.
Anglis, Common Hemlock.
Cicuta major C. B. *TOUR.*
Cicutaria vulgaris *CLUS.*
Cicuta vulgaris major *MORS.*
Conium maculatum *L. & N.*




CHRISTOPHORI MOLINARII
CÆS. AULÆ MEDICI
E P I S T O L A
A D
CL. V. ANTONIUM
STÖRCK
AUGG. ARCHIATRUM
Q U A
MULIERIS A SCIRRHO CURATÆ
HISTORIA EXPONITUR.



V I N D O B O N Æ,
TYPIS JOANNIS THOMÆ TRATTNER,
CÆS. REG. APOST. MAJEST. AULÆ TYPOGR.
ET BIBLIOPOLÆ.

ANNO MDCCCLXI.

VIRO CLARISSIMO
DOCTISSIMOQUE
ANTONIO STÖRCK
AUGUSTORUM ARCHIATRO
CHRISTOPHORUS MOLINARIUS
CÆSAREÆ AULÆ MEDICUS
S. P. D.



Præstans & undequaque ce-
lebrata opella Tua,
Vir Doctissime, de-
cicuta tanta me il-
lam sæpenumero avidissime
percurrentem affecit volupta-
te; ut Tibi plurimum non so-
lum

a 2 lum

lum me, sed etiam omnes, qui
medicinam faciunt, debere,
fatear.

A vetustissimis enim tem-
poribus planta hæc venefica
habita fuit: Nam Theophra-
sto in Histor. plant. teste, Thra-
syas magnus Medicus pharma-
con ex succis cicutæ & papa-
veris parva copia permixtis
composuit, quod mortem sine
dolore conciliaret.

Mirandum itaque est, tale
venenum observationibus Tuis,
solidis experimentis subnixis,
eo

eo a Te fuisse deductum, ut
cancro, scirrhoque præsentif-
simum remedium afferat.

A primo medicinæ ævo ad
nostram usque ætatem probe
nosti, Vir Eruditissime, cum
Medicorum animis dirissimos
hosce morbos negotium grande
faceffisse, tum mortalium ge-
nus fuisse ab iis ad mortem us-
que excruciatum. Nam vel
ipso Hippocrate Auctore, cui
cæterorum medentium cohors
succinit, cancer malum est
immedicabile. Et quamvis
aliqui fuerint, qui adversus
a 3 eum

eum præsidium quoddam e cicuta civerint, tamen quoniam id forte fortuna potius, quam ex arte præstiterunt, possumus sine assentationis suspicione affirmare, divinitus pene Tibi concessum esse, ut tali beneficio genus humanum Tibi devincires.

Peccarem itaque & in bonum publicum, & in Te, si invidenti animo premerem id, quod in scirrho ulcereque uterino e canceroso venereoque genere a cicutae usu expertus sum; præsertim cum a Te,
quæ

quæ Tua est erga me humanitas, excitatus sim, ut morbi hujus historiam scripto, quod deinde publici juris fiat, committerem.

Mulier viginti quatuor annos nata, temperamenti sanguinei, lautissimo victu semper usa, octo annis nupta, nunquam gravida per hoc tempus effecta; Tempore menstruorum legitimo insolitam membrorum lassitudinem percipiens, cum Lumborum, tum totius imi ventris ad pubem usque doloribus summis, & tor-

pore crurum divexabatur, donec parcissimus sanguinis ex utero fluxus cruciatu quam maximo erumperet.

Anno elapso circa Novembris initium gonorrhœam virulentam pessimi moris a marito contraxit, quæ illico, nescio qua medela, evanuit.

Instantibus circa finem mensis catameniis, misella non solum ventris mole in immensum adaucta est cum duritie, & doloribus uterinis acerbissimis; verum etiam validissima febrī

febri correpta cum vomitu bilioso quasi continuo, lypothimiis, sudoribus frigidis, dysuria, stranguria, alvique adstrictione summa: nec nisi supina citra dolorem maximum exacerbationemque symptomatum potis erat decumbere.

Tertia die, qua atroci hac uteri inflammatione infestabatur, accitus ego, quarta nempe Decembris, morti proximam illam inveni, nec quid, præter unicam venæ sectionem, ei sublevandæ tentatum fuerat. Juvenilem ætatem perpendens,

a 5 dens,

dens, temperiem sanguineam, ventris duritiem, ad tactum exacerbatos cruciatus, memorataque symptomata; etsi pulsus parvus, contractus, & cum vultu sublivido perciperetur; jussi ut brachii vena tunderetur, unde sanguis lalido similis prodivit, & statim concrefcens.

Longum eſſet ea memora-
re, quæ cum interius anti-
phlogiſtica, nitrata, emulſio-
nes, decocta emollientia ex
herb. molliſſimis & floribus,
enemata oleoſa, paregorica;
tum

tum exterius cataplasmata,
litusque adhibui.

Altera die, cum morbus
non esset mitior, censui itera-
tam in brachio venæ sectio-
nem esse instituendam.

Sanguis priori similis, nec
ægrota levamen sensit.

Venam tertium tundi: quo
facto febris aliquantisper de-
crevit, & lethalia symptoma-
ta remiserunt.

Spem mihi fecerunt quar-
ta die urinæ, in quibus multa
sub-

subsidebant: nam quæ die decretorio apparent, crîsim salutarem, auctore Hippocrate, portendunt.

At infelici præ nimîis doloribus noctes transigenti vigiles, vix quatuor, aut quinque grana opii somnum conciliabant.

Cum ad septimam pervenissimus, memoratis cum interioribus tum exterioribus remediis, quorum præcipua erant nitrum, camphora, opium, diu, noctuque exhibita,
cœ-

coëpit ex utero effluere materies varii coloris, modo flava, & viridis, modo cruenta, quæ lintea corrodebat.

Alvus, quæ sub initium adstrictissima erat, & vix enematibus sollicitata, fœces reddebat, soluta est; & cum levamine materies foetida, biliosaque dejiciebatur.

Detumescebat abdomen, in urinis subsidebant plurima copiosaque arenæ rubræ granula, quæ matulæ fundum petebant, nec non sæpenumero pus.

Nona

Nona die ægrotam ex orci
faucibus ereptam existimaba-
mus. At repente ira percitæ
ingravescent omnia sympto-
mata; recrudescent febris, in-
tenditur abdomen, stranguria
acutissima redit, notæ deni-
que inflammati iterum uteri
se se pandunt.

In gravi hoc casu, quid
consilii? Vires morbo fractæ,
corpus continuis doloribus ex-
tenuatum, alvus adstrictissima,
venter tympani adinstar in-
tensus.

Doloris summi sedes a pube ad umbilicum, & ad ileon usque sinistrum.

Novam & profusissimam venæ sectionem celebrare opus fuit, quæ & postridie ob doloris contumaciam repetita est.

Sanguinis densitas, crassitiesque, tum dolor acerbus, nova uterum inflammatione laborare indicabant.

Ad sanguinem tali in discrimine constitutæ, toties detrahendum, plura me audacem

cem fecerunt : nam mulier
quædam, cui septimestrem fœ-
tum gerenti, & hepatitide af-
flictæ decima morbi die, qua
accitus fueram, jussi ut vena
bis tunderetur, convaluit, &
sanissimum nono mense infan-
tem peperit.

Nec huic abfimile fuit,
quod mihi cum juvene pleuri-
tico annorum viginti contigit.
Nam Is, postquam sex dierum
spatio ob morbi pertinaciam
septies me auctore imminutus
sanguine fuit, integerrimam
valetudinem nactus est.

Porro

Porro sciebam, haud intuitam in acutis, etiam octava morbi die, venæ sectionem haberi ab Hippocrate in morbo Anaxionis: Et quocunque tempore, ætate & morbo id tentari posse confirmatum a Celso, sic de sanguinis detractione per venas pronuntiante.

Interest enim non quæ ætas sit, neque quid intus in corpore geratur, sed quæ vires sint.

*At firmus puer, & robustus
senex, & gravida mulier valens
tuto sic curantur: & alibi; ergo*
b *vehe-*

*vehemens febris, & intolerabilis
dolor sanguinis detractionem re-
quirit.*

In ægrota itaque nostra,
propterea quod, ut antea dixi,
intolerabilis dolor aderat, a
binis sanguinis detractionibus
non temperandum censui :
Quæ profecto eam instanti pe-
riculo eripuerunt. Verum
stranguria recrudit, uterique
dolores atrocissime eam excru-
ciabant, quos litu, fotuque
crebro lenire opus erat.

Enematibus pluribus oleo-
sis mollissimis solvebatur, fo-
vebaturque adstrictissima al-
vus: febris modo magis, mo-
do minus intendebat; urinæ
ardorem demulcebat campho-
ra, nitrum, opium, emulsio-
nes femin. melon. & papa-
veris.

Interdiu apozemata her-
bar. althææ, malvæ, flor.
malv., verbasci, sambuci cum
diacodio ex usu erant, cum
mixtura temperante ex nitro
gummi tragaganthi, arabici,
camphora, lapillis cancro-
b 2 rum,

rum, quæ excipiebantur aquis
papav. rhæad. malvæque.
Somnum vix conciliabant, do-
loresque sopiebant grana tria,
quatuor, vel sex opii nichte-
meri spatium assumpta.

Nec multiplici opio tor-
menta compescere valebamus.
Hisce tamen auxiliis adjunctæ
coepit materies purulenta fœ-
tida, varii coloris, cruenta-
que prodire.

Viginti dierum spatium cru-
ciatibus divexata fuit, ita ut
integrum mensem Decembris
atro-

atroci hoc morbo afflicta
transegerit.

Diuturnus erat opii usus,
augebaturque dosis, donec do-
lores conquiescerent.

Victus ratione humectan-
te, demulcente, & lactea
cum decocto farsæparilliæ &
sassafras, vita sustinebatur.

Animadversione dignum
est, tam ingentem opii usum,
eam nec reddidisse stupidam,
nec paralyticam: quemadmo-
dum

dum haud raro accidisse Medici plures observarunt.

Quod documento nobis esse debet, ut in arte facienda simus quandoque audaces. Agitur enim de homine e libitinae manibus eripiendo: Officium itaque nostrum est, ut remediis cujuscunque generis, licet vehementioribus, ex arte tamen prudenterque, adhibitis, conemur morbum aggredi, donec is, si quidem in potestate nostra sit, depellatur omnino.

Hac

Hac ratione hystericam
puellam vicennem, prægressa
quasi apoplectica affectione
quadrihorium perdurante, di-
rissimis postea, & in diem duo-
decies, quindeciesve recur-
rentibus convulsionibus, trium
septimanarum spatio, affli-
ctam, drachmis duabus opii
per vices plurimas, parvaque
dosi, ante & post paroxysmum,
exhibitis, restituiimus.

Sic altera foemina, mense
integro per intervalla maxime
convulsa, drachinis duabus
opii puri, & laudani liquidi

b 4

uncia

uncia una, ex præscripto meo, assumtis, integerrima valetudine potita est. Fatendumque cum Sydenhamio, mancam claudicantemque esse, sine opio, medicinam; plusque nos isthoc, quam quocunque alio remedio præstare.

Depulsa itaque hoc auxiliorum genere morbi acutie, repente eo in loco, ubi dolor toto hoc tempore perstiterat, tumor ingens; durus, ad tactum dolens apparuit: cujus hæc erat natura; ut exorta uteri hæmorrhagia, dolor sopire-

piretur, & febris major reviresceret, nova suppuratione consequente.

En genuina, ni fallor, scirrhi uterini cancerosi effigies.

Quid balnea emollientia cum lacte, antivenerea remedia, & balsamica possent, necesse erat experiri.

In balneum quotidie temperatissimum ex lacte aquæ mixto, in quo sacculi incoquebantur ex herbis emollientibus

confecti , descendit ; facculi vero parti affectæ applicabantur. Sex septimanarum spatium , ad emolliendam uteri duritiem his usa est. Hoc temporis intervallo exhibuimus quotidie Mercurii dulcis grana sex, cum pilulis balsamicis, & abstergentibus , quas quia sæpenumero non modo in his affectionibus , verum etiam in renum vesicæque ulceribus valde proficuas experti sumus, juvat hic describere.

℞. Gummi arabici , therebinthinæ aa. drach. jß.

Sa-

Saponis veneti , Rhei
electi aa. drach. ij.

Succini albi ppti. drach. ij,
Camphoræ gr. xx.

Laudani opiatu gr. xv.
Balsami peruviani
drach. jß.

M. f. pillulæ gr. ij. &
deauratæ dentur.

Drachma una massæ hujus
quotidie utebatur , cum mer-
curii dulcis gran. sex : Dosis
mercurii augebatur indies ad
salivationem usque , cui bis in
septimana , ne erumperet , po-
tione purgante lenitiva ex
manna & cremore tartari sy-
ru-

rupoque rofar. solutivo confe-
cta, occurrebamus.

Pilulis hisce superbibebat
aquæ destillatæ antivenereæ
sequentis lib. unam, alteri li-
bræ lactis caprilli permixtam:
quam solam, sine ullo mercu-
rii usu, in lue venerea ulce-
ribusque, plurimum efficaci-
tatis habere, experti sumus,
etiam in iis, qui incassum a
mercurio opem præstolaban-
tur.

℞. Rad. sarsæparillia con-
cis. unc. ij.

Ligni

Ligni visci quercini.

Rasur. eboris & cornu
cervi aa. unc. jß.

Cinnamomi optimi drach-
mas duas.

Antimonii crudi, & la-
pidis pumicis aa. unc. ij.
utriusque nodulo in-
clusis.

Affunde aquæ fontis Lib. X.

Vase bene clauso digere
super. ciner. calid. hor.
XXIV.

Destilla leni calore: hinc
reliquiis affunde iterum
aquæ fontis q. lubet.

Bulliant horæ spatium, cola.

De-

Decoction hæc fit pro potu interdiu.

Per integrum Januarii mensem & ad Februarii medium hisce remediis usa est.

Exortis hinc modo uteri hæmorrhagia, modo materie purulentæ profluvio, foetorem ab ipsa ægrotante vix ferendum spirante, eo tandem ventum est, ut dolores lenirentur, ulcus abstergeretur, uterusque tanta colluvie maligna liberaretur.

Nihil.

Nihilominus omnium symptomatum caterva nostram iterum patientem infestavit : Aderat enim tumor magnus, durus, & sensibilis, qui nisi resolveretur, aptus erat omnia iterum frequenterque turbare.

Cum itaque huic liquefciendo memorata remedia paria non esse viderentur, subiit in cogitationem, num fortasse pharmaco Tuo, cicutaë nempe extracto, foret locus.

Te itaque adire constitui rogaturus, ut ægrotantem mecum

cum inspiceres. Quod cum
summa, qua polles urbanitate
effecisses, autumassesque op-
portunissimum cicutæ usum
fore, cœpimus consilio tuo
mane & vesperi granum unum
extracti cicutæ exhibere, hac
lege, ut superbiberet, Te con-
sentiente, aquæ destillatæ anti-
venereæ superius descriptæ,
una cum lacte, solitam, qua
hucusque usa erat, portionem.

Indies adaucta cicutæ do-
sis est, ascendimusque ad Gr.
XX. quorum X. mane; reli-
qua vespere ingerebantur.

Pri-

Primis septimanis, ut Tu recte in opusculo tuo animadvertisti, vix conspicuus effectus sequutus est, puris tantummodo qualitas mutabatur.

Fœtor non adeo ingens, modo sanguinis dilutioris, rutiliorisque, tum purulentæ materieî laudabilioris profluvium, & quidem copiosius erumpebat.

Nec nausea, nec vomitus nec alia incommoda concitabantur.

Statuto tempore rediere
menstrua , debita quantitate,
& sanguis nativam coagmen-
tationem adeptus est.

Appetebat ipsa magis in-
dies. Somnus fatis placidus
erat.

Functiones omnes cum ani-
males tum naturales revivisce-
bant.

Tertia & quarta septimana
molliorem ventrem inveni-
mus.

Tan-

Tandem spatio duorum
mensium remedio tuo ingens
tumor solutus fuit adeo felici-
ter, ut nunc non solum natu-
ralem molem abdomen nactum
sit, verum etiam vix dilutissi-
mae limphae inodorae, albi-
cantisque profusio imperspicua
animadvertatur.

Summam quoque urinæ
quantitatem bonæ indolis sæ-
penumero vidimus.

Color vultus, rubicundus,
amœnus, qualis ante natura
erat, rediit, corpus totum

pinguefcit , ipfamque faniffi-
mam , & ob recuperatam vale-
tudinem animo ad hilaritatem
composito , nuper ambo con-
fpeximus.

Quæ cum ita fint , nihil
enim in morbo hoc describen-
do , ut honeftum Profefforem
decet , vel prætermiffi , vel dif-
fimulavi , opinor , poffe quem-
quam conjicere , remedium
hoc fcirrhis , cancris , aliisque
tumoribus folvendis , curandis-
que , tum diurefi promovendæ ,
idoneum effe.

Effe

Esse quoque balsamicum,
& vulnerarium, ut & emme-
nagogum efficacissimum op-
portunumque.


Quapropter cicuta tan-
tum abest, ut cum veteribus
inter acerrima venena prorsus
relegetur, quin potius quem-
admodum a Te paratur, pro-
pinaturque, saluberrimis phar-
macis erit in posterum accen-
fenda.


Itaque non dubito, quin
si reliquas de ejus usu observa-
tiones Tuas, totius posterita-
tis

tis encomio prædicandas, quas
anxie præstolamur, in lucem
edideris, optime de genere
humano sis meriturus. Vale.


D. VINDOBONÆ ex Aedibus meis

IV. Id. Maii CXCXCCLXI.





CHRISTOPHORI MOLINARII
CÆS. AULÆ MEDICI
E P I S T O L A
A D
CL. V. ANTONIUM
STÖRCK
AUGG. ARCHIATRUM
Q U A
MULIERIS A SCIRRHO CURATÆ
HISTORIA EXPONITUR.



V I N D O B O N Æ,
TYPIS JOANNIS THOMÆ TRATTNER,
CÆS. REG. APOST. MAJEST. AULÆ TYPOGR.
ET BIBLIOPOLÆ.

A N N O C I D I D C C L X I.

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT

OF THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

REPORT

OF THE


COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1881



ALBANY:

VIRO CLARISSIMO
DOCTISSIMOQUE
ANTONIO STÖRCK
AUGUSTORUM ARCHIATRO
CHRISTOPHORUS MOLINARIUS
CÆSAREÆ AULÆ MEDICUS
S. P. D.



Præstans & undequaque ce-
lebrata opella Tua,
Vir Doctissime, de
cicuta tanta me il-
lam sæpenumero avidissime
percurrentem affecit volupta-
te; ut Tibi plurimum non so-
lum

a 2 lum

lum me, sed etiam omnes, qui
medicinam faciunt, debere,
fatear.

A vetustissimis enim tem-
poribus planta hæc venefica
habita fuit: Nam Theophra-
sto in Histor. plant. teste, Thra-
syas magnus Medicus pharma-
con ex succis cicutæ & papa-
veris parva copia permixtis
composuit, quod mortem sine
dolore conciliaret.

Mirandum itaque est, tale
venenum observationibus Tuis,
solidis experimentis subnixis,

eo

eo a Te fuisse deductum, ut
cancro, scirrhoque præsentif-
simum remedium afferat.

A primo medicinæ ævo ad
nostram usque ætatem probe
nosti, Vir Eruditissime, cum
Medicorum animis dirissimos
hosce morbos negotium grande
faceffisse, tum mortalium ge-
nus fuisse ab iis ad mortem us-
que excruciatum. Nam vel
ipso Hippocrate Auctore, cui
cæterorum medentium cohors
succinit, cancer malum est
immedicabile. Et quamvis
aliqui fuerint, qui adversus

eum præsidium quoddam e cicuta civerint, tamen quoniam id forte fortuna potius, quam ex arte præstiterunt, possumus sine assentationis suspicione affirmare, divinitus pene Tibi concessum esse, ut tali beneficio genus humanum Tibi devincires.

Peccarem itaque & in bonum publicum, & in Te, si invidenti animo premerem id, quod in scirrho ulcereque uterino e cancroso venereoque genere a cicutae usu expertus sum; præsertim cum a Te,
quæ

quæ Tua est erga me humanitas, excitatus sim, ut morbi hujus historiam scripto, quod deinde publici juris fiat, committerem.

Mulier viginti quatuor annos nata, temperamenti sanguinei, lautissimo victu semper usa, octo annis nupta, nunquam gravida per hoc tempus effecta; Tempore menstruorum legitimo insolitam membrorum lassitudinem percipiens, cum Lumborum, tum totius imi ventris ad pubem usque doloribus summis, & tor-

pore crurum divexabatur, donec parcissimus sanguinis ex utero fluxus cruciatu quam maximo erumperet.

Anno elapso circa Novembris initium gonorrhœam virulentam pessimi moris a marito contraxit, quæ illico, nescio qua medela, evanuit.

Instantibus circa finem mensis catameniis, misella non solum ventris mole in immensum adaucta est cum duritie, & doloribus uterinis acerbissimis; verum etiam validissima feбри

febri correpta cum vomitu bilioso quasi continuo, lypothimiis, sudoribus frigidis, dysuria, stranguria, alvique adstrictione summa: nec nisi supina citra dolorem maximum exacerbationemque symptomatum potis erat decumbere.

Tertia die, qua atroci hac uteri inflammatione infestabatur, accitus ego, quarta nempe Decembris, morti proximam illam inveni, nec quid, præter unicam venæ sectionem, ei sublevandæ tentatum fuerat. Juvenilem ætatem perpendens,

a 5 dens,

dens, temperiem sanguineam, ventris duritiem, ad tactum exacerbatos cruciatus, memorataque symptomata; etsi pulsus parvus, contractus, & cum vultu sublivido perciperetur; jussi ut brachii vena tunderetur, unde sanguis lacerido similis prodivit, & statim concreescens.

Longum esset ea memorare, quæ cum interius antiphlogistica, nitrata, emulsiones, decocta emollientia ex herb. mollissimis & floribus, enemata oleosa, paregorica; tum

tum exterius cataplasmata,
litusque adhibui.

Altera die, cum morbus
non esset mitior, censui itera-
tam in brachio venæ sectio-
nem esse instituendam.

Sanguis priori similis, nec
ægrota levamen sensit.

Venam tertium tudi: quo
facto febris aliquantisper de-
crevit, & lethalia symptoma-
ta remiserunt.

Spem mihi fecerunt quar-
ta die urinæ, in quibus multa
sub-

fulfidebant: nam quæ die decretorio apparent, crifim salutarem, auctore Hippocrate, portendunt.

At infelici præ nimis doloribus noctes tranfigenti vigiles, vix quatuor, aut quinque grana opii fomnum conciliabant.

Cum ad feptimam perveniffemus, memoratis cum interioribus tum exterioribus remediis, quorum præcipua erant nitrum, camphora, opium, diu, noctuque exhibita,
coe-

cœpit ex utero effluere materies varii coloris, modo flava, & viridis, modo cruenta, quæ lintea corrodebat.

Alvus, quæ sub initium adstrictissima erat, & vix enematibus sollicitata, fœces reddebat, soluta est; & cum levamine materies foetida, biliosaque dejiciebatur.

Detumescebat abdomen, in urinis subsidebant plurima copiosaque arenæ rubræ granula, quæ matulæ fundum petebant, nec non sæpenumero pus.

Nona

Nona die ægrotam ex orci
faucibus ereptam existimaba-
mus. At repente ira percitæ
ingravescent omnia sympto-
mata ; recrudescent febris , in-
tenditur abdomen , stranguria
acutissima redit , notæ deni-
que inflammati iterum uteri
se se pandunt.

In gravi hoc casu , quid
consilii ? Vires morbo fractæ,
corpus continuis doloribus ex-
tenuatum, alvus adstrictissima,
venter tympani adinstar in-
tensus.

Do-

Doloris summi sedes a pube ad umbilicum, & ad ileon usque finistrum.

Novam & profusissimam venæ sectionem celebrare opus fuit, quæ & postridie ob doloris contumaciam repetita est.

Sanguinis densitas, crassitiesque, tum dolor acerbus, nova uterum inflammatione laborare indicabant.

Ad sanguinem tali in discrimine constitutæ, toties detrahendum, plura me audacem

cem fecerunt : nam mulier
quædam, cui septimestrem fœ-
tum gerenti, & hepatitide af-
flictæ decima morbi die, qua
accitus fueram, jussi ut vena
bis tunderetur, convaluit, &
sanissimum nono mense infan-
tem peperit.

Nec huic abfimile fuit,
quod mihi cum juvene pleuri-
tico annorum viginti contigit.
Nam Is, postquam sex dierum
spatio ob morbi pertinaciam
septies me auctore imminutus
sanguine fuit, integerrimam
valetudinem nactus est.

Porro

Porro sciebam, haud intutam in acutis, etiam octava morbi die, venæ sectionem haberi ab Hippocrate in morbo Anaxionis: Et quocunque tempore, ætate & morbo id tentari posse confirmatum a Celso, sic de sanguinis detractione per venas pronuntiante.

Interest enim non quæ ætas sit, neque quid intus in corpore generatur, sed quæ vires sint.

At firmus puer, & robustus
senex, & gravida mulier valens
tuto sic curantur: & alibi; ergo
b vehe-

*vehemens febris, & intolerabilis
dolor sanguinis detractionem re-
quirit.*

In ægrota itaque nostra,
propterea quod, ut antea dixi,
intolerabilis dolor aderat, a
binis sanguinis detractionibus
non temperandum censui :
Quæ profecto eam instanti pe-
riculo eripuerunt. Verum
stranguria recrudit, uterique
dolores atrocissime eam excru-
ciabant, quos litu, fotuque
crebro lenire opus erat.

Ene-

Enematibus pluribus oleo-
sis mollissimis solvebatur, fo-
vebaturque adstrictissima al-
vus: febris modo magis, mo-
do minus intendebat; urinæ
ardorem demulcebat campho-
ra, nitrum, opium, emulsio-
nes femin. melon. & papa-
veris,

Interdiu apozemata her-
bar. althææ, malvæ, flor.
malv., verbasci, sambuci cum
diacodio ex usu erant, cum
mixtura temperante ex nitro
gummi tragaganthi, arabici,
camphora, lapillis cancro-
rum,

rum, quæ excipiebantur aquis
papav. rhæad. malvæque.
Somnum vix conciliabant, do-
loresque sopiebant grana tria,
quatuor, vel sex opii nichte-
meri spatio assumta.

Nec multiplici opio tor-
menta compescere valebamus.
Hisce tamen auxiliis adjunctæ
coepit materies purulenta fœ-
tida, varii coloris, cruenta-
que prodire.

Viginti dierum spatio cru-
ciatibus divexata fuit, ita ut
integrum mensem Decembris
atro-

atroci hoc morbo afflicta
transegerit.

Diuturnus erat opii usus,
augebaturque dosis, donec do-
lores conquiescerent.

Victus ratione humectan-
te, demulcente, & lactea
cum decocto sarsæparillæ &
fassafras, vita sustinebatur.

Animadversione dignum
est, tam ingentem opii usum,
eam nec reddidisse stupidam,
nec paralyticam: quemadmo-
dum

dum haud raro accidisse Medici plures observarunt.

Quod documento nobis esse debet, ut in arte facienda simus quandoque audaces. Agitur enim de homine e libitinae manibus eripiendo: Officium itaque nostrum est, ut remediis cujuscunque generis, licet vehementioribus, ex arte tamen prudenterque, adhibitis, conemur morbum aggredi, donec is, si quidem in potestate nostra sit, depellatur omnino.

Hac

Hac ratione hysterica
puellam vicennem, prægressa
quasi apoplectica affectione
quadrihorium perdurante, di-
rissimis postea, & in diem duo-
decies, quindeciesve recur-
rentibus convulsionibus, trium
septimanarum spatio, affli-
ctam, drachmis duabus opii
per vices plurimas, parvaque
dosi, ante & post paroxysmum,
exhibitis, restituiamus.

Sic altera foemina, mense
integro per intervalla maxime
convulsa, drachmis duabus
opii puri, & laudani liquidi

uncia una, ex præscripto meo, assumtis, integerrima valetudine potita est. Fatendumque cum Sydenhamio, mancam claudicantemque esse, sine opio, medicinam; plusque nos isthoc, quam quocunque alio remedio præstare.

Depulsa itaque hoc auxiliorum genere morbi acutie, repente eo in loco, ubi dolor toto hoc tempore perstiterat, tumor ingens, durus, ad tactum dolens apparuit: cujus hæc erat natura; ut exorta uteri hæmorrhagia, dolor sopire-

piretur, & febris major reviresceret, nova suppuratione consequente.

En genuina, ni fallor, scirrhi uterini cancerosi effigies.

Quid balnea emollientia cum lacte, antivenerea remedia, & balsamica possent, necesse erat experiri.

In balneum quotidie temperatissimum ex lacte aquæ mixto, in quò sacculi incoquebantur ex herbis emollientibus

confecti , descendit ; sacculi
vero parti affectæ applicaban-
tur. Sex septimanarum spa-
tio, ad emolliendam uteri du-
ritiem his usa est. Hoc tem-
poris intervallo exhibuimus
quotidie Mercurii dulcis grana
sex, cum pilulis balsamicis, &
abstergentibus , quas quia sæ-
penumero non modo in his af-
fectionibus , verum etiam in
renum vesicæque ulceribus
valde proficuas experti sumus,
juvat hic describere.

℞. Gummi arabici , there-
binthinæ aa. drach. jß.

Sa.

Saponis veneti , Rhei
electi aa. drach. ij.

Succini albi ppti. drach. ij,
Camphoræ gr. xx.

Laudani opiat gr. xv.
Balsami peruviani
drach. jß.

M. f. pillulæ gr. ij. &
deauratæ dentur.

Drachma una massæ hujus
quotidie utebatur , cum mer-
curii dulcis gran. sex : Dosis
mercurii augebatur indies ad
salivationem usque , cui bis in
septimana , ne erumperet , po-
tione purgante lenitiva ex
manna & cremore tartari sy-
ru-

rupoque rosar. solutivo confe-
cta, occurrebamus.

Pilulis hisce superbibebat
aquæ destillatæ antivenereæ
sequentis lib. unam, alteri li-
bræ lactis caprilli permixtam:
quam solam, sine ullo mercu-
rii usu, in lue venerea ulce-
ribusque, plurimum efficaci-
tatis habere, experti sumus,
etiam in iis, qui incassum a
mercurio opem præstolaban-
tur.

℞. Rad. sarsæparilliæ con-
cis. unc. ij.

Ligni

Ligni visci quercini.

Rasur. eboris & cornu
cervi aa. unc. jß.

Cinnamomi optimi drach-
mas duas.

Antimonii crudi, & la-
pidis pumicis aa. unc. ij.
utriusque nodulo in-
clusis.

Affunde aquæ fontis Lib. X.

Vase bene clauso digere
super. ciner. calid. hor.
XXIV.

Destilla leni calore: hinc
reliquiis affunde iterum
aquæ fontis q. lubet.

Bulliant horæ spatium, cola.

De-

Decoction hæc fit pro potu interdiu.

Per integrum Januarii mensem & ad Februarii medium hisce remediis usa est.

Exortis hinc modo uteri hæmorrhagia, modo materie purulentæ profluvio, foetorem ab ipsa ægrotante vix ferendum spirante, eo tandem ventum est, ut dolores lenirentur, ulcus abstergeretur, uterusque tanta colluvie maligna liberaretur.

Nihil-

Nihilominus omnium symptomatum caterva nostram iterum patientem infestavit : Aderat enim tumor magnus, durus, & sensibilis, qui nisi resolveretur, aptus erat omnia iterum frequenterque turbare.

Cum itaque huic liquefciendo memorata remedia paria non esse viderentur, subiit in cogitationem, num fortasse pharmaco Tuo, cicutæ nempe extracto, foret locus.

Te itaque adire constitui rogaturus, ut ægrotantem mecum

cum inspiceres. Quod cum
fumma, qua polles urbanitate
effecisses, autumassesque op-
portunissimum cicutæ usum
fore, cœpimus consilio tuo
mane & vesperi granum unum
extracti cicutæ exhibere, hac
lege, ut superbiberet, Te con-
sentiente, aquæ destillatæ anti-
venereæ superius descriptæ,
una cum lacte, solitam, qua
hucusque usa erat, portionem.

Indies adaucta cicutæ do-
sis est, ascendimusque ad Gr.
XX. quorum X. mane, reli-
qua vespere ingerebantur.

Pri-

Primis septimanis, ut Tu recte in opusculo tuo animadvertisti, vix conspicuus effectus sequutus est, puris tantummodo qualitas mutabatur.

Fœtor non adeo ingens, modo sanguinis dilutioris, rutiliorisque, tum purulentæ materiei laudabilioris profluvium, & quidem copiosius erumpebat.

Nec nausea, nec vomitus nec alia incommoda concitabantur.

Statuto tempore rediere
menstrua , debita quantitate,
& sanguis nativam coagmen-
tationem adeptus est.

Appetebat ipsa magis in-
dies. Somnus fatis placidus
erat.

Functiones omnes cum ani-
males tum naturales revivisce-
bant.

Tertia & quarta septimana
molliorem ventrem inveni-
mus.

Tan-

Tandem spatio duorum mensium remedio tuo ingens tumor solutus fuit adeo feliciter, ut nunc non solum naturalem molem abdomen nactum sit, verum etiam vix dilutissimae limphae inodorae, albicantisque profusio imperspicua aniadvertatur.

Summam quoque urinæ quantitatem bonæ indolis sæpenumero vidimus.

Color vultus, rubicundus, amoënus, qualis ante natura erat, rediit, corpus totum

pinguescit , ipsamque sanissimam , & ob recuperatam valetudinem animo ad hilaritatem composito , nuper ambo conspeximus.

Quæ cum ita sint , nihil enim in morbo hoc describendo , ut honestum Professore decet , vel prætermisi , vel dissimulavi , opinor , posse quemquam conjicere , remedium hoc scirrhis , cancris , aliisque tumoribus solvendis , curandisque , tum diuresi promovendæ , idoneum esse.

Esse

Esse quoque balsamicum,
& vulnerarium, ut & emme-
nagogum efficacissimum op-
portunumque.

Quapropter cicuta tan-
tum abest, ut cum veteribus
inter acerrima venena prorsus
relegetur, quin potius quem-
admodum a Te paratur, pro-
pinaturque, saluberrimis phar-
macis erit in posterum accen-
fenda.

Itaque non dubito, quin
si reliquas de ejus usu observa-
tiones Tuas, totius posterita-
tis

tis encomio prædicandas, quas
anxie præstolamur, in lucem
edideris, optime de genere
humano sis meriturus. Vale.

D. VINDOBONÆ ex Aedibus meis

IV. Id. Maii CXCCLXI.



